MAPS 91

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЛЕДѢЛИЕТО И ДЪРЖАВНИТѢ ИМОТИ

IMPERIAL BUREAU 6 DEC. 1930 MYCOLOGY

СПИСЪКЪ

НА

КОНСТАТИРАНИТѢ ВЪ БЪЛГАРИЯ ПРИЧИНИТЕЛИ

НА

БОЛЕСТИ ПО РАСТЕНИЯТА

отъ

Проф. Д-ръ Д. АТАНАСОВЪ и Д. ПЕТРОВЪ

MINISTRY OF AGRICULTURE AND NATIONAL DOMAINS

LIST

OF PLANT DISEASES IN BULGARIA

BY

D. ATANASOFF and D. PETROFF

СОФИЯ — SOFIA
ДЪРЖАВНА ПЕЧАТНИЦА — GOVERNMENT PRINTING OFFICE
1930

[RAM: X, 210]

RAM 10:210.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЛЕДѢЛИЕТО И ДЪРЖАВНИТѢ ИМОТИ

СПИСЪКЪ

НА

КОНСТАТИРАНИТѢ ВЪ БЪЛГАРИЯ ПРИЧИНИТЕЛИ

НА

БОЛЕСТИ ПО РАСТЕНИЯТА

ОТЪ

Проф. Д-ръ Д. АТАНАСОВЪ и Д. ПЕТРОВЪ

MINISTRY OF AGRICULTURE AND NATIONAL DOMAINS

LIST

OF PLANT DISEASES IN BULGARIA

BY

D. ATANASOFF and D. PETROFF

СОФИЯ — SOFIA
ДЪРЖАВНА ПЕЧАТНИЦА — GOVERNMENT PRINTING OFFICE
1930

УВОДЪ

Голѣмитѣ загуби, които понася нашиятъ земледѣлецъ ежегодно отъ болеститѣ на неговитѣ култури, налагатъ едно основно познаване на причинителитѣ на тѣзи болести. Такива сѫ вируситѣ, бактериитѣ, гѫбитѣ и нѣкои по висши и фанерогамни растения. Съ малки изключения паразитната флора на България е почти непозната. Въ това отношение на българския фитопатологъ и микологъ предстои пионерска работа. Малкото, което се знае и което е писано за нашата паразитна флора и за болеститѣ на растенията у насъ, е разпръснато въ много списания, наши и чужди и въ редъ недостѫпни за всѣкиго брошури и книги.

Цельта на тази книга е да направи възможно бързото ориентиране на нашия агрономъ върху констатиранитѣ у насъ причинители на болести по растенията.

Въ първата часть на настоящия списъкъ сѫ изброени азбучно всички причинители на болести по растенията, констатирани и описани въ България до края на 1928 година. Следъ името на всѣки паразитъ сѫ дадени мѣстонахожденията му и поредниятъ нумеръ на работата въ която е билъ описанъ той. Въ втората часть сѫ изброени сѫщитѣ паразити, групирани по гостоприемецъ. На края е даденъ списъкъ на литературата, третираща паразититѣ и болеститѣ на растенията въ България.

Въ първия, както и въ втория списъкъ сѫ включени всички причинители на болести, както и едно незначително число отъ непаразитни гѫби и то тъй, както сѫ дадени отъ респективнитѣ автори. Въ много случаи единъ и сѫщъ паразитъ е билъ описанъ отъ разни автори подъ най-различни, а въ нѣкои случаи даже подъ погрѣшни имена. Тѣзи имена сѫ дадени отчасть по отдѣлно, отчасть като синоними, защото за една провѣрка и поправка на погрѣшно опредѣленитѣ и синонимни видове, каквито има доста много, ще сѫ нужни многогодишни усилия.

Макаръ съ явни недостатъци и безъ претенция да бѫде изчерпателенъ, дано този списъкъ допринесе за развитието и преуспѣването на фитопаталогическата наука и практика въ България.

София, 30 мартъ, 1930 г.

Съдържание

Стр.

ЧАСТЬ I. — Списъкъ на причинителитѣ на болести по растенията, наредени по азбученъ редъ 7

ЧАСТЬ II. — Списъкъ на причинителитѣ на болести по растенията, групирани по гостоприемникъ 57

ЧАСТЬ III. — Литература 89

Списъкъ

на причинителитѣ на болести по растенията, наредени по азбученъ редъ.

Причинители неопредѣлени.

Бактериално гниене на доматенитѣ плодове: с. Салманово (Шуменско) и гр. Шуменъ — 344, Горна-баня — 298.

Бактерийна болесть по сусама (вижъ Pseudomonas sesami Malkoff, Bacillus sesami Malkoff): Садово — 244, 253, 245, 240, 352[а], Свиленградъ — 351, 352, Айтосъ, Елхово — 352, Харманлийска, Търново-Сейменска и Казълъ-Агачска околии — 240.

Бактерийна болесть по фасула: Садово — 253, 260, 352[а], 352, Шуменъ, Свищовъ, Русе — 352, изъ цѣла България съ изключение само на с. Тича (Котленско) — 207.

Бактерийна болесть по черницитѣ: Садово — 244, 246.

Бактериоза по картофа — 352[а].

Бактериоза по плода на доматитѣ: Софийско, Кюстендилско, Пазарджишко, Свищовско — 352, 352[а].

Бактериоза по памука: Айтоско, Харманлийско — 352, 352[а].

Бактериоза по тютюневитѣ листа: Егри-Дере, Варна, Горна-Джумая. Опитното поле с. Рила (Дупнишко) — 352[а], изъ разнитѣ крайща на България, гдето се отглежда тютюнъ — 352.

Бактериоза по захарното цвекло: Опитното поле София — 350, Русе, Каяли — 352[а], Опитното поле София и изъ цвеклопроизводнитѣ райони на страната, като Горно-Орѣховско, Бургаско, Плѣвенско, Ямболско, Видинско, Софийско и пр. — 352.

Бактериоза по стеблото на памука: Садово — 253, 257.

Бѣла петнивость по тютюневитѣ листа: Прънча, Паталеница, Дебърщица, Хаджиево, Саладиново, Караезли, Черногорово (Татаръ-Пазарджишко), Т. Пазарджикъ, Тополово, Червенъ, Долно-Арбанасъ (Станимашко), Станимака, Садово, Дарж-Дере и нѣкои села въ Кюстендилско — 304, Ловешко, Пловдивско, Кюстендилско — 165.

Валчестъ метлообразенъ и фасциационенъ нарастъкъ — по Pinus peuce Grisb.: Чамъ-Кория — 130.

Главня по царевицата: Образцовъ-чифликъ — 331.

Гжбясване на лозата: Чирпанско, Шуменско — 244.

Една ненаблюдавана до сега болесть по сливитѣ: Троянско, Търновско, Севлиевско — 244, 246.

Жълти сухи петна по тютюневитѣ листа: Дупнишко — 100.

Закържевяване (Court noué) — по Rupestris du lot: Плѣвенския държ. разсадникъ — 137.

Кораловиденъ метлообразенъ нарастъ — по Pinus Silvestris L.: Чамъ-Кория — 130.

Кълбестъ метлообразенъ нарастъ — по Pinus mughus Scop.: Чамъ-Кория — 130.

Листно завиване (Blattrollkrankheit) — по картофа: София, Русенско, Търновско — 220, Образцовъ-чифликъ — 127.

Мазна главня — по житни растения: Градище, Бутово, Павликени, Михалци, Беляковецъ (Търновско) — 188.

Maladie de Californie — по лозата: Садово, Бунаклий (Харманлийско) — 240, 245.

Метли — по Picea excelsa Link: Якорудскитѣ гори — 175; — по Pinus montana var. mughus Scop: Чамъ-Кория, м. Сарж-гьолъ — 175; — по Pinus silvestris L.: Чамъ-Кория — 175.

Метлообразенъ нарастъ отъ непаразитенъ произходъ — по Abies pectinata L: Князъ Борисовитѣ горски култури край София — 130.

Мозайчна болесть — по лале, нарцисъ, хиацинтъ: Градината на Агрономо-лесовъдския факултетъ въ София — 52.

Мозайчна болесть — по тютюна: Дупнишко — 100, Опитното поле с. Рила (Дупнишко) — 351, Горно-Джумайско, Дупнишко — 349.

Мокра гнилоба — по картофа: гр. Сливенъ — 246.
Мрежеста некроза — по картофа: 44, 45.
Окапване гроздето на американскитѣ лози: гр. Кула — 253.
Остъкляване на ябълкитѣ: Панагюрище, Кюстендилъ — 165.
Пепелница или мѫтеница — по тютюна: Дупнишко — 100.
Плосъкъ метлообразенъ нарастъкъ — по Pinus silvestris L., Picea excelsa Link.: Чамъ-Кория — 130.
Плосъкъ нарастъкъ съ букетна форма — по Pinus nigricans Host.: Двореца Врана — 130.
Потъмняване на листата (Le Brunissure de la vigne) — по лозата: Плѣвенъ, Минкова-махала — 308.
Почерняване стеблото — по тютюна: Дупнишко — 100.
Разни мъхове — по сливови дървета: 352[а].
Ракъ — по американски лози: с. Самоводене (Търновско) — 253, Ст.-Загорско — 240; — по ябълка, круша: Орхание — 150.
Растителни паразити отъ рода на гѫбитѣ — по памука: Садово — 240.
Слънчевъ изгоръ — по картофа: Кабиюкъ — 240; — по череши и вишни: разсадника при Павлово (Софийско) — 172.
Смолоизтичане (Ascospora beijerinckii, Bacterium gummi) — по праскови: Сливенския лозовъ разсадникъ — 260.
Фасциация (Fasciacio) — по Fraxinus ornus L.: горитѣ Варненско — 130, Генишъ-Ада, Варненската общинска гора — 175; — по Pinus peuce Grisb.: Чамъ-Кория — 129; — по тютюна: Дупнишко — 100.
Хлороза — по лозата: Плѣвенското земледѣлско училище — 16,368.
Чернилка по тютюна: Опитното поле с. Рила (Дупнишко) — 352[а].
Повреди отъ вѣтъра (топлия вѣтъръ) — по фасула: Опитното поле Садово — 240.
Черниятъ вѣтъръ въ българска Добруджа — по посѣвитѣ: Добруджа — 215.
Чума по разсада — по тютюна: Дупнишко — 100.
Шарка по листата на тютюна: Дупнишко — 100.

А

Actinonema rosae (Lib.) Fr. Syn. Marssonia rosae (Bon.) Br. et Cav. — по розата: Шуменъ 344, Разградъ—253, *** 352-[а]; — по Rosa centifolia L.: Садово — 252, 254, 261.
Aecidium asparagi — по шпаргела: Садово — 240.
Aecidium berberidis Gmel. — по Berberis vulgaris L: Шуменското земледѣлско училище — 344, Станимака и Бачково—240, 245, 252, 254, 261.
Aecidium columnare Syn. Pucciniastrum goeppertianum, Calyptospora goeppertiana Kühn.
Aecidium convolvulinum Speg. — по Convolvulus sp.: Садово—252,254,261.
Aecidium elatinum Alb. et Schw. Syn. Melampsorella cariophyllacearum (D. C.) Schroet., Pucciniastrum cariophyllacearum, Melampsorella cerastii — по Abies pectinata L.: Чамъ Кория и Князъ Борисовитѣ горски култури при София—129, 130, 131, Витоша—352[а], Криво бърдо (Рила)—203.
Aecidium euphorbiae Gmel. — по Euphorbia esuloides: Бачково — 252, 254, 261, по Euphorbia sp.: Софийско — 109.
Aecidium inulae-helenii Constantineanu — по Inula hirta Linné, (ецидиева форма на Puccinia inulae-fragmiticola): Горна-баня — 349.
Aecidium ranunculacearum D. C. — по Ranunculus reptans L.: Садово — 252, 254, 261.
Aecidium rhamni — по Rhamnus cathartica L.: Садово — 245, 252, 254, 261, 240.
Aecidium rubellum Gmel. — по Rumex sp.: Шуменъ — 344.
Aecidium scorzonerae (Cast.) Lagher. — по Scorzonera laciniata L.: с. Горна-баня — 349.
Aecidium strobilinum A. et Rees. — по Picea excelsa Link: Чамъ-Кория — 129, 131.
Aecidium tussilaginis Pers — по Tussilago farfara L. и Petasites officinalis Meh.: с. Бойково (Пловдивско) — 252, 254, 261.
Aecidium urticae D. C. — по Urtica dioica L.: въ лозята на гр. Шуменъ — 344; — по Urtica dioica var. pubescens Trautv.: Садово — 252, 254, 261.
Agaricus acris Bolt — сѣнчеститѣ смърчови гори на Чамъ-Кория — 109.
Agaricus amanita Schum. Syn. Lepiota gracilentus (Krombh.) Fr. — по земята: между с. с. Лакатникъ, Бофъ и Желенъ — 82.

Agaricus edulis Bull. Syn. Psalliota campestris L. — по земята: гр. Габрово 81, твърде разпространена въ България — 203.
Agaricus fascicularis Huds. — по зимния джбъ: въ горитѣ на Люлинъ планина — 131, 175.
Agaricus fragilis Pers. Syn. Russula fragilis Pors. — по сухи борикови храсталаци: Арабъ-Чалъ (Чепинско) — 109.
Agaricus ionus — отъ сѣнчеститѣ мѣста на смърчовитѣ лесове при Пѣсъко и горското училище въ Чамъ-Кория — 109.
Agaricus melleus Quell. Syn. Armillaria mellea Er. (Vahl.).
Agaricus muscarius L. — по склоноветѣ на Витоша — 109.
Agaricus (Pleurotus) ostreatus Jacq. — по стари стебла отъ букъ: Берковско, държавната гора Петрохански проходъ — 134.
Agaricus procerus Scop. — Чамъ-Кория — 109.
Albugo bliti — по Amarantus retroflexus L.: Садово — 254.
Albugo candida (Pers. ex. Lév.) Kuntze. Syn. Cystopus candidus (Pers. ex. Lév.) — по Capsella bursa pastoris Mönch.: София, Сарай (Тракия) — 336, Садово — 252, 254, 261, Садово, Черепишъ — 203, Елисейна, Черепишкия монастиръ — 335, Банско — 334, Куру-Багларъ (София) — 109; — по Berteroa incana D. C.: Своге — 335; — по Alyssum orientale Ard.: Елисейна — 335: — по Cirsium arvense Scop.: Церово — 335; — по пролѣтната рапица и бѣлия синапъ: Имрихоръ и Мадара (Шуменско) — 344; — по *‸*:*‸* — 245, Горна Джумая — 352[a]; — по Arabis ochroleuca Grisb.: Пиринъ планина — 334; — по Arabis turrita L.: Рила — 203; — по Barbarea vulgaris R. Br.: между Батакъ и Перущица — 203; — по Nasturtium silvestre R. Br.: Елисейна — 335; — по Nasturtium pyrenaicum B. Br.: Батакъ, Ракитово — 203; — по Chamaeoplium officinalle: Черепишъ — 203; — по Raphanus raphanistrum L.: Лѫджене и Ракитово — 203; — по Roripa austriaca: Татаръ-Пазарджикъ, Лѫджене и Ракитово — 203; — по Sinapis arvensis L.: Садово — 203; — по зеле: Търново — 209, Карнобатъ — 220, ‸*‸ — 252[a]
Albugo portulacae Lév. — по Portulaca oleracea L.: Садово — 254.
Albugo spinulosus de Bary — по Cirsium arvense Scop.: Садово — 252, 254.
Alternaria brassicae (Berk.) Sacc. — по мака: Садово — 150; — по пшеницата: София — 348, 350, 351; — по ечемика: София — 352.
Alternaria solani Sorauer. Syn. Macrosporium solani El. et Mart., Sporidesmium solani varians Vahn — по картофитѣ: гр. Шуменъ и с. Мурадалларъ — 344, Садово — 58, 59, 246, 150, 252, 254, 198, Образцовъ-чифликъ — 378, Добричкото земледѣлско училище — 219, 245, 260, *‸* 352[a], Кабиюкъ — 240; — по доматитѣ: гр. Шуменъ — 344, Садово—240.
Alternaria somniferi Sacc — по макъ: Садово — 150.
Alternaria tenuis Nees — по тютюневия разсадъ: гр. Дупница — 349; — по тютюневи корени: *‸* — 352[a].
Alternaria vitis Cav. — по Vitis vinifera L.: Образцовъ-чифликъ — 79; — по листата на асмитѣ: гр. Ески-Джумая — 220.
Amanita caesarea Scop. — по земята: Габрово, с. Пройновци (Габровско), монастира Св. Иванъ при с. Курилово (Софийско) — 81.
Amanita voginata Bull. — по Буковата гора на западъ отъ мина Плакалница — 82.
Anthracnose — по лозата: Земледѣлско училище гр. Русе — 110, Станимака — 222.
Aphanomyces sp. — по тютюневъ разсадъ: Пловдивския тютюневъ районъ изъ ястъцитѣ — 206.
Armillaria glioderma Fr. — по загнилъ боровъ пѫнъ: Боровата гора надъ с. Княжево — 81.
Armillaria mellea (Vahl.) Fr. Syn. Agaricus melleus Quell. — по букъ: държавната гора Петрохански проходъ (Берковско) — 134, западно отъ Боянския водопадъ, по коритото на рѣка Петровичка — Витоша — 81; — по джбъ: с. Хърсово, (Шуменско) — 344, по пѫтя отъ гара Лакатникъ за с. Лакатникъ и по пѫтя отъ с. Желенъ за Своге по край р. Искъръ — 82; — по черница: К.-Агачъ — 149, 219, Станимака 209, Хасково и Свиленградъ — 352[a]; — по Prunus sp. и сроднитѣ й костилкови: гр. Елена — 177; — по джанки: *‸* — 352[a], гр. Кюстендилъ и гр. Елена — 165, гр. Елена и с. Студена (Софийско) — 352; — по ябълки: с. Студена (Софийско) — 179; — по церъ: Генишъ-Ада — 129, 131; — по ела: Чамъ-Кория — 131; — по Abies pectinata: Чамъ-Кория — 175; — по смърча: Якорудската гора Места — 131; — по Picea excelsa Link: Якорудскитѣ гори — 175; — по бѣла мура: Чамъ-Кория — 131; — по Pinus peuce Grisb: Чамъ-Кория — 175; — по лоза: Земледѣлския изпитателенъ институтъ София — 182; — по корени отъ овощни дървета: с. Айдемиръ (Силистренско) — 215.

Arzenthobium oxycedri — по Juniperus oxycedrus L.: Родопитѣ — 245, Садово и околно стьта — 240.
Ascobolus glaber Pers. — по *⁂*: Рила — 202.
Ascochyta ervicola Syd. Hedw. — по Vicia tenuifolia Roth.: Стара-Загора при Аязмото — 252
Ascochyta ferdinandi Bubàk et Malkoff — по Sambucus ebulus L.: гр. Фердинандъ — 69 245, 254, 261.
Ascochyta fragariae Lib — Syn. Mycosphaerella fragariae (Sacc.) Lind., Ramularia tulasnei Sacc
Ascochyta heraclei Bres — по Heracleum sibiricum L.: Долна-Ломница близо до Рилски монастиръ — 262.
Ascochyta juglandis Boltsh — по орехитѣ: Кюстендилъ — 172, *⁂* — 179, 352ª.
Ascochyta kaltcheffii Budàk et Malkoff — по Rumex patientia: отъ България — 260.
Ascochyta medicaginis Bresad. — по люцерната: с. Мурадалларъ (Шуменско) и Шуменското земледѣлско училище — 344, *⁂* — 352ª.
Ascochyta monochorum Budàk. — по Ribes grossularia L.: при Рилския монастиръ — 262
Ascochyta nicotiana Pass. — по тютюна: *⁂* 352ª, 31, Хасково — 240, 252, Ловечко Горно-Джумайско, Дупнишко, Хасковско — 165, Горно-Джумайско — 30, Т.-Пазар джишко, Пловдивско, Ст.-Загорско, В.-Търновско — 119, Опитното поле София — 350, Тютюневото опитно поле, Горна-Джумая — 34, Хасково, Неврокопъ — 351 Станимашко — 174, на много мѣста изъ България — 178.
Ascochyta philadelphi Sacc. et Speg. — по Philadelphus coronarius: при Рилския монастиръ—262
Ascochyta pirina Pege. — по крушитѣ: Панагюрище — 172.
Ascochyta pisi Lib. — по фасула: *⁂* — 352ª, Шуменъ, с. Мурадалларъ (Шуменско) изъ бостанитѣ — 344, Опитно поле София — 348; — по граха: *⁂* — 352ª, Шуменъ с. Мурадалларъ (Шуменско) изъ бостанитѣ — 344, Опитното поле София — 350 по нахута: *⁂* — 352ª, Шуменъ, с. Мурадалларъ (Шуменско) изъ бостанитѣ — 344 Хасково, Садово — 150, 244, 246, 253, Образцовъ-чифликъ опитното поле — 331 Садово — 240, 245, 252, 254, 261; — по зимния ечемикъ?: Опитното поле София — 350
Ascochyta pteridis Bresadola — по Pteris aquilina: с. Бойково (Пловдивско) — 254, 261
Ascochyta rumicis Bubàk et Malkoff — по Rumex sp.: Долна Ломница при Рилския мона стиръ — 262.
Ascochyta scrophulariae Kabàt et Bubàk — по Scrophularia sp.: при с. Бойково (Пловдивско)—262
Ascochyta tabaci — по тютюна: с. Скобелово (Чирпанско) — 253.
Ascochyta viciae Libert. — по Vicia tenuifolia Roth: Стара Загора — 254, 261; — по зимния и пролѣтенъ фий: Опитното поле София — 348, 350, изъ България — 349; — по Vicia sp.: *⁂* — 352ª.
Ascochyta volkartii Bub. — по Trifolium repens L.: при Рилския монастиръ — 262.
Ascospora beijerinckii — по прасковата: Сливенъ — 260.

B

Bacillus betae Mig. — по цвеклото: Двореца Врана — 176.
Bacillus bussei Migula — по кръмното цвекло: Двореца Врана — 165; — по захарното цвекло: Опитното поле София — 348, 350, Образцовъ-чифликъ — 378, районитѣ на Софийската, Каялийската и Пловдивската захарни фабрики — 189,315, Плѣвенска Бѣлославинска, Ломска околии — 315.
Bacillus cubonianus. Syn. Bacterium mori B, et Lamb.
Bacillus lacerans — по захарното цвекло: изъ районитѣ на Софийската, Каялийската и Пловдивската захарни фабрики — 189, 315, Плѣвенска, Бѣлославинска, Ломска околии — 315.
Bacillus maculicola — по тютюна: Опитното поле с. Рила — 351, Дупнишко и Горно-Джумайско — 319.
Bacillus sesami Malkoff — по сусама: Садово — 149, 253, 254, 260, Айтосъ, Свиленградъ Елхово—184, 352, Харманлийска, Търново-Сеймснска, Хасковска и Казълъ-Агачска околии — 240.
Bacillus solanacearum? — по доматитѣ: зеленчуковитѣ градини около гр. Русе — 209.
Bacillus solaniperda K. — по картофитѣ: близо до Павлово — 165, Опитното поле София — 350, Опитното поле Образцовъ-чифликъ — 219.
Bacillus sp. — по лоза: Бургасъ — 260.

Bacillus spongiosus Aderh. et Ruhl. — по череша, зарзала, праскова, вишна и слива: описана по материали, включени въ сбирката на Централния земледѣлски изпитателенъ институтъ — 177.

Bacillus tabacuvorus — по тютюна: Горно-Джумайско и Дупнишко — 349, Опитното поле с. Рила — 351.

Bacillus vitivorus Baccarini (Gomose bacillariae, Malnero) — по лозата: с. Марковча (Шуменско) — 344, *⁂* — 352[a].

Bacterium gossypinus Stee. — по памука: Айтосъ, Харманлий — 351.

Bacterium gumis. Syn. Ascospora beijerinckii — по прасковата: Сливенския окржженъ разсадникъ — 260.

Bacterium malvacearum — по памука: Айтоско и Карнобатско — 184.

Bacterium mori Bayer et Lambert. Syn. Bacillus cuboniaпus Macch. — по черница: Каспичанъ, Макакъ, шосето Н.-Пазаръ—Дели-Орманъ — 344, Ески-Джумая — 209, Образцовъ-чифликъ — 219, Кула — 215, Садово — 258, Садово, Кула, Бургасъ — 253, 260, *⁂* — 352[a].

Bacterium phaseoli E. F. Smith. — по фасула: опитнитѣ полета Садово — 107, София — 248, 351, 350, Образцовъ-чифликъ — 219, 126, 378, Добричкото земледѣлско училище — 219, с. с. Мурадалларъ, Драгоево, Касапларъ (Шуменско) — 344; — по райкинъ бобъ: Шуменъ — 344.

Bacterium tabacum Wolf et Foster. — по тютюнъ: въ България — 321.

Bacterium tumefaciens Smith et Tows. — по сливи и череши: Държавния разсадникъ Златица — 172; — по сливи: Златица, Панагюрище — 351; — по сливи, джанки и череши: Златица, Панагюрище, Сливница — 352; — по сливитѣ и черешитѣ: на много мѣста изъ разсадницитѣ — 177; — по лоза: Ст.-Загорско — 240; — по круши, ябълки и дюли: изъ царството — 179; — по лавсонианския кипарисъ (Chamaecyparis lawsoniana Parl.): Двореца Врана — 130; — по цвекло: Опитното поле София — 176; — по коренитѣ на овощнитѣ дървета: Панагюрище и Луковитъ — 352[a].

Boletus badius Fr. Syn. Boletus glutinosus Krombh., B. spadiceus Krombh. — по земята: джбовата гора около Елешнишкия монастиръ — 82.

Boletus bovinus L. — по земята: Чамъ-Кория, боровата гора надъ с. Княжево, държавния разсадникъ Търново, с. Водици при Габровския монастиръ, смѣсената гора при с. Пройновци (Габровско) — 80; — по влажнитѣ сѣнчести мѣста: Чамъ-Кория — 109, Бойково, Алабакъ — 203.

Boletus bovinus var. mitis Kr. — по земята: София — Боровата гора при Духовната семинария — 80.

Boletus chrysenteron Bull. — по земята: Юндолъ — 80, Мургашъ планина — 82.

Boletus duriusculus Kalchbr. — по земята: джбовата гора надъ кошаритѣ на с. Горно-Оризово, по посока на западъ къмъ с. Бѣла-рѣчка — 82.

Boletus edulis Bull. — по земята: надъ Боянския водопадъ, смѣсената гора при с. Пройновци — 80, Черепишъ, Крива-рѣка — 203.

Boletus edulis var. reticulatus Fr. — по земята: гората къмъ Златнитѣ мостове — 80.

Boletus flavus With. — по земята: боровата гора при Княжево — 80.

Boletus granulatus L. — по земята: по свѣтлитѣ полянки на Борисовата градина, по пѫтя за Юндолъ Лжджене, 80.

Boletus luteus L.: Батакъ, Крива-рѣка — 203.

Boletus obsonius var. buxeus Rostr.: Витоша, надъ с. Бистрица подъ Хижата — 80.

Boletus pachypus Fr. — по земята: изъ смѣсената гора на Люлинъ — 80.

Boletus piperatus Bull. — по земята: Чамъ-Кория по влажнитѣ сѣнчести мѣста — 80, 109, Алабакъ 203.

Boletus pruinatus Fr. — по земята: въ сѣнчестата гора при с. Пройновци (Габровско) — 80.

Boletus satanas Lenz. — по земята: изъ гориститѣ смърчови мѣста на Чамъ-Кория, изъ смѣсената гора при с. Пройновци (Габровско) — 80, въ джбовитѣ гори около монастиря Св. Богородица при с. Елешница, с. Потопъ, с. Желява на западъ — 82, Чамъ-Кория — 109.

Boletus scaber Bull. — по земята: по течението на рѣка Бистрица, Чамъ-Кория, на изтокъ отъ в. Черната скала — Витоша, Златнитѣ мостове — 80, долината на рѣка Бистрица до Чамъ-Кория — 109, Бойково (Пловдивско) — 203.

Boletus scaber var. aurantius Sow. — по земята: изъ влажнитѣ горски мѣста край Златнитѣ мостове — Витоша — 80.

Boletus scaber var. niveus Fr. — по земята: западната часть на боровата гора при с. Княжево — 80.
Boletus subtomentosus L.: Бойково (Пловдивско) — 203.
Botritis cinerea Pers. Syn. Sclerotinia fuckeliana de Bary — по грозде: Шуменъ и с. Дивдядово (Шуменско) — 344, Плѣвенска околия — 209, изъ България — 182; — по лозята: Орѣховския разсадникъ — 219; — по червенъ лукъ: Малко Търново и Попово — 351; — по слънчогледъ: с. Сливница (Софийско) — 351.
Bovista gigantea Nees. Syn. Lycoperdon bovista Linné: Погановския монастиръ — 109.
Bovista nigrescens Pers.: Троянския балканъ — 203.
Bovista plumbea Pers.: Рилския и Троянски монастири — 203.
Bremia lactucae Regel. — по салата: зеленчуковитѣ градини на гр. Шуменъ — 344, 352[a]; — по Lactuca sativa L.: София — 336, Садово — 252, 261; — по Centaurea jacea L.: Бойково (Пловдивско) — 203.
Bulgaria inquinans Fr. Syn. Bulgaria polymorpha Wettst. — по джбъ: Борисовата градина — София, Генишъ-Ада — 82; — по джбъ: 109.

C

Caeoma confluens (Pers.) Schroet. — по Salix fragilis L.: с. Мадара (Шуменско) — 344.
Caeoma mercurialis (Mart.) Link. — по Populus pyramidalis Roz.: Ески-Джумайски разсадникъ — 344.
Caeoma pinitorquum A. Br. Syn. Melampsora pinitorqua Rostrup. — по Pinus silvestris L.: Князъ Борисовитѣ горски култури край София — 129, 130, 131; — по боръ: Княжевскитѣ култури — 270.
Calvatia cyathiformis (Bosc.) Morgen — по пжтя между Бѣлово и гората Алабакъ — 203.
Calyptospora goeppertiana Kühn. Syn. Aecidium columnare, Pucciniastrum goeppertianum — по Vaccinium vitis idaea L.: Фотенската държавна гора (Баташко); — по Abies pectinata D. C.: общинската гора на с. Райково, Чепинско — 134.
Camarosporium mori Sacc. — по черница: Вратца — 78.
Cantharellus aurantiacus Wulf. — по земята: Елешничкия монастиръ, джбовата гора надъ с. Горно-Оризово — 82, Рила — 203.
Cantharellus cibarius Fr. — по земята: гората при Златнитѣ мостове (Витоша) — 81, Мургашъ планина, около Вършецъ — 82, Чамъ-Кория, Зеленишкия балканъ — 203.
Cantharellus cibarius var. ramosus Schulz. — по земята: буковата гора около с. Вършецъ — 82.
Cantharellus friesii Q. — по земята: боровата гора надъ Княжево — 81.
Capnodium nerrii Rabenh. — по Nerium sp.: Пловдивъ — 252, 254, 261.
Capnodium salicinum Mont. — по слива: с. Божаница, с. Църква (Кюстендилско), гр. Кюстендилъ — 351, Кюстендилско — 36, Кюстендилъ, Радомирско, София—352, Садово и околностьта — 240, *$_{\text{с}}$* — 352a; — по брѣза, върба: горитѣ на Люлинъ — 131, 175; — по круши, ябълки: описана по материали включ. въ сбирк. на Цент. земл. изпит. институтъ, София — 179; — по овощнитѣ дървета: описана по материали включ. въ сбирката на Центр. земл. изпит. институтъ София — 177, Кюстендилско — 120; — по Betula alba Ehrh.: ботаническата градина при докторския паметникъ София — 336; — по Salix alba L., Pyrus malus L.: Садово — 245, 252, 254, 261; — по Alnus gluti nosa L.: Мездра — 335; — по френското и черното грозде: Садово и околностьта — 240.
Cephalothecium roseum Corda. — по Humulus lupulus L. и круша: Садово — 252, 254, 261.
Ceratophorum setosum Kirchn. — по Cytisus laburnum L.: Садово — 252, 254, 261.
Cercospora apii Fr. — по Apium graveolens L., Petroselinum sativum Hoffm.: Шуменско — 344; — по целина; *$_{\text{с}}$* — 352[a].
Cercospora armoraciae Cacc. — по *$_{\text{с}}$*: *$_{\text{с}}$* — 245.
Cercospora beticola Sacc. — по цвекло: Садово и околностьта — 240, 245, 252, 254, 261, Опитното поле София — 348, Софийско — 351, Садово — 231, изъ цѣла България — 189, Кнежа — 352[a], описана по материали включени въ сбирката на Центр. земл. изп. институтъ София — 176, Опитното поле Образцовъ-чифликъ и изъ цѣла България — 189; — по градинско цвекло: зеленчуковитѣ градини край Шуменъ — 344; — по захарно цвекло: Опитното поле Образцовъ-чифликъ — 331, 378, Панагюрище, Софийско — 352, Садово — 64, Пловдивско — 105.

Cercospora cerasella Sacc. Syn. Mycosphaerella cerasella Aderh. — по череша: Садово — 246, 245, 252, 254, 261, 240; *** — 352[a]; — по вишна и череша: описана по материали включ. въ сбирката на Центр. земл. изпитателенъ институтъ София — 177.

Cercospora chenopodii Fries — по Chenopodium urbicum L.: Мала-Църква при Самоковъ — 262.

Cercospora malkoffii Bubák. — по анасонъ: Садово 149, 246, 252, 254, 67[a], 253, 260, 261, *** — 352[a], Садово, Борисовградско — 255.

Cercospora mercurialis Pass. — по Mercurialis perennis L.: Свети-Лука при Рилския монастиръ — 262.

Cercospora microsora Sacc. — по Tilia parvifolia Ehrh.: Князъ Борисовитѣ горски култури край София — 131, 175, градината на гр. Самоковъ — 134; — по липа: Шуменъ — 344; — по Tilia grandifolia Neilr.: Родопитѣ — 252, 254, 261.

Cercospora ribicola Ell. et Everh. — по френско грозде: Шуменското земледѣлско училище — 344; — по червеното и бѣлото френски грозда: *** — 352[a].

Cercospora tomenticola Sacc. — по дюла: Ески-Джумая — 209, *** — 352[a], описана по материали включени въ сбирката на Центр. земл. изпит. институтъ София — 179.

Cercospora vitis Sacc. Syn. Cladosporium viticolum Cesati — по лоза: Ломския разсадникъ — 172, 323, 352, *** — 352[a], опредѣлена по материали въ Центр. земл. изпит. институтъ София — 182.

Cercosporella persica Sacc. — по праскова: *** — 352[a], описана по материали включени въ сбирката на Центр. земл. изпит. институтъ София — 177.

Charrinia diplodiella Viala et Ravaz. Syn. Coniothirium diplodiella Sacc.

Chlorosplenium aeroginosum (Oed.) de Not· — по Fagus silvatica L.: при Рилския монастиръ — 202.

Choiromyces maeandriformis Vittadini — по сенчеститѣ мѣста на смърчовитѣ гори: Чамъ-Кория — 109.

Chrysomyxa abietis Ung. — по Picea excelsa Link.: Чамъ-Кория — 134, м. Скакавица въ Чамъ-Кория — 136.

Chrysomyxa pirolae D. C. — по Picea excelsa Link.: Витоша — 136, 352[a].

Cicinnobolus abelmoschi Bubák — по бамя: Образцовъ-чифликъ — 79.

Cintractia caricis (Pers.) Magn. — по Carex sempervirens Vill.: Демиръ-Капия, Чадъръ-Тепе (до Мусала) — 203.

Cintractia crus-galli (Tracy et Earle) Magnus — по Panicum crus galli L.: Садово — 262.

Cintractia sorghi Zink. — по метлата: опитното поле Садово — 260.

Cladosporium candilonema Pass. — по слива, череша, праскова: описана по материали включени въ сбирката на Центр. земл. изпит. институтъ София — 177.

Cladosporium epyphyllum Pers. — по зарзала: Ломския разсадникъ — 349; *** — 352[a]; — по дивия кестенъ: градската градина Шуменъ — 344.

Cladosporium herbarum (Pers) Link. Syn. Hormodendron cladosporioides Sacc., Mycosphaerella tulasnei Janc.—по Triticum vulgare Vill., Triticum durum, Triticum compactum, Triticum polonicum, Triticum monococcum: Опитното поле на Института по частно земледѣлие при Агрономическия факултетъ София — 140; — по Ruta graveolens L.: Опитното поле София — 352[a]; — по Ageratum sp.: оранжерията на Шуменската градска градина — 344; — по пшеница: Опитното поле София — 350, 351 352; — по ечемикъ, овесъ: Опитното поле София — 350, 352; — по житото: Пирдопъ — 351, Пирдопъ и Свищовъ — 352, — *** : *** — 245.

Cladosporium sp. — по джанка: с. Сливница (Софийско) — 172.

Cladosporium viticolum Ces. Syn. Cercospora vitis Sacc.

Clasterosporium amigdalearum — по зарзала: Садово и околностьта — 240, Ямболския държ. овощенъ разсадникъ. гара Стралджа — 253; — по прасковитѣ, черешитѣ, сливитѣ и др.: Садово — 245, 252, 254, 261.

Clasterosporium carpophyllum (Aderh) Sacc. — по череша: Вратца — 240, Садово — 244, 246, Шуменско — 344, Добричкитѣ лозя — 219, с. Осмаръ (Преславско), с. Дриново (Поповско), Бѣлоградчикъ — 215; — по сливи: Садово — 244, 246, с. Сливница (Софийско) — 172, 352, Кюстендилъ, София — 352; — по зарзалитѣ: Садово — 244, 246, Шуменско — 209, Панагюрище — 352, Орѣховския лозовъ разсадникъ — 215; по прасковитѣ: Садово 244, 246, Шуменско — 344; — по каисиитѣ: Шуменско — 209, 344; — по вишнитѣ: Добричкитѣ лозя — 219, 215; — по *** : Божаница, Сливница (Софийско), гр. Кюстендилъ — 351, описана по материали включени въ сбирката на Центр. земл. изпитателенъ институтъ София — 177.

Clasterosporium putrefaciens — по картофи: Садово — 198.
Clavaria aurea Schaeff. — по земята: еловата гора при Бистричкия водопадъ на р. Бистрица; Рила при гр. Дупница — 82; — по *⁎* : Зеленика — 203.
Clavaria byssiseda Pers. — по изгнило буково парче: Витоша, гората при Златнитѣ мостове — 81.
Clavaria coraloides L. — по земята: с. Пройновци (Габровско) — 81.
Clavaria flava Schaeff. — по земята: буковата гора къмъ с. Люта — 82, с. Бойково (Пловдивско) — 20 .
Clavaria subtilis Pers. — по земята: Керсенлика (Еленско) — 81.
Claviceps purpurea Tul. — по пшеница: с. Махала (Самоковско) — 172; — по ръжь: с. Макакъ (Шуменско) — 344, с. Чеиръ-Харманъ (Добричско) — 281, Пловдивско, Т.-Пазарджишко, Кюстендилско, Станимашко, Преславско, Трѣвненско, Бѣлоградчишко — 57, Ракитово — 202, Кюстендилско — 215, Върба, Влаховичъ (Бѣлоградчишко) — 220, София, Попово — 352, Опитното поле София — 348, 351, Садово — 253, Осмаръ (Преславско), околноститѣ на гр. Трѣвна, Порчичъ, Бѣлотинци, Срѣдогривъ, Долни и Горни Ломъ, Реплина и др., Бѣлоградчишка околия, Тахчи, Гюзелдже-Аланъ (Разградско) — 209, Берковско, Шуменско, Бѣлоградчишко, родопскитѣ села, Чепеларе, Т.-Пазарджикъ — 219, Бѣла-Черкова (Родопитѣ) — 240, Осмаръ (Преславско), Влаховичъ, Салашъ, Стакьовци и др. (Бѣлоградчишко) — 215, по балканскитѣ мѣста — 244, Якоруда и Банско — 334, Бойково, Садово, Ситово и др. (Пловдивско) — 245, 252, 254, 261; — по *⁎* : *⁎* — 352[a], 109; — по ечемикъ: Опитното поле София — 351, Садовското земл. училище — 103; — по Dactylis glomerata L., Lolium perenne L., Agropyrum repens, Alopecurus pratensis L., Alopecurus agrestis L.: с. Макакъ (Шуменско) — 344.
Clithris quercinum Pers. — по джбъ: Генишъ-Ада (Варненско) — 134.
Clitosybe candicans Pers. — по земята: боровата гора при Духовната семинария София — 81.
Clitosybe clavipes var. comitialis Pers. — по земята: боровата гора при Духовната семинария София — 81.
Clitosybe brumalis Fr. — по *⁎* : *⁎* — 81.
Clitocybe detrusa Fr. по земята: западно отъ с. Лисецъ (Габровско) — 81.
Clitocybe diatreta Fr. — по земята: с. Бояна, Витоша на западъ отъ Касж-Тепе — 81.
Clitosybe ericetorum Bull. — по *⁎* : надъ с. Лисецъ (Габровско) — 81.
Clitocybe gyrans var. angusstissima Lasch. — по земята: боровата гора надъ с. Княжево — 81.
Clitocybe hirneola Fr. — по земята: западнитѣ предѣли на Витоша къмъ с. Владая — 81.
Clitocybe inversa Quél. — по *⁎*: буковитѣ гори на Зеленишкия балканъ — 203.
Clitocybe inversa var. flaccida Sow. — по земята: боровата гора надъ с. Княжево — 81.
Clitocybe nebularis Batsch. — по земята: боровата гора при Духовната семинария София — 81.
Clitocybe parillis Fr. — по земята: къмъ Златнитѣ мостове, Витоша — 81.
Clitocybe rivulosa var. cerussata Fr. — по земята: боровата гора при Духовната семинария София — 81.
Clitocybe rivulosa var. connata Schum. — по земята: западнитѣ предѣли на Витоша къмъ с. Владая — 81.
Clitocybe rivulosa var. phyllophylla Fr. — по земята: западнитѣ дѣлове на Витоша, отъ лѣво на Владайската рѣка — 81.
Clitocybe splendens Pers. — по земята: боровата гора надъ с. Княжево — 81.
Clitocybe suaveolens Schum. — по земята: западнитѣ предѣли на Витоша къмъ с. Владая по рѣкичката при дървения мостъ — 81.
Clitocybe tuba Fr. — по земята: боровата гора при Духовната семинария София — 81.
Coleosporium campanulae Pers. Lév. — по Campanula ranunculoides L.: Витоша — 159; — по Companula trachelium L.: Ботаническата градина на Университета София — 336, р. Бъндерица (Пиринъ) — 334, Лакатникъ, — 335, Чамъ-Кория, между Батакъ и Перущица, Рила (Стара постница и Св. Лука), Родопитѣ, Бойково, Бѣлово (Пловдивско) — 203; — по Campanula bononiensis L.: пжтя отъ Княжево за Владая — 336; — по Campanula glomerata L.: Банско — 334, с. Бойково (Пловдивско) — 203; — по Companula trachelium var. orientalis L.: при Рилския монастиръ — 203; — по Campanula moesiaca Vel.: Чамъ-Кория, Ситово (Родопитѣ) — 203.
Coleosporium campanulae ranunculoides Kl. — по Campanula glomerata L., Campanula moesiaca Vel.: с. Ситово (Пловдивско) — 252, 254, 261.
Coleosporium petasitis de Bary — по Petasites officinalis L.: Лозенъ планина, около Германския монастиръ (Софийско) — 336, Чамъ-Кория — 203.

Coleosporium senecionis (Pers.) Fries. Syn. Peridermium oblongisporium Kleb. — по Senecio vulgaris L.: около Галвицъ — 161; — по Senecio nemorensis L.: Пиринъ — 334, Сухи-Чалъ, Демиръ-Капия (Рила), Чамъ-Кория, с. Ситово (Пловдивско) — 203; — по Senecio nebrodensis L.: Пиринъ — 334; — по Pinus silvestris L.: Карлово — 180, 184; — по боръ: Карлово — 151.

Coleosporium sonchi (Pers.) Lév. — по Sonchus oleraceus L.: Церово — 335.

Coleosporium sp. като Peridermium pini forma acicola — по Pinus silvestris L.: гората Гешоза планина — 136.

Coleosporium telekiae (Thüm.) Bubák — по Telekia speciosa Bmg.: при Радуилъ — 262, Демиръ-Капия, Свети Лука (Рила), Рилски монастиръ, Чамъ-Кория, Рила — 203.

Coleosporium tussilaginis (Pers.) Klebahn — по Tussilago farfara L.: Витоша, Лозенъ планина — 336, Лакатникъ, Черепишъ — 335, между Радуилъ и Чамъ Кория — 262, Чамъ-Кория, между Батакъ и Перущица, между Бѣлово и Алабакъ — 203.

Colletotrichum gossypii Southw. Syn. Glomerella gossypii Ed. — по памука: Садово — 240, *** 352[a].

Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. et Magn.) Bri. et Cav. — по фасула: Шуменско — 344, Опитно поле София — 348, 351, 350.

Collybia clusilis Fr. — по земята: боровата гора на Държ. овош. разс. Търново, Златнитѣ мостове, Витоша — 81.

Collybia collina Scop. — по земята: брѣзовата гора при Духовната семинария София — 81.

Collybia dryophila (Bull.) Fr. Syn. Marasmius dryophilus (Bull.) Karst.

Collybia erosa Fr. — по земята: боровата гора при Духовната семинария София — 82.

Collybia fusipes Bull. — по земята: джбовата гора около Елешничкия монастиръ — 82.

Collybia maculata A. et R. — по земята: бороветѣ при Духовната семинария София, при гара Търново — 81.

Collybia nitellina Fr. — по земята: боровата гора при Духовната семинария София — 81.

Collybia radicata Relhan. — по земята: по коритото на р. Петровичка, западно отъ Боянския водопадъ, Витоша — 81, на западъ отъ мина Плакалница въ буковата гора — 82; — по ***: Алабакъ, Бойково (Пловдивско) — 203.

Coniosporium gečevi Bubák — по царевица: Русе — 79, *** — 352[a].

Coniothyrium diplodiella (Viala et Rav.). Sacc. Syn. Charrinia diplodiella Sacc. — по лоза: Пловдивско, Врачанско — 165, Шуменското земледѣлско училище — 344, Плѣвенска околия — 209, Садово — 244, 240, Троянъ, Видинъ — 253, цѣла България — 219, с. Самоводене (Търновско), Видинското лозарско училище — 260, Станимашко, Русе — 240, Павликенския лозовъ разсадникъ — 220, Садово и околностьта Станимака — 367, 245, 254, 252, 260, 261, гр. Попово, Минкова-махала — 352[a], Пловдивско, Вратчанско, Плѣвенско, Русенско — 352, Плѣвенъ, Русе — 351, изъ България — 182.

Coniothyrium foedans Sacc. — по черницата: Панагюрскиятъ овош. разсадникъ — 172, 352[a].

Coniothyrium olivaceum Bon. var. hesperidium Sacc. — по лимонови дървета: Оранжерията на гр. Шуменъ — 344.

Coniothyrium tirolense Bub. — по круши: Садово — 246, 252, 254, 261, описана по материали включени въ сбирката на Централниятъ земледѣлски изпитателенъ институтъ София — 179, *** — 352[a].

Coprinus picaceus (Bull.) Fr. — по земята: по пѫтя за Своге къмъ с. Желенъ — 82.

Coprinus plicatilis (Curt.) Fr. — по земяга: по пѫтя за Своге между с. с. Бофъ и Желенъ по течение на Бофската рѣка — 82.

Coprinus fimetarius var. macrorhizus Pers. — по пѣсъка: Гебедже (Варненско) — 82.

Corticium calceum Pers. — по Juglans regia L.; Черепишкия балканъ — 203.

Corticium cinereum Pers. — по ***: Рилския монастиръ — 203.

Corticium comedens (Pers.) Fries. — по Corylus avellana L.: Рилския монастиръ, Алабакъ — 203.

Corticium confluens Fr. — по Salix fragilis L.: София — 203.

Corticium lacteum Er. — по трупъ на Fagus silvatica L.: Зеленишкия монастиръ — 203.

Cortinarius anomalus Fr., Syn. Dermocybe anomalus Fr.

Cortinarius brunneofolvus Fr. — по земята: между с. с. Бофъ и Желенъ по течение на Бофската рѣка — 82.

Cortinarius firmus Fr. Syn. Hebeloma firmum Fr.

Crepidotus nollis Schaeff. — по клонетѣ на Fagus sp.: Рилския монастиръ — 203.

Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fries. — по листата на Paeonia decora Andr.: Харманлий — 66; — по Paeonia decora Andr.: Рилския монастиръ — 262; — по Gentiana asclepiadea L.: Бойково (Пловдивско) — 262, Черно-езеро подъ в. Мусала — Рила, с. Бойково (Пловдивско) — 203; — по Paeonia officinalis: Рила — 203.

Cuscuta corymbosa Choisy. Syn. Cuscuta suaveolens Ser., Cuscuta racemosa Mart.

Cuscuta epithymum Murr. Syn. Cuscuta minor D. C. — по люцерна: Шуменъ — 351, *** — 352[a]; — по граминеитѣ, устоцвѣтнитѣ: малката мера на Кабиюкъ — 344; — по фиевитѣ посѣви: с. Злокученъ (Преславско) — 344.

Cuscuta europea L. Syn. Cuscuta major D. C. — по Sambucus ebulus L.: с. Трояци (Преславско) — 317, Кадж, Макакъ, Абоба, Кюлевча (Шуменско) — 344; — по Urtica dioica L., Humulus lupulus L., пипера: изъ градинитѣ на с. Буланъкъ (Шуменско)—344

Cuscuta major D. C. Syn. Cuscuta europea L.

Cuscuta minor D. C. Syn. Cuscuta epithymum Murr.

Cuscuta monogyna Vahl. — по ябалкови дървета и западнали отъ филоксера лози: с. Имрихоръ (Шуменско) — 344.

Cuscuta racemosa Mart. — по люцерна: Садово — 149, Пловдивско — 260, с. Червенъ брѣгъ (Луковитско), Раковица (Кулско) — 220; *** — 245.

Cuscuta racemosa Mart. Ser. Syn. Cuscuta suaveolens Mart. — по люцерната: с. Крумовец (Преславско), Русе, околноститѣ на гр. Плѣвенъ, с. Салановци и гр. Орѣхово — 209, с. Върбовчецъ (Бѣлоградчишко), около Севлиево и Брадище, Хирево, Чадарли (Севлиевско), Фердинандъ и околностьта, Луковитско, с. Селановци (Орѣховско) — 215, Дрѣново, Лѣтница (Ловчанско), Базауртъ, Кованлъкъ (Добричско), Фердинандска околия на много мѣста, Кесарово, Беброво (Еленско), гр. Лѣсковецъ, с. Бѣла-черкова (Търновско), Плѣвенска околия, с. Червенъ-брѣгъ (Луковитско), с. Дражищ (Бѣлоградчишко) — 219; — по коприва и дивъ бъзъ: Луковитско — 215.

Cuscuta sp. — въ семена отъ люцерна: Видинско, Т.-Пазарджишко, Габровско — 354, отъ страната — 330.

Cuscuta suaveolens Ser. Syn. Cuscuta corymbosa Choisy, Cuscuta racemosa Mart. — по люцерната: с. Калугерица, Кабиюкъ — 344.

Cuscuta trifolii — по детелината: гр. Лѣсковецъ — 253, Пловдивско — 260; — по люцерната: с. Безденъ (Софийско) — 240, с. Селановци и гр. Орѣхово — 215, гр. Плѣвенъ — 244, 245.

Cylindrosporium alismacearum Sacc. — по Alisma plantago L.: около деретата на опитното поле до с. Горна-баня (Софийско) — 349.

Cylindrosporium castanicolum (Desm.) Berl. Syn. Mycosphaerella maculiformis (Pers.) Schr. — по кестена: Казанлъкъ — 349, *** — 352[a].

Cylindrosporium eleonorae Bubák et Malkoff — по Senecio transilvanicus Schur.: при рибнитѣ езера (Рила) — 262; — по Senecio pensilvanicus: *** — 260.

Cylindrosporium mori Berl. Syn. Sphaerella mori, Septoria mori и пр.

Cylindrosporium pimpinellae C. Mass. var. pastinacae Sacc. — по Pastinaca urens: Алабакъ при Бѣлово — 262.

Cyphella albo-violascens (Alb. et Schw.) Karst var. dubia Quél. — по Juglans regia L.: при Черепишкия монастиръ — 203.

Cystopus bliti (Biv. Bern.) Lév. — по Amarantus retroflexus L.: София, Лозенъ планина около Германския монастиръ, с. Скриняно (Кюстендилско) — 336, Банско — 334, Реброво — 335, Садово — 261, Плѣвенъ, при Троянския монастиръ, София, Денганъ, Садово, Баня, Бойково, Рила — 203; — по Amarantus silvestris Desf.: Черепишкия монастиръ, между Дупница и Кочариново, Бараклий — 203.

Cyctopus candidus (Pers.) ex Lév. Syn. Albugo candida (Pers. ex Lév.) Kuntze.

Cystopus portulacae (D. C.) Lév. — по Portulaca oleracea L.: с. Скриняно (Кюстендилско) — 336, Садово — 261, при Татаръ-Пазарджикъ, Дупница, между Батакъ и Перущица — 203.

Cystopus spinulosus de Bary — по Cirsium arvense Scop.: Садово — 261.

Cystopus tragopogonis (Pers.) Schröt. — по Tragopogon pratensis L.: София — 336; — по Cyrsium arvense Scop.: Борисовата градина (София), с. Скриняно (Кюстендилско) — 336, Бѣлово—Алабакъ, Садово — 203; — по Crepis rhoeadifolia M. B.: по пжтъ отъ Княжево за Владая — 336; — по Filago arvensis L.: Владая — 336.

Cytospora rubescens Fr. Syn. Valsa prunastri Fr. — по зарзала: овощнията разсадникъ гр. Орѣхово — 215; — по череша, зарзала и слива: описана по материали включени въ сбирката на Центр. земл. изпитателенъ институтъ София — 177, 352[a]

D

Daedalea quercina (L.) Pers. — по буковъ пънъ: около Черепишкия монастиръ — 80, Живелъ и Хърсово (Шуменско) — 344; — по Quercus pedunculata L., Quercus sessiliflora Salisb., Quercus cerris L.: Генишъ Ада — 129, 131; — по джбовъ пънъ: Генишъ Ада — 136; — по *ₓ*: Мургашъ планина — 82, Бѣлово, Курово, Рифа — 203.

Daedalea unicolor Bull. — по отсеченъ буковъ пънъ: гората при Златнитѣ мостове — Витоша, монастирската гора при Габровския монастиръ — 80; — по *ₓ*: Зеленишкия балканъ, Рила, Черепишъ — 203.

Darluca filum Biv. — по ецидии отъ Puccinia thesii Devs. (Schröter.) върху Thesium divaricatum Janka: Чалъ планина при Хасково — 66; — по уредо-сори отъ Uromyces striatus върху листата на Medicago rigidula Desf.: при Харманлий — 66; — по уредо-сори отъ Uromyces onobrychidis (Desm.) Lév. върху Onobrychis gracilis Bess.: при Хасково — 66.

Dasyscypha calyciformis (Milld). Rehm. — по елха: Райково—Пашмаклий — 351; — по Pinus mughus: подъ Мусала надъ Демиръ Капия — 202; — по Abies alba Mill.: Райково — 180.

Dematophora necatrix R. Hart. Syn. Rosellinia necatrix Berl. — по сливитѣ: гр. Троянъ — 246, 260, 253; — по черница: Станимака — 258, 253; 352[a], описана по материали включени въ сбирката на Центр. земл. изпит. инст. София — 177; — по Morus alba L.: Станимака — 254, 258; — по зарзалитѣ: Станимака — 253; по Prunus domestica L.: Троянъ — 258, 254; — по черешови корени: *ₓ* 352[a]; — по корени отъ лоза: с. Кадж (Шуменско) — 344.

Dendrophagus globosus Toum. — по слива: Земл. училище Видинъ — 209.

Dendryphium penicillatum Fr. — по макъ: околноститѣ на София — 165; Садово — 149, 352[a], София — 352. Образцовъ чифликъ — 331, 378, Дрѣново и Чичево (Македония) — 228[a].

Dermatophora necatrix Hartig. (?) — по черница: Станимака — 209; — по Morus alba L.: Станимака — 261; — по Prunus domestica L.: Троянъ — 252.

Dermatella prunastri Fr. — по слива: с. Студена (Софийско) — 219, описана по материали включени въ сбирката на Центр. земл. изпит. инст. София — 177; — по зарзала: *ₓ* — 352[a].

Dermocybe anomalus Fr. Syn. Cortinarius anomalus Fr. — по земята: буковата гора на западъ отъ мина Плакалница — 82.

Diatrype disciformis (Hoffm.) Fries — по *ₓ*: Рила — 202.

Diatrype stigma (Hoffm.) De Not. — по Corylus avellana L.: при Рилския монастиръ — 202.

Diatrypella verrucaeformis (Ehrh.) Nitschke. — по Corylus avellana L.: Рила, Свети Лука — 202.

Dichomera elaegni Karsten — по Elaeagnus angustifolius L.: при Агрономическия факултетъ София — 349.

Dictyolus muscigenus Bull. — въ торфищата между мъховетѣ: хижата Алеко, Витоша — 81.

Didymaria didyma (Ung.) Schroet. — по Ranunculus reptans: при Баня Чепино — 262.

Didymaria linariae Pass — по Linaria dalmatica Mill.: при Рибнитѣ езера, Рила — 262.

Dilophia graminis (Fuck.) Sacc. Syn. Dilophospora graminis Desm. — по пшеница: с. Червена Вода (Русенско) и гр. Османъ Пазаръ — 349; с. Войници (Долноверенишка община, Фердинандско) — 296, *ₓ* — 352[a]; — по ржжь: *ₓ* — 352[a].

Dilophospora graminis Desm. Syn. Dilophia graminis (Fuck) Sacc.

Diplodia amygdali Cke. A. Hark. — по бадема: *ₓ* 352[a], описана по материали включени въ сбирката на Центр. земл. изп. институтъ, София, 177.

Diplodia foeniculina Thüm. — по Foeniculum oficinale L.: опитното поле София — 352[a].

Diplodia mori West. — по черница: Вратца — 78.

Diplodina castaneae Delacr. et Pril. — по Castanea sativa Mill.: кестеняцитѣ край Берковица — 134.

Doassansia peplidis — по Peplis alternifolia M. B.: между Хасково и Хасковскитѣ бани — 66.

Dothidea sambuci (Pers.) Rehm. — по Morus alba L.: Вратца — 202.

Dothidea sambuci var. moricola Sacc. — по черница: Вратца — 78.

Dothidella betulina Fries. — по Betula pubescens Ehrh.: градината на гр. Самоковъ — 134.

Dothidella confertissima (Fries.) Schroet. — по Geranium silvaticum: Соколецъ при Чамъ Кория — 202.

Dothidella ulmi Wint. — по Ulmus campestris L.: Князъ Борисовитѣ горски култури край София — 131, 175.

Dothiorellina tankoffii Budàk — по черница: Вратца. — 78.

E

Endophyllum euphorbiae-silvaticae (D. C.) Winter — по Euphorbia amygdalioides L.: София—159
Entomosporium maculatum (Lév.) Sor. Syn. Entomosporium mespili (D. C.) Sacc., Stigmatea mespili Sor. — по крушитѣ: гр.Ески Джумая, Дрѣновска околия—200, Ямболския дър. овощ. разсадникъ — 246, 253, Добричъ — 219, Видинското лозарско училище — 244; — по крушата, дюлата, мушмулата: описана по материали включени въ сбир ката на Центр. земл. изпит. институтъ София — 179, *** 352[а]; — по Pyrus communis: Видинъ, Ямболъ — 252, 254, Садово, Видинъ, Ямболъ — 261; — по Coto neaster vulgaris Lind: Ливадитѣ при Петроханъ — 349.
Entomosporium mespili (D. C.) Sacc. Syn. Entomosporium maculatum (Lév.) Sor., Stigmatea mespili Sor.
Entyloma cichori Wroblovski — по Cichorium intybus L.: Черепишкия балканъ — 203.
Entyloma ranunculi (Bon.) Schröt. — по Ranunculus crenatus W. K.: Демиръ Капия, Рила — 203
Epichloe typhina (Pers.) Tul. — по Hordeum murinum L.: Садово — 252, 254, 261; — по Dactylus glomerata L., Anthoxantumodo ratum L., Phleum pratense L., Holcus lanatus L., Avena elatior: *** — 344; — по ливадни треви: *** — 352[а].
Epicocum purpurascens Ehrena — по лимонитѣ: шуменската оранжерия — 344.
Erysibe subterranea Wallr. Syn. Spongospora subterranea (Wallr.) John.
Erysiphe cichoriacearum D. C. — по Anchusa officinalis L.: между с. Бойково и Алабакъ — 203; — по Artemisia absinthium L.: при Рилския монастиръ — 203; — по Artemisia vulgaris L.: Витоша, Казичене, София — 336, Лакатникъ, Мездра — 335 по Cucurbita pepo: между Лъджене и Ракитово — 203; — по Chondrilla juncea L. Садово — 252, 254, 261; — по Cynoglossum officinale L.: Пещера — 203; — по Digitalis viridiflora Lindl.: Костенецъ, Чамъ Кория — 203; — по Geum montanum L.: Чамъ-Кория — 203; — по Hyoscyamus niger L.: при Рилския монастиръ — 203; — по Inula helenium L.: Лакатникъ — 335; — по Inula britannica L.: Реброво — 335, при Черепишкия монастиръ — 203; — по Lactuca scariola L.: Казичане — 336; — по Lappa major L.: Мездра — 335, Германския монастиръ (Софийско) — 336, при Троянския монастиръ — 203; — по Mulgedium alpinum Cass.: Рила — 203; — по Myosotis caespitosa Schult., Myosotis silvestris: Чамъ-Кория — 203; — по Origanum vulgare L.: Костенецъ, между Бѣлово и Алабакъ — 203; — по Plantago major L.: Витоша 336; при Троянския монастиръ — 203; — по Prenantes purpurea L. Костенецъ-Баня — 203; — по Salvia glutinosa L.: при Баня-Костенецъ — 362; — по Senecio nemorensis L.: Рила, Ситняково — 203; — по Sonchus oleraceus L.: Лакатникъ — 335; — по Sonchus uliginosus M. B.: Садово — 203; — по Sonchus arvensis L.: Чамъ-Кория — 203; — по Symphytum offcinale L.: с. Овчарово (Шуменско) — 344; — по Tanacetum vulgare L.: Казичане — 336, Костенецъ Баня — 203; — по Telekia speciosa Bmg.: Демиръ Капия (Рила) — 203; — по Valeriana officinalis L. Рила — 203; — по Verbascum sp.: с. Бойково (Пловдивско) — 203; — по Xeranthemum annuum L.: Черепишъ — 203; — по тютюна: Варненско — 351, Оп поле София — 350.
Erysiphe cohcoriacearum D. C. Syn Oidum abelmoschi Thümen — по Hibiscus esculentus L. Садово — 79, 254, 261.
Erysiphe cichoriacearum D. C. Syn. Oidium tabaci Thüm. — по тютюна: Станимашко — 174, *** — 31.
Erysiphe communis (Wallr) Link. — по повитица: Ломския лозовъ разсадникъ, тютюнищата на гр. Горна Джумая — 349; — по Inula sp.: опитното поле при Гона Баня (София) — — 349; — по захарно цвекло: Двореца Врана — 349; — по тютюна: Дупнишко — 149; — по Galega officinallis L.: Садово — 252, 254, 261; — по Convolvulus arvensis L.: *** — 109; — по фий: Лъджене — 352[а].
Erysiphe galeopsidis (D. C.) — по Ballota nigra L.: Рила—203;—по Galeopsis bifida Engh.: с. Драгалевци — 336; — по Galeopsis pubescens Bess.: Троянския балканъ — 203; — по Galeopsis tetrahit L.: при Рилския монастиръ — 262, Криво бърдо (Рила) — 203; — по Galeopsis versicolor Curt.: при Троянския монастиръ — 203; — по Lamium bithynicum Benth.: при Костенецъ — 203; — по Leonurus cardica L.: Родопитѣ при Бойково — 203; — по Salvia officinalls L.: Лютибродъ — 335; — по Salvia verticillata L.: Лютибродъ — 335, Рилския монастиръ — 203; по Stachys alpina L. Криво бърдо (Рила), при Рилския монастиръ — 203; — по Stachys germanica L. Чамъ Кория — 203; — по Stachys silvatica L.: Витоша — 336, Рилския монастиръ — 203; — по Stachys palustris L.: Казичене — 336.

Erysiphe graminis D. C. Syn. Oidium monilioides Link — по ечемикъ: Макакъ, Бѣлокопитово, Бухларъ (Шуменско) — 344, Опитното поле София — 348, 351, 352, Садово — 244, 246, 253, 352, Образцовъ чифликъ — 110, 112, 378, 379, Бѣлоградчикъ — 220, 351, 352, Земледѣлското училище Добричъ и околностьта — 215, с. Руженци (Бѣлоградчишко) — 220; — по пшеница: Самоводене (Търновско) — 209, Образцовъ чифликъ — 378, 379, Кладорупъ, Рабиша (Бѣлоградчишко) — 219, Садово и околностьта — 240, с. Хамзоренъ (Ямболско) — 288; — по овеса: Образцовъ чифликъ — 378, 379, — *,* — 352[a]; — по житото: Бѣлоградчикъ, Опитното поле София — 351, Садово опитното поле — 231; — по Triticum vulgare Vill., Hordeum vulgare L.: Садово — 245, 254, 252, 261.

Erysiphe martii Lév. — по червена детелина: Опитното поле София — 348; — по Medicago sativa L.: Образцовъ чифликъ — 252, 254, 261.

Erysiphe pisi — по грахъ: Брѣзникъ — 149.

Erysiphe polygoni D. C. — по Alyssum calycinum L.: Черепишкия монастиръ — 203; — по Angelica silvestris L.: при Садово — 203; — по Anthriscus cerefolium Hofm.: при Костенецъ — 203; — по Aquilegia vulgaris L.: ботаническата градина на Университета София — 336; — по Arabis turrita L.: Костенецъ Баня — 203; — по Astragalus glycyphyllus L.: Витоша — 336; — по Caltha palustris L.: при Рилския монастиръ, Криво бърдо (Рила), Чамъ Кория — 203; — по Calystegia sepium R. Br.: Садово — 203; — по Chaerophyllum hirsutum L.: Родопитѣ, Чамъ Кория — 203; — по Chaerophyllum temulum L.: Троянския балканъ — 203; по Cirsium lanceolatum Scop.: Кочариново — 203; по Convolvulus arvensis L.: Елисейна — 335, Плевенъ, Садово, Троянския балканъ. Баня Костенецъ — 203; — по Circaea lutetiana L.: Костенецъ — 203; — по Cucurbita pepo L.: с. Колешъ — 161; — по Echinops thracicus Vel.: между Бѣлово и Алабакъ — 203; по Chaerophyllum hirsutum L.: Витоша — 336; — по Hypericum quadrangulum L.: Криво бърдо, Рилския монастиръ, Ситняково — 203; — по Lathyrus pratensis L.: между Колибитѣ и Троянския монастиръ — 203; — по Linum usitatissimum L.: с. Бойково (Пловдивско) — 203; — по Melitotus officinalis Dors.: Черепишкия балканъ — 203, Лютибродъ — 335; — по Melilotus albus Ders.: Церово, Лакатникъ — 335, Казичане, София — 336; — по Medicago sativa L.: при Германския монастиръ (София) — 336; — по Nonnea atra Grsb.: Садово — 203; — по Ononis spinosa L.: Баня Лжджене — 203, Люти-Бродъ — 335, при Драгалевци — 336; — по Pastinaca opaca Berth.: между Бѣлово и Алабакъ — 203, Реброво — 335; — по Polygonum aviculare L.: Витоша, София — 336, Троянския монастиръ, между Колибитѣ и Зеленишкия монастиръ, София, Карабашъ при гр. Плѣвенъ — 203; — по Polygonum lapathifolium L.: Садово — 203; — по Polygonum persicaria L.: Костенецъ — 203; — по Ranunculus lanuginosus L.: Лакатникъ — 335; — по Ranunculus sp.: Троянски балканъ, Пещера — 203; — по Rumex acetosella L.: Криво бърдо (Рила) — 203, Казичене — 336; — по Rumex crispus L.: при Троянския монастиръ — 203; — по Rumex obtusifilius L.: Чамъ Кория — 203; — по Rumex sanguineus L.: при Троянския монастиръ — 203; — по Sisymbrium officinale (L.) Scop.: София — 336; — по Sisymbrium sophia L; Черепишъ, при Рилския монастиръ — 203; — по Trifolium medium L.: Криво бърдо (Рила) — 203; — по Trifolium medium var. balcanicum Vel.: Чамъ Кория — 203; — по Trifolium pannonicum Jacq.: Витоша — 336; — по Trifolium pratense L.: Черепишъ — 335, при Троянския монастиръ — 203; — по Trifolium procumbens L.: Витоша — 336, Реброво — 335; — по Trollius europaeus L.: ботаническата градина на Университета София — 336; по Verbascum thapsus: между Батакъ и Пещера — 203; — по Vicia cracca L.: Реброво — 335.

Erysiphe polygoni D. C. Syn. Oidium erysiphoides Fr. — по розитѣ: Шуменското земледѣлско училище — 344.

Erysiphe sp. — по ленъ: Садово — 253.

Erysiphe taurica Lév. — по Chondrilla juncea L.: Елисейна — 335; — по Digitalis lanata Sibth.: Родопитѣ при с. Бачково — 203; — по Phlomis pungens Willd. var. hirta Vel.: Мойно въ Македония — 335; — по Nepeta pannonica Jacq.: Рила 203; — по Verbascum longifolium Ten.: Троянския монастиръ — 203; — по Verbascum pannosum Vis. et Panč.: между Бѣлово и гората Алабакъ — 203.

Erysiphe tortilis Wallr. — по Cornus sanguineus L.: гората подъ с. Кюлевча (Шуменско) — 344.

Erysiphe umbeliferum de Bary — по Anethum graveolens L.: зеленчуковитѣ градини гр. Шуменъ — 344, 352[a].

Euphrasia officinalis Anet. — по разни Gramineae: Кабиюкъ — 344.
Evernia prunastri L. — по сливи: Кюстендилско — 36, 351, описана по материали включени въ сбирката на Централния земледѣлски изпитателенъ институтъ София — 177.
Exoascus (Taphrina) bullata Tul. — по круша: с. Крумово (Преславско) — 215.
Exoascus carpini Rostr. Syn. Taphrina carpini Rostr. — по Carpinus betulus L.: горитѣ на Люлинъ — 131, 175, Рилскитѣ гори — 349, по течение на р. Рила, въ Рилско-монастирскитѣ гори — 136.
Exoascus (Tarhrina) cerasi Fuckel. — по череша: *⁂* — 352[a]; — по череша и вишна: описана по материали включени въ сбирката на Централния земледѣлски изпитателенъ институтъ София — 177.
Exoascus deformans Rul. Syn. Taphrina deformans Tul. — по бадемъ: Бургасъ — 352[a]; — по праскова: Дрѣново, Шуменъ — 209, 344, Панагюрище, Кула, Дупница — 172, 352, Садово — 240, 149, 244, Търново — 246, Русенскитѣ лозя — 253, София — 391, Троянска и Луковитска околии — 220, Т. Пазарджикъ, Стара Загора, Пловдивъ, В. Търново — 119, Разсадницитѣ въ Кула, Севлиево, Орѣхово, градината на д-во Лѣсъ гр. Разградъ, с. Върбица (Преславско) — 215, Дивдядово и Овчарово (Шуменско) — 344, описана по материали включени въ сбирката на Централния земледѣлски изпитателенъ институтъ София — 177; — по Persica vulgaris: Садово — 252, 245, 254, 261, София — 109; — по зарзала: *⁂* 352[a].
Exoascus (Taphrina) insititiae Sad. — по каисиитѣ и зарзалитѣ: лозята на гр. Шуменъ — 344; — по слива: Севлиево — 219, 220, Габровско — 220, Пирдопско — 352, описана по материали включени въ сбирката на Централния земледѣлски изпитателенъ институтъ София — 177, отъ разни мѣста — 351.
Exoascus (Taphrina) minor Sad. — по вишна: описана по материали включ. въ сбирката на Централния земледѣлски изпитателенъ институтъ София — 177, 352[a].
Exoascus pruni Fuck. — по слива: Шуменско — 344, Алдомировци, Опицвѣтъ и Безденъ (Софийско) — 24, Ловчанския лозовъ разсадникъ, Образцовъ чифликъ — 219, Садово и околностьта — 240, Кюстендилско — 36, Дрѣново — 209, Орѣховския овощенъ разсадникъ — 215, Балабанско (Севлиевско) — 220, Кюстендилско, Троянско, Габровско, Ески Джумайско, Карнобатско, Преславъ, Шуменъ, Радомиръ и др. — 352, изъ разнитѣ овощарски райони — 172, изъ България — 244, описана по материали включени въ сбирката на Централния земледѣлски изпитателенъ институтъ София — 177; — по Prunus domestica L.: Садово — 245, 242. 254, 261, 109, 352[a].
Exobasidium vaccinii Woron. — по Vaccinium vitis idaea L.: Фотенската държавна гора (Баташко) — 134.

F

Farbaea astrantiae (Ces.) Rem. — по Astrantia major L.: Рила — 202.
Farbaea ranunculi (Fr.) Karst. — по Ranunculus repens L.: Чамъ Кория, при Рилския монастиръ — 202; — по Ranunculus cassubicus L.: Рила, Криво бърдо — 202, — по *⁂* — 202.
Farbaea rousseauana Sacc. et Bomm. — по Caltha palustris L.: Мусала, Крива рѣка (Рила) — 202.
Favolus europaeus Fries. — по джбъ: Генишъ Ада — 134.
Fomes pinicola Fr. — по чамови дъски: парника на ботаническата градина на Университета, София — 82.
Fusarium album Sacc. — по Ulmus campestris L.: Монастиря Св. Недѣля (Станимашко) — 252, 254, 261.
Fusarium allii sativi Allesch. — по лукови семена: при анализа въ Централния земледѣлски изпитателенъ институтъ София — 349; — по чесънъ: *⁂* — 352[a].
Fusarium beticola Fr. — по захарно цвекло: Плѣвенско — 172, София, Плѣвенъ — 352; — по цвекло: Плѣвенско — 176, *⁂* — 352[a].
Fusarium erubescens Appel et Wall. — по доматитѣ: с. Салманово (Шуменско), Шуменското земледѣлско училище — 344, *⁂* — 352[a].
Fusarium graminearum Schw. Syn. Gibberella saubineti (Mont.) Sacc. — по Zea mays.: Черепишкия монастиръ — 202; — по Sorghum vulgare: Троянски монастиръ — 202; — по житни зърна: *⁂* — 352[a].

Fusarium lateritium Nees. Syn. Gibberella moricolla Sacc. — по черница: Търново, Дрѣново — 209, 352[a]; — по царевиченъ кочанъ Образцовъ чифликъ — 79.
Fusarium lini — по ленъ: Садово, 198, 351, 352[a].
Fusarium maydiperdum Bubàk. Syn. Kosarovia maydosperda Bubàk — по царевични кочани: Образцовъ чифликъ — 79, 352[a].
Fusarium mori Mühm. Syn. Cylindrosporium mori Berl., Fusarium maculans, Phleospora mori, Septogleum mori, Sphaerella mori — по черница: Садово, Вратца, Берковица, Стара Загора — 253, Садово — 240, 244, 246, Държавния овощенъ разсадникъ гр. Кула — 215, Свиленградъ — 351, Шуменъ, Касапларъ, Долни Инджикъ (Шуменско) — 344, Ески Джумайския разсадникъ — 209, 352[a], Образцовъ чифликъ — 219; по Morus alba L.: Садово — 245, 252, 254, 261.
Fusarium pestis Sor. — по картофено стебло: *** — 352[a].
Fusarium roseum Link. — по пшенични класове: Нова Загора — 349.
Fusarium solani Sacc. — по картофитѣ: Образцовъ чифликъ — 172, 352, с. Мурадалларъ (Шуменско) — 344, *** — 352[a].
Fusarim sp. — по фасулъ: Еленска, Горно Орѣхозска, Търновска околии, двора на Агрономическия факултетъ София, Опитно поле София, околнитѣ ниви на София — 205; — по зеленчуковъ разсадъ: София, Пловдивъ, Фердинандово, Куртово Конаре (Пловдивско), Минкова махала — 153; — по пшеницата (Triticum vulgare Vill): с. Медковецъ (Ломско), Фердинандско, Минкова махала, отъ Минкова махала до Ломъ, Мездра и Видинъ, Лопушка и Гаганишка общини (Берковско) — 301; — по тютюневъ разсадъ: Пловдивския тютюневъ районъ — 206.
Fusarium tabacivorum Dell. — по тютюна: *** — 352[a].
Fusarium urticarum Corda — по черница: Вратца — 78.
Fusarium vasinfectum — по фасулъ: Садово — 352, 352[a].
Fusicladium dendriticum (Wallr.) Fuck. Syn. Venturia inaequalis Aderh. — по ябълката: Образцовъ чифликъ — 110, Садово — 149, 244, 246, 252, 245, 254, 261, *** — 352[a], с. Алдомировци (Софийско), Ломъ, Луковитъ и др. — 253, Бѣлоградчикъ, с. Бѣло Поле, Ловчанския лозовъ разсадникъ — 209, 219, Тутраканъ, Севлиевския овощ. разсадникъ — 220, Панагюрище, Бѣлоградчикъ, Софийско — 352, с. Божаница — 351, с. с. Дриново, Хайдаръ (Поповско), гр. Севлиево, с. Крумово (Преславско) — 215, описана по материали включени въ сбирката на Централния земледѣлски изпитателенъ институтъ София — 179, Садово и околностьта — 240, Шуменско — 344, Т.-Пазарджикъ, В. Търново, Ст. Загора, Пловдивъ и околноститѣ имъ — 119.
Fusicladium depressum (Berk. et Curt.) — по Angelica silvestris L.: при Рилския монастиръ — 262.
Fusicladium pyrinum (Lib.) Fuck. Syn. Venturia pyrina Aderh. — по крушитѣ: Шуменско — 344, Земледѣлското училище Видинъ, Бѣлоградчикъ — 209, Търново, разсадника Горна-Орѣховица — 219, Садово — 244, 246, 351, 352, 345, 254, 252, 261, 240, изъ България описана по материали включени въ сбирката на Центр. земл. изпитателенъ институтъ София — 165, 179, Ломъ — 260, с. Алдомировци (Софийско) — 240, с. Прауджа (Бѣлоградчишко), Тутраканъ, с. Крумово (Преславско), Севлиево, Фердинандско — 215, Тутраканско, Луковитско, Бѣлоградчишко, Севлиевския овощ. разсадникъ — 220, София, Радомиръ, с. Червена Вода (Русенско) — 352, 352[a], Образцовъ чифликъ — 110, с. Алдомировци (Софийско), Луковитъ, Ломъ — 253, Т.-Пазарджикъ, В.-Търново, Ст.-Загора, Пловдивъ и околноститѣ имъ — 119; — по сливи: Садово — 149.
Fusicoccum bulgaricum — по лозата: Плѣвенъ — 73.
Fusoma parasiticum Tub. — по боръ: Карлово — 352[a]; — по бѣлъ боръ, черъ боръ, дугласка и смърчъ — Picea pungens Engelm.: горскитѣ разсадници на Карловската секция — 183.
Fusoma pini R. H. Syn. Fusoma parasiticum Tub., Fusarium blasticola Rostr. — по Pinus silvestris L.: горския разсадникъ гр. Мехомия — 300.
Fustularia crista galli Wetstein. Syn. Rhinanthus crista galli L.

G

Geaster coliforme (Dicks.) Pers. — по земята: околностьта на Шуменъ — 109.
Geaster hygrometricus Pers. — по земята: Софийско, Лепеница (Чепино) — 109, Бойково (Пловдивско), Рила — 203.

Geoglossum hirsutum Pers. — по земята: въ торфищата между мъховетѣ при хижа Алеко (Витоша) — 81.

Gibberella moricolla Sacc. Syn. Fusarium lateritium Nees.

Gibberella saubinetii (Mont.) Sacc. Syn. Fusarium graminearum Schw.

Gloeosporium ampelophagum Sacc. Syn. Sphaceloma ampelinum de Bary — по лозата: с. Велибей (Преславско), Хаскьой, Сарсанларъ (Силистренско) — 209, София — 172, 352, Шуменъ (подъ монастира) — 344, Бургазъ — 244, с. Самоводене (Търновско) — 149, Орѣховския лозовъ разсадникъ — 219, 215, Видинското лозарско училище — 260, Садово — 245, 254, 252, 261, 240, Станимака — 245, 252, 254, 261, Т.-Пазарджикъ, Минкова махала — 352[a], Перущица — 263, Орѣховска и Бѣло Слатинска околии — 263, описана по материали включени въ сбирката на Центр. земл. изпит. институтъ София — 182.

Gloeosporium betulinum West. — по Betula sp.: с. Бойково (Пловдивско) — 254, 261.

Gloeosporium caulivorum — по люцерна: Опитното поле София — 352.

Gloeosporium fagi (Desmet. et Rob.) West. — по букъ: кьошковетѣ при гр. Шуменъ — 344.

Gloeosporium fructigenum Berk. — по ябалки: Садово — 240, 252; — по сливи и череши: *$_{*}$* — 352[a]; — по круши, ябалки, сливи, вишни: описана по материали включени въ сбирката на Центр. земл. изпит. институтъ София — 177, 179.

Gloeosporium lagenarium Sacc. — по краставици: Шуменско — 344, Варна — 352, *$_{*}$* — 352[a], описана по материали включени въ сбирката на Центр. земл. изпитателенъ институтъ София — 165; — по динитѣ: Шуменско — 344, Ямболъ и околностьта му — 253, Добричъ — 245, 252, 254, 261, с. Чамурлий (Добричко) — 240; — по пъпеши: Ямболъ и околностьта му — 253, 260, Добричъ — 245, 252, 254, 261; — по тиквитѣ: Образцовъ чифликъ — 219.

Gloeosporium lindemuthianum Sacc. et Magn. — по фасула: Образцовъ чифликъ — 219, Плѣвенъ — 352, *$_{*}$* — 352[a].

Gloeosporium phomoides Sacc. — по домати: Земледѣлското училище гр. Свищовъ — 352, *$_{*}$* — 352[a].

Gloeosporium pruniosum Bäumer forma tirolensis Bubàk et Kabàt — по Veronica urticaefolia: при рибнитѣ езера (Рила) — 262.

Gloeosporium salicis Westend — по Salix alba: Садово — 252, 254, 261.

Gloeosporium sp. — по зарзалата: описана по материали включени въ сбирката на Центр. земл. изпит. институтъ София — 177.

Gloeosporium viola Berk. et Br. — по Viola tricolor L.: Опитното поле София — 352[a].

Glomerella gossypii (South.) Edg. Syn. Colletotrichum gossypii Southw.

Glonium lineare (Fr.) de Not. — по ?: при Рилския монастиръ — 202.

Gnomonia erythrostroma Auer. Syn. Septoria pallens Sacc. — по череша: Земл. училище Видинъ — 209; — по сливата, черешата, вишната: описана по материали включени въ сбирката на Центр. земл. изпитателенъ институтъ София — 165, 177, *$_{*}$* — 352[a].

Gnomonia leptostyla (Fr.) Ces. et de Not. Syn. Marssonia juglandis Sacc. — по орѣха: Кюстендилъ — 172, Шуменско — 344, Вратца, Кюстендилъ — 351, 352, *$_{*}$* — 352[a], описана по материали включени въ сбирката на Центр. земл. изпитателенъ институтъ София — 179; — по Juglans regia: Садово — 245, 252, 254, 261, при Германския монастиръ (Софийско) — 336; — по Juglans nigra: Агрономическия факултетъ София — 349.

Gnomonia ostriae de Not. — по Ostrya carpinifolia Scop.: с. Хаджиново (Станимашко) — 252.

Gnomoniella coryli (Batsch). Sacc. — по Corylus avellana L.: при Рилския монастиръ — 262.

Gnomoniella fimbriata (Pers.) Sacc. — по Carpinus betulus L.: при Баня Костенецъ — 262.

Gomphidius roseus Fr. — по *$_{*}$* : с. Бойково (Пловдивско) — 203.

Guignardia bidwellii Viala et Ravaz — по лоза: Земледѣлското училище Видинъ — 209.

Gymnosporangium aucupariae-juniperinum (L) Kleb. Syn. Gymnosp. conicum Hedw., Roestelia cornuta — по Sorbus aucuparia L.: градината на гр. Самоковъ и по шосето Самоковъ—Чамъ Кория — 134.

Gymnosporangium clavariaeforme (Jacq). Rees. — по Juniperus oxycedrus L.: с. Бойково (Пловдивско — 252, 244, 261; — по Pyrus malus L.: с. Бойково (Пловдивско) — 203; — по Crataegus monogyna: Курво при Лѫджене — 203.

Gymnosporangium confusum Plowr. — по Cotoneaster pyracantha Spach.: горитѣ на Странджа — 131, 175; — по Mespilus germanica: при Рилския монастиръ — 262, Рила — 203; — по Crataegus monogyna: при Троянския монастиръ — 203; — по листата на дюлата: *$_{*}$* — 352[а], описана по материали включени въ сбирката на Центр. земл. изпитателенъ институтъ София — 179.

Gymnosporangium conicum Hedw. Syn. Gymnosporangium sabinae-juniperinum (L.) Kleb. Roestelia cornuta по Sorbus aucuparia L.: Берковския балканъ — 129, 131.

Gymnosporangium juniperinum Fries. (L.) — по Juniperus communis L.: при Рилския монастиръ — 203, гората около Германския монастиръ (Софийско), горитѣ надъ с. Владая — 131, 175; — по Juniperus nana Willd.: горитѣ на Елъ Тепе (Пиринъ) — 131, 175; — по Sorbus aucuparia L.: при Боянския водопадъ — 161, Сухи Чалъ (Рила), Криво бърдо (Рила), Чамъ Кория, Крива рѣка (Рила) — 203.

Gymnosporangium mali-tremelloides Kleb. — по ябълка: *$_{*}$* — 352[а], описана по материали включени въ сбирката на Центр. земл. изпит. институтъ София — 179.

Gymnosporangium oxicedri. Syn. Roestelia cancellata R.—по круша: Татаръ Пазарджикъ—260.

Gymnosporangium sabinae (Dicks) Wint. Syn. Roestelia cancellata R. — по круша: Пловдивско—165, Панагюрище — 351, с. Бойково (Пловдивско) — 261, Садово — 203, 425, Овощния разсадникъ гр. Добричъ, с. Осмаръ (Преславско) — 215, Садово и околностьта — 240, с. Бойково и Садово (Пловдивско) — 246, Садово, Брацигово, Перущица, Устина, Кричимъ, с. Фердинандово и други села изъ Пловдивско — 244, Татаръ Пазарджикъ — 260, с. Садово, Перущица, Устина, Кричимъ, Бойково (Пловдивско), и Нареченъ и Шейтанъ кьой (Станимашко) — 252, 254, 261, Орѣховския разсадникъ — 219, Шуменското земледѣлско училище — 344, описана по материали включени въ сбирката на Центр. земл. изпитателенъ институтъ София — 179, Пловдивъ, Казанлъкъ, Панагюрище — 352, *$_{*}$* : 352[а]; — по овощнитѣ дървета: Пловдивъ, Стара Загора, Т. Пазарджикъ, В. Търново и околноститѣ имъ — 119.

Gymnosporangium tremelloides Hart. — по ябълка: Орѣховския разсадникъ, Разградско — 219; — по овощнитѣ дървета: Пловдивъ, Стара Загора, В. Търново, Т. Пазарджикъ и околноститѣ имъ — 119; — по Pyrus malus L.: Рила, Махала Самоковъ — 203; — по Pyrus aria L.: Криво бърдо (Рила) — 203.

H

Hebeloma firmum Fr. Syn. Cortinarius firmus Fr. — по земята: буковата гора на западъ отъ мина Плакалница — 82.

Helminthosporium avenae Br. et. Cav. Syn. Pleospora avenae Died. — по овеса: *$_{*}$* — 352[а].

Helminthosporium avenae sativae Br. et Cav. — по овеса: с. Бракница (Поповско) — 219, Шуменско — 344.

Helminthosporium gramineum Rab. Syn. Pleospora trichostoma Died. — по ечемика: Садово — 244, 253, 245, 252, 254, 261, 240, 238, *$_{*}$* — 352[а], Образцовъ чифликъ — 378, Русе, Ески Джумая — 352, Шуменско — 344.

Helminthosporium sp. — по ечемикъ: Образцовъ чифликъ — 378.

Helminthosporium teres Sacc. — по ечемикъ: Добричкото земл. училище — 219, 215.

Helvella lacunosa Fr. — по земята: джбовата гора на западъ отъ Елешнишкия монастиръ къмъ с. Желява — 82.

Hendersonia mespili (D. C.) Sacc. — по мушмолитѣ: Казанлъкъ — 349, *$_{*}$* — 352[а].

Hendersonia sarmentorum West. — по лоза: гр. Фердинандъ — 352[а].

Herpotrichia nigra R. Hart. — по Pinus montana var. mughus Scop.: Чамъ Кория, Якорудската гора Места — 131, Чамъ Кория, Якорудската гора Места, м. Сарж Гйолъ — 175, Чамъ Кория — 134; — по боръ: Чамъ Кория — 131; по смърчъ: Чамъ Кория — 131; — по Picea excelsa Link.: Чамъ Кория — 175.

Heterosphaeria linariae (Rabenh.) Rehm. — по Dianthus microlepis Boiss: Витоша — 202.

Heterosporium echinatum Cook. — по макъ: *$_{*}$* — 352[а], Имрихоръ и Абоба (Шуменско) — 344.

Heterosporium gracile Sacc. — по Iris germanica L., Narcissus poeticus L.: с. Кюлевча (Шуменско) — 344.

Heterosporium variabile Cke. — по спанака: Шуменскитѣ зеленчукови градини — 344, *$_{*}$* — 352[а].

Hormodendron cladosporioides Sacc. Syn. Cladosporium herbarum (Pers) Link, Mycosphaerella tulasnei Janc.

Humaria convexula (Pers.) Rhem. — по *$_{*}$*: Рила — 202.
Hyalospora polypodii (Pers.) Magnus. — по Cystopteris fragilis Bernh.: с. Бойково (Пловдивско) — 261, 203, Рила — 203; — по Pegopteris dryopteris: Сухи Чалъ, Криво бърдо, Крива рѣка (Рила) — 203.
Hydnum argutum Fr. — по череша: шосето Свищовъ—Търново — 81.
Hydnum cinereum Bull. — по земята: с. Пройновци (Габровско) — 81.
Hydnum coralloides Scop. — по джбовъ пѫнъ: с. Хърсово (Шуменско) — 344.
Hydnum diversidens Fries. — по джбъ: с. Хърсово (Шуменско) — 344.
Hydnum imbricatum L. — по земята: надъ с. Бистрица (Софийско) — 81; — по пѫнъ отъ върба: до Германския монастиръ (Софийско) — 109.
Hygrophorus chrysodon Batsch. — по земята: Витоша западнитѣ предѣли, монастирската гора при Габровския монастиръ — 81.
Hygrophorus coccineus (Fr.) Sch. — по земята: въ торфищата между мъховетѣ, Хижата Алеко, Витоша — 81.
Hygrophorus eburneus Bull. — по земята: монастирската гора при Габровския монастиръ — 81, покрай пѫтя между с. с. Бофъ и Желенъ, по долината на Бофската рѣка — 82.
Hygrophorus niveus Scop. — по земята: боровата гора при Духовната семинария (София)—81.
Hygrophorus penarius Fr. — по земята: западнитѣ предѣли на Витоша — 81.
Hygrophorus virgineus (Wulf.) Fr. — по земята: между с. с. Бофъ и Желенъ — 82.
Hypholoma dispersum Fr. — по земята: въ смѣсената гора при с. Пройновци (Габровско) — 81.
Hypholoma fasciculare Bolt.—*$_{*}$*: Зеленишкия балканъ, Алабакъ, с. Бойково (Пловдивско)—203.
Hypoxylon coccineum Bull. — по *$_{*}$* : *$_{*}$* — 202.
Hypoxylon cohaerens (Pers) ex. Fr. — по *$_{*}$* : *$_{*}$* — 202.
Hypoxylon fuscum (Pers.) ex. Fr.—по брѣза: Чамъ кория — 131; — по Corylus avellana L.: гората около Германския монастиръ (Софийско) — 131, 175, при Рилския монастиръ — 202; — по Fagus silvatica L.: Чамъ Кория — 175.
Hypoxylon multiforme Fries, — по Fagus silvatica L.: Рила — 202.
Hypoxylon variolosum (L.) Keiss. — по *$_{*}$*·*$_{*}$* — 202.

L

Lactarius deliciosus L. — по земята: боровата гора на Борисовата градина (София), боровата гора при Духовната семинария — 81, Зеленишкия монастиръ, Рила, с. Бойково (Пловдивско) — 203.
Lactarius pallidus Pers. — по земята: буковата гора на западъ отъ мина Плакалница — 82.
Lactarius piperatus Scop. — по земята: джбовата гора на източния склонъ на Люлинъ, изъ сѣнчеститѣ мѣста при Златнитѣ мостове (Витоша), срещу фабриката на Рашевъ — гр. Габрово, на западъ отъ Касж тепе при с. Бояна, Витоша — 81, буковата гора на западъ отъ мина Плакалница — 82, Зеленишкия монастиръ — 203.
Lactarius sp. — по земята: смърчовитѣ гори въ Чамъ Кория — 109.
Lactarius torminosus Schaeff. — по *$_{*}$* Чамъ Кория — 203.
Lentinus lepideus Fr. Syn. Lentinus squamosus (Schaeff.) Quél.
Lentinus squamosus (Schaeff.) Quél. Syn. Lentinus lepideus Fr. — по дъски: оранжерията на Ботаническата градина на Университета София — 82; — по върбови дънери: Потопската рѣка при с. Елешница (Софийско), Мургашъ планина — 82.
Lentinus suffrutescens (Brot.) Fr. — по дъски, сапрофитно: оранжерията на Ботаническата градина на Университета София — 82.
Lentinus ursinus Fr. — по джбовъ пѫнъ: подъ с. Лисецъ (Габровско) — 81.
Lenzites betulina (L.) Fries. — по брѣза: Князъ Борисовитѣ култури край София — 129, 131; — по Prunus armeniaca L.: Севлиево — 203.
Lenzites flaccida Fr. — по буковъ пѫнъ: надъ с. Лисецъ (Габровско), около Габровския монастиръ, на западъ отъ с. Вършецъ, Рашевата фабрика при Габрово — 80.
Lenzites flaccida var. betulina Fr. — по буковъ пѫнъ: Витоша къмъ с. Владая. — 80.
Lenzites saepiaria (Wulf.) Fries. — по трупъ отъ Picea excelsa Link.: гората Гешова планина — 136, Чамъ Кория — 175, Бараклий, Рила — 203; — по ела и боръ: Якорудската гора Места — 131, 175; — по смърчъ: Якорудската гора Места — 175.
Lenzites variegata Fries. — по Fagus silvatica L.: при Рилския монастиръ — 203.
Lepiota castanea Q. — по земята: Бунарджика (Пловдивъ), Златнитѣ мостове, Витоша — 81.
Lepiota citrophylla Berck. et Br. — по пръсть: Ботаническата градина на Университета София — 81.

Lepiota clypeolaria var. cristata A. et S. — по земята: между с. с. Бофъ и Желенъ — 82.
Lepiota clypeolaria var. fellina Pers. Syn. Lepiota fellina Pers.
Lepiota fellina Pers. Syn. Lepiota clypeolaria var. fellina Pers. — по земята: Борисовата градина (София) — 82.
Lepiota gracilentus Kromb. Syn. Agaricus amanita Schum. — по земята: между с. с. Лакатникъ, Бофъ и Желенъ — 82.
Lepiota granulosa var. carcharias R. — по земята: Бургасъ на морския брѣгъ при солницитѣ — 81.
Lepiota holosericea Fr. — по ливадитѣ: къмъ с. Свидня около ханчетата между с. с. Своге и Искрецъ — 82.
Lepiota persoonii Fr. — по трупъ отъ букъ: буковата гора на западъ отъ мина Плакалница, къмъ с. Люта — 82.
Lepiota procera Scop. — по земята: западнитѣ горски склонове на Витоша, Мургашъ планина — 82.
Lepiota procera var. rhacodes Vitt. по земята: Златнитѣ мостове, Витоша — 81.
Leptothyrium alneum Kze. — по Alnus glutinosa Gaertn. — Казичене, Витоша — 336.
Leptosphaeria bubakii Klica — по *$_{*}$*: Черепишкия монастиръ — 202.
Leptosphaeria circinans Sacc. Syn. Rhizoctonia medicaginis D. C.
Leptosphaeria haematites (Rab.) Niessel. — по Clematis vitalba L.: Рила — 202.
Leptosphaeria herpotrichoides de Not. Syn. Ophiobolus herpotrichus Sacc.
Leptosphaeria rimalis Niessel. — по Clematis vitalba: при Рилския монастиръ — 202.
Leptosphaeria rusci (Wallr.) Sacc. — по Ruscus aculeatus L.: между Сотиръ и Бойково (Пловдивско) — 202.
Maestadia bidwellii Viala et Ravaz. Syn. Guignardia bidwellii Viala et Ravaz.
Lophodermium arundinaceum Schrand. — по Stipa gallica Čel.: Хвойна — 66.
Lophodermium macrosporium R. Hart. — по Picea excelsa Link.: Чамъ кория — 131, 181.
Lophodermium nervisequium (D. C.) Rehm. — по ела: Чамъ Кория — 181; — по Abies pectinata L.: Рила — 202.
Lophodermium pinastri Chev. — по Pinus silvestris L.: Клисурското лесничейство, м. Ракинъ Ржтъ (Берковско), м. Бегликъ (Баташко), Сливенския горски разсадникъ — 131, с. Бойково (Пловдивско) — 252, 254, 261; — по черна мура: Софийския горски разсадникъ — 131; — по боръ: Фотенъ и Карлово — 352[a], Карловскитѣ горски култури — 181; — по бѣлия боръ: Поибренската секция по укрепв. пороитѣ, Кн. Борисовитѣ горски култури край София, горския разсадникъ Чехльово — 132; — по иглолистнитѣ дървета: София, Панагюрско — 350.
Loranthus europaeus. — по джбъ: с. Мелешли (Дойранска околия) — 317.
Lycogala epidendrum (L.) F. — по кората отъ стари дънери отъ Salix fragilis: с. Дяково до Радомиръ — 203.
Lycoperdon bovista Linné. Syn. Bovista gigantea Nees. — по земята: Погановския монастиръ — 109.
Lycoperdon gemmatum Batsch. — по земята: Троянския монастиръ — 203.
Lycoperdon hyemale Bull. — по земята: Рилския монастиръ — 203.
Lycoperdon pyriforme Schaeff. — по земята: Батакъ (Родопитѣ) — 203.

M

Macrosporium commune Rabenh. Syn. Pleospora herbarum Rbh. — по тютюневи стебла: Горно-Джумайско, Дупнишко — 349; — по лоза, макъ: *$_{*}$* — 352[a].
Macrosporium hibiscum Thüm — по бамя: *$_{*}$* — 352[a].
Macrosporium kosarovii Bubák — по пиперъ: с. Конско (Кюстендилско) — 352[a], Бургазско — 165, Шуменско — 344, Кюстендилъ — 351, Образцовъ чифликъ — 21, с. Лесичери (Търновско) — 220, Бургазско, Кюстендилъ — 352, Садово — 262
Macrosporium nigricans Akt. — по Gossypium hirsutum: Садово — 254, 261.
Macrosporium parasiticum Thüm. — по лукъ: Търновско — 209, *$_{*}$* — 352[a], с. Мурадалларъ (Шуменско), Земледѣлското училище и зеленчуковитѣ градини край Шуменъ — 341; по лобода: *$_{*}$* — 352[a]; — по домати, празъ: с. Мурадалларъ (Шуменско), Земледѣлското училище и зеленчуковитѣ градини край гр. Шуменъ — 344.
Macrosporium peponicolum Rbh. — по диня: околноститѣ на София — 165; — по пъпешъ: около София — 167, 352, *$_{*}$* — 352[a].

Macrosporium solani Ell. et Mart. Syn. Sporidesmium solani varians Vahn., Alternaria solani Sorauer.
Macrosporium tabacinum Ell. et Ev. — по тютюна: *⁂* — 352[a].
Marasmius alliaceus (Jacq.) Fr. — по *⁂*: Рила — 203.
Marasmius alliatus Sch. — по земята: буковата гора на западъ отъ мина Плакалница — 82.
Marasmius cauticinalis (With.) Fr. — по сухи букови парчета: с. Пройновци (Габровско) — 81.
Marasmius ceratopus Pers. — по изгнили листа: Сухитѣ кумини, Витоша — 81.
Marasmius dryophilus (Bull.) Karst. Syn. Collybia dryophila (Bull.) Fr. — по земята: Витоша подъ в. Черната скала — 81.
Marasmius insititius Fr. — по акация: при гр. Свищовъ въ м. Стъкленъ — 81.
Marasmius oreades Bolt. — по земята: въ торфищата между мъховетѣ при хижата Алеко (Витоша) — 81, по пѫтя отъ гара Лакатникъ за с. Лакатникъ въ рѣдка букова гора — 82, буковата гора на западъ отъ мина Плакалница — 82.
Marssonia castagnei (Desm. et Mont.) Sacc. — по Populus alba L., Populus tremula L.: Кйошковетѣ при гр. Шуменъ — 344.
Marssonia graminicola (E. et E.) Sacc. Syn. Marssonia secalis (Oud.) Magn., Rhynchosporium graminicola Heins. — по ечемика: Опитното поле София — 348, 350, 352, 352[a].
Marssonia juglandis Sacc. Syn. Gnomonia leptostyla (Fr.) Cesat. et Not.
Marssonia potentilae (Desm.) Fuck. forma waldsteinina Bubàk et Malkoff — по Waldsteina agrimonioides: с. Бойково (Пловдивско) — 254, 261, *⁂* — 260.
Marssonia rosae (Bon.) Br. et Cav. Syn. Actinonema rosae (Lib.) Fr.
Marssonia secalis (Oud.) Magn. Syn. Marssonia graminicola (E. et E.) Sacc., Rhynchosporium graminicola Heins.
Marssonia thomasiana Sacc. — по Evonymus latifolius Scop.: Витоша — 131, 175.
Mastigospora album Riess. Syn. Dilophia graminis (Fuck.) Sacc., Dilophospora graminis Desm.
Melampsora agrimoniae D. C. — по Agrimonia sp.: Витоша — 351.
Melampsora allii-fragilis Klebhan — по Salix fragilis L.: Рила — 203.
Melampsora allii-salicis albae Klebhan — по Salix alba L.: Борисовата градина София — 159, Мездра — 335.
Melampsora euphorbiae (Schum.) Cast. — по Euphorbia nuda Vel.: Садово — 203; — по Euphorbia salicifolia Host.: при Лѫджене — 203.
Melampsora euphorbiae dulcis Otth. — по Euphorbia dulcis Jacq.: Баня Костенецъ — 203.
Melampsora helioscopiae (Pers.) Winter — по Euphorbia amygdaloides L.: Витоша — 336, с. Бойково (Пловдивско) — 252, 254, 261, р. Бъндерица (Пиринъ) — 334; — по Euphorbia nuda Vel.: София — 336, с. Бойково (Пловдивско) — 252, 254, 261; — по Euphorbia peplis L.: при с. Скриняно — 336, Банско — 334; — по Euphorbia cyparissias L.: Реброво, Ребърково (до Мездра) — 335; — по Euphorbia stricta L.: при Рилския монастиръ — 203.
Melampsora larici caprearum Kleb. — по Salix caprea L.: Бѣласица — 161.
Melampsora larici-populina Klebahn — по Populus pyramidalis Roz.: изъ София — 336; — по Populus balsamifera L.: двореца Врана — 336.
Melampsora lini Pers. — по Linum usitatissimum L.: Садово — 254, 261, 352[a]; — по Linum sp.: Пиринъ (Тодоринъ връхъ) — 334.
Melampsora mercuriali-tremulae Kleb. — по Populus canadensis Moench.: градината на гр. Самоковъ — 134.
Melampsora pinitarqua Rost. Syn. Caeoma pinitarqum A. Br.
Melampsora populina (Jack.) Lév. — по Populus nigra L.: Садово — 252, 254, 261.
Melampsora salicina Lév. — по *⁂*: *⁂* — 245.
Melampsora vitellinae (D. C.) Thüm. — по Salix amygdalina L., Salix fragilis L.: Садово — 252, 254, 261.
Melampsorella caryophyllacearum (D. C.) Schroet. Syn. Melampsorella cerastii, Pucciniastrum caryophyllacearum, Aecidium elatinum Alb. et Schw.
Melampsorella cerastii. Syn. Melampsorella caryophyllacearum (Schroet.), D. C., Pucciniastrum caryophyllacearum, Aecidium elatinum Alb. et Schw.
Melampsorella symphyti (D. C.) Bubàk — по Abies alba Mill: Ситняково, Чамъ Кория — 203.
Melampsoridium betulinum (Pers.) Klebh. — по Betula alba L.: Костенецъ — 203.
Melampyrum arvense L. — по *⁂*: изъ посевитѣ на с. с. Бѣлокопитово, Черенче, Новоселъ, Бухларъ, Сенебиръ и др. (Шуменско) — 344, 245.
Merulius lacrymans (Jacq.) Fr. — по джбова греда: Катедрата гр. Шуменъ — 344; — по пода: кжща въ София — 109, 80.

Microdiplodia naidenowi Bub. — по френско грозде: *$_{\text{sp}}$* — 352[a].
Microdiplodia vitigena Bubàk — по Vitis vinifera L.: Образцовъ-чифликъ — 79.
Microsphaera alni var. quercina Wall. Syn. Oidium quercinum Thüm. — по Quercus pedinculata Ehrh.: Витоша — 175; — по Quercus cerris L.: при гр. Бѣлоградчикъ — 228, около Германския монастиръ (Софийско) — 175; — по Quercus sp.: Делиорманъ — 344; — по Quercus pubescens Willd.: при гр. Бѣлоградчикъ — 228.
Microsphaera alphitoides Griff. et Maublank — по Quercus pubescens Willd.: Шуменъ — 203, — по джбъ: гр. Попово — 352[a], Садово, Шуменско, Е.-Джумайско, Т.-Сеймснско, околностьта на Ст.-Загора, Македония — 133.
Microsphaera alphitoides Griff. et Maublank. Syn. Oidium quercinum Thüm.
Microsphaera evonymi — по *$_{\text{sp}}$*: отъ Рилския монастиръ — 352[a].
Microsphaera grossulariae Lév. — по Ribes grossularia L.: Шуменското земледѣлско училище, овошния разсадникъ гр. Кула — 23.
Microstroma juglandis Sacc. — по ореха: *$_{\text{sp}}$* — 352[a], описана по материали включени въ сбирката на Централния зерледѣлски изпитателенъ институтъ София — 179.
Microthyrium macrosporium (Sacc.) Bubàk — по Buxus sempervirens L.: при Рилския монастиръ — 203.
Microthyrium microscopicum Desm. — по Rubus glandulosus Bell., Aristolochia clematitis L.: Чамъ Кория — 202.
Mollisia bulgarica Klika — по *$_{\text{sp}}$**$_{\text{sp}}$**$_{\text{sp}}$* — 202.
Monilia cinerea Bon. Syn. Sclerotinia cinerea Bon.—по сливи: Търновско, Тутраканско, Шуменъ, Образцовъ чифликъ — 219, Видинското земледѣлско училище, гр. Преславъ — 209, Добричкия разсадникъ: 215, Садово — 245, 254, 252, Тутраканска и Поповска околии — 220, с. с. Соволяно, Периволъ (Кюстендилско) — 165, *$_{\text{sp}}$*: *$_{\text{sp}}$* — 149; — по череши: Луковитъ — 219, с. Осмаръ (Преславско), Батошовскитѣ лозя (Бѣлоградчишко) — 215, Садово и околностьта — 240, с. Боровица (Бѣлоградчишко) — 220; — по вишни: Орѣховския разсаднакъ — 219, Садово — 245, 252, 254; *$_{\text{sp}}$*: *$_{\text{sp}}$* — 149; — по зарзали: Орѣховския разсадникъ — 215, Софня — 260; *$_{\text{sp}}$*: *$_{\text{sp}}$* — 149, Соволяно, Периволъ (Кюстендилско) — 165; по *$_{\text{sp}}$*: Садово — 244; — по Prunus cerasus: Садово — 261.
Monilia fructigena Pers. Syn. Sclerotinia fructigena (Pers.) Schr. — по ябълка: с. с. Соволяно, Периволъ (Кюстендилско), Ямболско — 165, Севлиево, Образцовъ чифликъ — 209, Търновско, Ловчанския разсадникъ, гр. Луковитъ — 219, Търновска околия, Севлиевския и Кулски овощни разсадници — 220, Тутраканско, с. Гурково (Видинско) с. Поповца (Габровско), с. Алдомировци (Софийско) — 215, Садово и околностьта — 240, 244, 245, 254, 252, 261, гара Скобелово (Чирпанско), с. Сливница (Софийско) — 246, Садово и навредъ въ страната — 149; — по круши: с. с. Соволяно, Периволъ (Кюстендилско), Ямболско — 209, Тутраканско — 215, Садово и околностьта — 240, 245, 252, 254, 261, Садово и навредъ въ страната — 149; — по дюли: гр. Ески Джумая — 209; — по сливи: Троянско — 244, Садово и околностьта — 240, 245, 252, 254, 261, Образцовъ чифликъ — 110, гара Скобелово (Чирпанско), Фердинандъ, Търново — 246; — по череши: Садово и околностьта — 240; — по овощни плодове: *$_{\text{sp}}$* — 260, гр. Харманлий — 253.
Monilia laxa Aderh. et Ruhl. Syn. Sclerotinia laxa Aderh. et Ruhl., Stromatinia laxa Fhrenb. — по зарзали: Търново — 220, Плѣвенъ, Орѣховския разсадникъ — 219.
Monilia lindhartiana Sacc. Syn. Stromatinia lindhartiana Prill. et Del., Sclerotinia cydonia Schellenb. — по дюла: Садово, Борисовградъ, Търново, Кюстендилъ — 294.
Morchella esculenta Bull. — по земята: Витоша надъ Боянския водопадъ — 81.
Morthiera Fuck. Syn. Stigmatea mespili Sor., Entomosporium mespili (D. C.) Sacc., Entomosporium maculatum (Lév.) Sor.
Mucor racemosus — по лоза: Видинско, Бѣлоградчишко, Севлиевско, Фердинандско — 220.
Mucor sp. — по плодъ отъ круша: Севлиевския овощенъ разсаднпкъ — 220.
Mycena denticulata Bilt — по сухо буково парче: горския склонъ на Витоша надъ с. Княжево — 81.
Mycena flavo-alba Fries. — по земята: Боровата гора надъ с. Княжево — 81.
Mycena nivea Quél. — по влажни тухли: София — 81.
Mycena pupa (Pers.) var. rosea Bull. — по земята: — Златнитѣ мостове (Витоша) — 81.
Mycosphaerella cerasella Aderh. Syn. Cercospora cerasella Sacc.
Mycosphaerella fragariae (Tul.) Lind. Syn. Ramularia tulasnei Sacc., Ascochyta fragariae Lib. — по ягода: Орхане — 351, *$_{\text{sp}}$* — 352[a].

Mycosphaerella maculiformis (Pers.) Schr. Syn. Cylindrosporium castanicolum (Desm.) Berl.
Mycosphaerella mori Lin. Syn. Phleospora mori Sacc., Cylindrosporium maculans Berl. — по черница: *$_{*}$* — 352[a].
Mycosphaerella sentina (Fr.) Schröt. Syn. Septoria nigerina Fuck., Septoria pyricola Desm. — по круша: *$_{*}$* — 352[a]; — по круша и ябълка: описана споредъ материали включени въ сбирката на Централния земледѣлски изпитателенъ институтъ София — 179.
Mycosphaerella tabifica (Pril. et Del.) John. Syn. Phoma betae Fr., Pleospora putrefaciens.
Mycosphaerella topografica Sacc. — по круша: *$_{*}$* — 352[a].
Mycosphaerella tulasni Janc. Syn. Cladosporium herbarum (Pers.) Link., Hormodendron cladosporioides Sacc.

N

Nectria cinnabarina (Tode) Fr. — по Viburnum lantana L.: гората около Германския манастиръ (Софийско) — 131. 175; — по круша: Царибродъ, 253, Севлиевския и Горно Орѣховския разсадници — 220; — по Corylus avellana L.: Витоша — 175, 336, 131; — по Aesculus hippocastanum L.: Витоша — 175, Борисовата градина София — 129; — по липа, кленъ: гората на с. Ясенково (Шуменско) — 344; — по ябълка: Троянско — 220; — по овощнитѣ дървета: *$_{*}$* — 352[a]; — по сливата и сроднитѣ ѝ костилкови видове: описана по материали включени въ сбирката на Централния земледѣлски изпитателенъ институтъ София — 177.
Nectria cucurbitula (Tode) Fries. — по Abies pectinata D. C.: Чамъ Кория — 175, 131.
Nectria ditissima Tul. — по зименъ джбъ: Генишъ Ада — 129, 131, 130; — по круша: Държавния разсадникъ гр. Елена — 165, Шуменско — 344, Ловечъ — 219, Севлиевския и Горно Орѣховския разсадници — 220; — по череша: Ловечъ — 219; — по сливи: Ловечъ — 219; — по овошнитѣ дървета: разсадника при Павлово (София) — 117[a], *$_{*}$* — 352[a]; — по Corylus avellana L.: Чамъ Кория — 130; — по Fagus silvatica L.: Рилски монастиръ — 203; — по сливата и сроднитѣ ѝ костилкови видове: описана по материали включени въ сбирката на Централния земледѣлски изпитателенъ институтъ София — 177.
Nectria episphaeria (Tode) Fries. — по *$_{*}$* — 202.
Nectria galligena Bres. — по обикновена леска: Чамъ Кория — 131; — по Corylus avellana L.: Чамъ Кория — 175; — по овощнитѣ дървета: *$_{*}$* — 352[a].
Nectriella rousseliana (Mont.) Sacc. — по Buxus sempervirens L.: при Рилския монастиръ — 202.
Noematelia encephala Willd Syn. Tremella encephala Willd.
Nyctalis asterophora Fr. Syn. Nyctalis lycoperdoides (Bull.) Schröt. — по Russula nigricans Bull. паразитна: джбовата гора надъ Елешничкия монастиръ — 82.
Nyctalis lycoperdoides (Bull.) Schröt. Syn. Nyctalis asterophora Fr.
Nummularia bulliardi Tul. — по Fagus silvatica L.: Рилския монастиръ — 202.

O

Oidium abelmoschi Thümen. Syn. Erysiphe cichoriacearum D. C.
Oidium crataegi Grisb. Syn. Podosphaera oxyacanthae (D. C.) de Bary.
Oidium dubium Jacz. Syn. Oidium quercinum Thüm. — по джба: цѣла България — 165, 167.
Oidium erysiphoides Fr. Syn. Erysiphe polygoni D. C. — по роза: Шуменското земледѣлско училище — 344.
Oidium farinosum Cook. Syn. Podosphaera leucotricha Salm.
Oidium leucoconium Desm. Syn. Sphaerotheca panosa (Wallr.) Lév.
Oidium moniloides Link. Syn. Erysiphe graminis D. C.
Oidium quercinum Thüm. Syn. Microsphaera alni var. quercina Wall., Microsphaera alphitoides Griff. et Maub., Oidium dubium Jacz. — по Quercus sesssiliflora Salisb., Quercus cerris L.: Фандаклийското сечище Генишъ Ада (Варненско) — 129; — по зименъ джбъ: Генишъ Ада, Князъ Борисовитѣ горски култури край София — 131, Берковска околия, Образцовъ чифликъ — 220; — по лѣтенъ джбъ: Берковска околия, Образцовъ чифликъ; — по церъ: Генишъ Ада, Князъ Борисовитѣ горски култури край София — 131; — по джба: Провадийския лесничейски районъ — 373, Русенско — 328, Делиормана, Памукчий, Кайкж (Шуменско) — 344, Садово, Македония, Ст. Загора, Шуменска, Ески Джумайска и Т. Сейменска околии — 345.

dium sp. — по тютюна: Варненско, Горно Джумайско — 352, Опитното поле София, Горна Джумая — 352[a].
dium sp. Syn. Uncinula necator (Schw.) Burr. — по лоза: Дивдядово и Осмаръ (Шуменско), гр. Шуменъ — 344.
dium tabaci Thüm. Syn. Erysiphe cichoriacearum D. C.
dium tuckeri Berk. Syn. Uncinula necator (Schw.) Burr. — по лоза: гр. Ески Джумая, Балчишко, Обретеникъ (Русенско) — 209, Орѣховския разсадникъ, Балчикъ и Каварна — 219, Садово и околностьта — 240, Тутраканско, Берковско, Лозовия разсадникъ Орѣхово — 215, Видинско — 220, Пловдивския окржгъ, Родопитѣ — 225, Панагюрище, Кюстендилъ, Русе, Бѣла, Ломъ и София — 352, Вратца, София — 309, 182.
pidium brassicae Dangeard. — по зеле: околностьта на София — 118.
mphalia leucophylla A. et S. — по земята: боровата гора надъ с. Княжево — 81.
phiobolus herpotrichus (Fr.) Sacc. Syn. Leptosphaeria herpotrichoides De Not. — по ечемикъ: Опитното поле Садово — 241, 245, 240; — по ржжь, пшеница, ечемикъ: *** — 352[a].
phiobolus vitalbae Sacc. — по ***: при Рилския монастиръ — 202.
robanche gracilis Sm. — по люцерна: Фердинандско — 375.
robanche minor Sutt. — по детелини: мерата на Кабиюкъ — 344.
robanche ramosa L. — по тютюна: Станимашко — 174, Кюстендилско — 165, Дупнишко — 100, с. Мурсалево, между Дупница и Горна Джумая — 317, Пловдивска и Пещерска околии — 253, с. Атмаджа (Тутраканско) — 219, Садово — 231, 245, Брацигово и нѣкои села Пловдивско — 248, 251, Орѣховица (Старо Загорско) — 240, Харманлий — 151; — по доматитѣ с. Аптаатъ (Добричко) — 215, Шуменъ — 351; — по зеле: Радомиръ, Нова Загора — 351, с. Наученъ (Ново Загорско), гр. Карнобатъ — 260.
robanche rubens Wallr. — по люцерна: Кабиюкъ — 344.
vularia alismatis Pas. — по Alisma plantago L.: Садово — 252, 254, 261.
vularia haplospora Speg. — по Alchemilla vulgaris L.: при Рибнитѣ езера — 262; — по Alchemilla montana Willd.: с. Бойково — 261, 254.
vularia obliqua Coke. — по Rumex crispus L.: с. Бойково (Пловдивско) — 254, 261.
vularia pussilla (Ung.) Sacc. — по Alchemilla vulgaris L.: при постъ Доганица — 336.

P

anaeolus campanulatus L. — по земята: джбовата гора около Елешнишкия монастиръ — 82.
anaeolus sphinctrinus Fr. — по земята: по пжтя отъ колибитѣ Бофъ до с. Женевъ, покрай долината на Бофската река — 82.
anus conchatus (Bull.) Fr. — по букъ, паразитно: буковата гора къмъ Габровския монастиръ — 82.
anus patellaris Fr. — чамови дъски, сапрофитно: ботаническата градина на Университета София — 82.
anus pudens Q. — по букови парчета: западнитѣ предѣли на Витоша — 81.
anus rubius Fr. Syn. Panus hirtus Secret. — сапрофитно върху отсеченъ дънеръ отъ глогъ: джбовата гора на западъ отъ Елешнишкия монастиръ къмъ с. Желява — 82.
anus rudis Fries. — по ***: Черепишъ, Алабакъ, Бѣлово — 203.
anus stypticus (Bull.) Fr. — по изгнили букови пжнове: по пжтя между селата Бофъ и Женевъ, по долината на Бофската река — 82.
armelia caperata L. — по сливитѣ: Кюстендилско — 36, 350, 352[a]; — по ***: Кюстендилско — 177.
assalora bacilligera (Mont.) Fr. var alnobetulae Jaap. — по Alnus viridis: Кобилно Бранище (Рила) — 262.
axillus unvolutus Batsch. — по земята: Боровата гора при Духовната семинария, София — 81.
enicillium glaucum Lk. — по ябълкитѣ: гр. Бѣлоградчикъ — 219.
eniophora cremea (Bres.) N. et L. — по Fagus silvatica L.: — Зеленишкия монастиръ — 203.
eniophora incarnata (Pers.) — по Alnus incana Moench.: Рилския монастиръ — 203.
eniophora laevis (Fr.) Burt. — по Corylus avellana L.: Рилския монастиръ — 203.
eniophora setigera Fr. — по Fagus silvatica L.: Рила — 203.
eridermium oblongisporium Kleb. Syn. Coleosporium senecionis (Pers.) Fr.
eridermium pini Wall. — по Pinus silvestris L.: Чамъ Кория — 131, 175; — по Pinus montana var. mughus Scop.: Чамъ Кория — 175.

Peridermium sp. — по бѣлъ боръ: Чамъ Кория — 129.
Peronospora alsinearum Caspary. — по Cerastium semidecandrum L.: Княжево — 336.
Peronospora alta Fuckel. — по Plantago major L.: при Черепишкия монастиръ — 203.
Peronospora brassicae de By. — по зеле: *⁎* — 352[a].
Peronospora effusa (Grev.) Roth. — по лобода: *⁎* — 352[a]; — по Atriplex hortense: с. Колешъ — 161, Садово — 252, 254, 261; — по щира (Atriplex): Садово — 240; — по Chenopodium album L.: Борисовата градина София — 336, с. Крета — 335.
Peronospora effusa Grev. var. minor Gasp. Syn. Peronospora minor (Gasp.) Gäum.
Peronospora grisea Ung. — по Veronica beccabunga L.: между Баня и Лѫджене — 203.
Peronospora minor (Gasp). Gäum. Syn. Peronospora effusa Grev. var. minor Gasp. — по Chenopodium album L.: при Дупница, Рилския монастиръ, Черепишкия монастиръ, гр. Троянъ и между Лѫджене и Ракитово — 203.
Peronospora parasitica (Pers.) de By. — по ⁎*⁎: ⁎*⁎ — 245; по рѣпата и шибоя (Cheirantus annuus) — 344.
Peronospora potentilla de Bary — по Potentilla ternata C. Koch: Пиринъ, къмъ Елъ Тепе: — 334.
Peronospora pratensis Sydow. — по Trifolium medium var. balcanicum Vel: при Чамъ-Кория: — 203.
Peronospora schachti Fuckel — по захарно цвекло: Околностьта на гр. Пловдивъ — 105: — по цвекло: *⁎* — 352[a].
Peronospora schleidenii Ung. — по лукъ: Търновско и с. Осмаръ (Преславско): — 209, Садово: 244, 246, 253, Търновско (с. Стамболово), гр. Плѣвенъ, Шуменско — 219, Фердинандско — 240, Бѣлоградчикъ и с. Душево — 352[a], с. с. Новоселъ, Надарево и пр. (Шуменско) — 344; — по червения лукъ: Плѣвенско — 172, Плѣвенско и Орхане — 352; — по Allium cepa L.: Садово — 252, 254, 261; — по чесана: с. с. Новоселъ. Надарево и пр. (Шуменско) — 344; — по *⁎*: *⁎* — 245.
Peronospora silvestris Gäum. — по Veronica urticaefolia Jacq: Криво Бърдо, Рила — 203.
Peronospora sordida Berk. — по Scrophularia nodosa L: Криво Бърдо до Рилския монастиръ — 203.
Peronospora trifoliorum de By. — по Medicago sp.: с. Айваджикъ и околностьта на гр. Сарай (Тракия) — 336; — по Medicago sativa L.: Садово — 240, 254, Пирдопъ — 244; — по Trifolium pratense L.: Пирдопъ — 252, 261; — по детелината: *⁎* — 352[a]; — по Coronila varia L.: Пиринъ (Дамяница) — 334; — по *⁎*: *⁎* — 245.
Peronospora viciae (Berk.) de By. — по Vicia narbonensis L. Садово — 245, 252, 254, 261; — по Vicia sativa L.: Оп. поле София — 184, 352; — по бакла: *⁎* — 352[a].
Peronospora violacea Berk. — по Knautia sp.: по пѫтя отъ с. Бойково къмъ с. Сотиръ — 262; — по Knautia arvensis var. rumelica: между Бойково и Сотиръ — 203.
Peronospora viticola de B. Syn. Plasmopara viticola Berlese et De Toni. — по лозата: *⁎* — 387; Пловдивъ, Ст. Загора, В. Търново, Т. Пазарджикъ и околноститѣ имъ — 119; Орѣховска и Бѣло-Слатинска околии — 263, всички окржзи въ България — 392, Станимака — 222, Белоградчишко, Видинъ, Ломъ, Берковица, Кюстендилско, с. Садово — 393; с. Соволяно (Кюстендилско) — 271, с. Типченица (Врачанско) — 306, всички лозарски центрове на страната — 342, Земл. училище Русе — 110, изъ цѣла България — 267, 269, 310, с. Водица (Поповско), Кулския държ. разсадникъ, Дрѣновски овощенъ разсадникъ, гр. Добричъ и околностьта, гр. Севлиево, гр. Бѣлоградчикъ и околностьта на с. Рабиша — 215, Кюстендилъ, Орхане, Русе — 351, Самоводене, Османъ Пазаръ, Добричъ и Пчеларово (Търновско), гр. Разградъ, Хърсово и Демерджилеръ, Ломска околия, Дрѣново, Берковица, Луковитска околия, Шуменско и Ески Джумайския лозовъ разсадникъ — 219, Плѣвенско, Никополско, Поповско, Силистренско, Балчишко, гр. Кула и с. Вели-Бей (Преславско) — 209, Станимашко, Видинско и др. — 165, изъ цѣла България — 335.
Pestalozzia guepini Desm. Syn. Prosthemium guepinium — по розитѣ: Шуменската градска градина — 344, *⁎* — 352[a].
Peziza aurantiaca Fl. Dan. — по сухи парчета отъ букъ: западнитѣ склонове на Витоша, къмъ с. Владая, околноститѣ на Габрово, Дрѣново, Севлиево, изъ Борисовата градина и по Люлинъ — 81.
Peziza coccinea Jacp. — по клонче и пѫнъ отъ букъ: гората с. Владая, с. Бѣлитѣ речки (Берковско), западнитѣ предѣли на Витоша — 81.
Peziza vesuculosa Bull. — по почвата: боровата гора задъ Семинарията, София — 81.
Phacidium plinthis Fr. — по Scirpus lacuster L.: Садово — 254, 261.
Phallus impudicus Linné. — по земята: Чамъ Кория — 109.

Thelipaea ramosa C. A Meg. — по тютюна: изъ Дели Ормана — 344. 351.

Thisisporus bissinus Schrand. — по падналитѣ клончета и листа: Боровата гора при Княжево — 80.

Thisisporus vulgaris Pers. — по букови клончета: западнитѣ предѣли на Витоша — 80; — по падналитѣ клончета: Люлинъ — 80.

Thleospora aceris Sacc. — по Acer pseudoplatanus L.: гората Петрохански проходъ, Берковско — 134.

Thleospora mori Sacc. Syn. Cylindrosporium mori Berl., Cylindrosporium maculans Berl., Fusarium maculans, Fusarium mori, Mycosphaerella mori, Septoria mori, Sphaerella mori — по черницата: Ески Джумая — 209; *** — 352-а.

Thleospora oxyacanthae Kunze et Schmidt. — по Crataegus oxyacantha L.: при Рилския монастиръ — 262.

Thleospora pseudoplatani Bubàk — по Acer pseudoplatanus L.: с. Бойково, Пловдивско — 254, 261.

Thleospora ulmicola (Biv.) Bernh. — по Ulmus campestris: при Рилския монастиръ — 262.

Thlyctaena magnusiana Bres. — по целината: *** — 352 а.

Tholiota togularis Fr. — по почвата: парка на Ботаническата градина на Университета София — 82.

Tholiota unicolor Bull. — по земята: боровата гора надъ Княжево — 81.

Thoma ampelocarpa Pass. — по лоза: Старо Загорско — 240, 352 а.

Thoma anethi Sacc. — по копара: *** — 352 а.

Thoma betae Fr. Syn. Mycosphaerella tabifica (Pril. et Del.) John., Pleospora putrefaciens — по Beta vulgaris: Садово — 252, 254, 261; — по захарно цвѣкло: Опитното поле Образцовъ-чифликъ — 219, Горно Орѣховско — 165, 176; — по кръмно цвѣкло: Образцовъ-чифликъ — 219: с. Самоводене (Търновско) и Оп. поле Образцовъ-чифликъ — 149, Садово — 246; *** — 352 а.

Thoma pomorum Thüm — по ябалкитѣ: Павловския разсадникъ, София — 305, 352 а.

Phragmidium albidum (Kühn) Ludw. — по Rubus caesius L. Владая — 159; — по Rubus glandulosus: Зеленишкия монастиръ, Криво Бърдо, Чамъ Кория — 203.

Phragmidium fragariastri (DC) Schröt. — по Potentilla micrantha Ram.: Витоша — 159, Албакъ при Бѣлово — 262, Черепишъ, Троянския балканъ, Алабакъ — 203; — по Potentilla patula W. Grab., с. Смоларе — 161; — по Potentilla fragariastrum Ehrh. (?) и Potentilla alba L.: Княжево, Царската ботаническа градина — 336; — по очеболеца: изъ ливадитѣ около с. Горна Баня, — 349.

Phragmidium intermedium Ung. — по капината: Садово и околностьта — 240, 245.

Phragmidium potentillae (Pers.) Winter. — по Potentilla sp.: малката мера на Кабиюкъ — 344, с. Чифли кьой (Цариградско) — 336; — по Potentilla canescens Bess.: Харманлий — 66; — Potentilla arenaria L.: Лозенъ Планина и при постъ „Казж-Клисе“ (Казълъ Агачко) — 336; — по Potentilla argentea L.: при Рилския монастиръ — 203, 262; — по Potentilla argentea L. var. angustisecta (Sauter): Витоша — 336.

Phragmidium rosa alpinae (DC) Schröt. — по Rosa alpina L.: Чадъръ Тепе при Мусала, Рила — 203.

Phragmidium rosae pimpinellifoliae DC. — по Rosa pimpinellifolia: между Лжджене и Ракитово, Алабакъ — 203.

Phragmidium rosarum — по розитѣ: Садово — 253, Карловско, Казанлъшко, Чирпанско — 240.

Phragmidium rubi (Pers.) Wint. — по Rubus caesius L.: около гр. Сарай, Витоша, Казичене, отъ Домузъ Дамларъ до Странджа (Тракия) — 336, изъ Искърското дефиле отъ Курилово до Мездра — 335, Беласица — 161, гората на с. Кюлевча и Марковча (Шуменско) — 344, с. Бойково (Пловдивско) — 203, 254, 261; — по Rubus sp.: Лозеница — 159; — по Rubus fruticosus L.: гората на с. Кюлевча и Марковча (Шуменско) — 344; — по Rubus corilifolius: Самоковъ — 203; — по Rubus glandulosus Bell.: Родопитѣ при Бойково — 203; — по Rubus nemorosus Heype: Садово и при Троянския монастиръ — 203.

Phragmidium rubi-idaei (Pers.) Winter — по Rubus idaeus L.: Витоша — 336, Рила, Криво Бърдо, Родопитѣ (Бойково), Чамъ Кория — 203; — по Rubus sp.: Пиринъ по м. Василаки — 335.

Phragmidium sanguisorbae (DC.) Schröt. — по Sanguisorba minor Scop.: Лакатникъ — 336.

Phragmidium subcorticium (Schr.) Winter. — по Rosa centifolia L.: Билото на Бѣласица — 161, Садово — 252, 261; — по Rosa dumentorum L.: Витоша — 159, Троянския монастиръ, Черепишъ, Бойково; — по Rosa sp.: Билото на Бѣласица — 161, Казанлъшко, Карловско, Русе, Стара Загора, Калоферъ — 121, 29, с. Новоселъ. гр. Шуменъ и кьошковетѣ — 344, Карловско, Казанлъшко, Чирпанско и др. — 244, Карлово — 351, Садово, с. Балджилари (Чирпанско), Срѣдна Гора — 240, навсѣкжде изъ розопроизводителнигѣ общини въ България — 60, Лакатникъ — 335, Карлово, Казанлъкъ, София — 352, Казанлъкъ — 171, 350, 351, 352[a], 108, Нова Загора — 149; — по Rosa damascena: Садово — 254, Татаръ Пазарджикъ — 203; — по Rosa canina L.: с. Якоруда — 331, Троянския Балканъ, Чамъ Кория — 203; — по Rosa corifolia L.: при Рилския монастиръ — 203; — по Rosa graveolens: Черепишъ — 203.

Phragmidium tuberculatum J. Müller. — по Rosa canina L.: с. Бойково (Пловдивско) — 203; по Rosa sepium Thuill.: Баня при Лѫджене, Бойково — 203.

Phragmidium tuberculinum U. Müller. — Rosa spinosissima L.: с. Бойково — 252, 254, 261.

Phragmidium violaceum (Schultz.) Wint — по капината: горитѣ Генишъ Ада и Петрохански проходъ, м. Ракинъ Рѫтъ (Берковско) — 134; — по Rubus fruticosus: с. Бойково (Пловдивско) — 252, 254, 261; — по Rubus nemorosus Heyne: Чирпанъ, Троянския монастиръ — 203; — по Rubus thyrsoideus Wimm.: при Троянския монастиръ, Бараклий — 203.

Phyllachora cynodontis (Sacc.) Niessl. — по Cynodon dactylon Pers.: Садово, 202, 252, 254, 261.

Phyllachora graminis (Pers) Fuck. — по Sorghum halepense Pers.: Садово — 252, 254, 262, 202.

Phyllachora trifolii (Pers.) Fuck. Syn. Polytrincium trifolii Kunze.

Phyllachora ulmi Winter. — по Ulmus campestris L.: с. Хаджиново (Станимашко) — 254, 261.

Phyllactinia corylea (Pers). Karst. Syn Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc. - по Corylus avellana L.. гората на Клисурския монастиръ, Чамъ Кория и Генишъ Ада — 134, 131, Лакатникъ, Мездра — 335, Кьошковетѣ — Шуменъ и с. Мурадалларъ — 344; — по Corylus colurna L.: гората на Клисурския монастиръ, Чамъ Кория, Генишъ Ада — 134; — по Fagus silvatica L.: гората Клисурския монастиръ, Чамъ Кория и Генишъ Ада — 134; — по Betula alba L.: Витоша — 336; — по Alnus glutinosa Gartn.: Казанлъкъ — 349.

Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc. Syn. P. corylea (Pers.) Karst.

Phyllosticta alni-glutinosae P. Sydow. — по елшата Alnus glutinosa Willd: около деретата на с. Бистрица (Софийско) — 349.

Phyllosticta baldensis G. Mass. — по Paeonia decora Andr.: Харманлий — 66, Минкова махала — 254, 261.

Phyllosticta basilici Brun. — по Ocymum basilicum: *$_{*}$* — 349.

Phyllosticta brassicae. Syn. Mycosphaerella brassicicola (Duby) Lind. — по зеле: Горна Джумая—352[a].

Phyllosticta briardi Bon. — по ябалки: Кюстендилъ — 352[a], изъ България — 179.

Phyllosticta buxi Sacc. — по Buxus sempervirens L.: Рилския монастиръ — 262.

Phyllosticta cerasicola Speg. — по черѣша: Казанлъшкия овощ. разсадникъ—349, *$_{*}$*—352[a].

Phyllosticta cornicola (D. C.) Rabenh. — по Cornus sanguinea L.: Садово — 252, 254, 261.

Phyllosticta cydoniae (Desm.) Sacc. — по дюлитѣ: Борисовата градина — 349, изъ България — 179, *$_{*}$* — 352[a].

Phyllosticta dzumajensis Bubàk — по Vitis vinifera L.: Ески-Джумая — 79.

Phyllosticta fabae Westd. — по баклата: Св. Константинъ при Варна — 209, *$_{*}$* — 352[a]; — по тютюна: Дупнишко — 163.

Phyllosticta fagi Audem. — по брѣза: горитѣ по Витоша — 131; — по Fagus silvatica L.: Витоша — 175.

Phyllosticta fragaricola Desm. et Rob. Syn. Sphaerella fragariae Sacc. — по ягодитѣ: Търновския овощ. разсадникъ — 219, Кулския разсадникъ — 220.

Phyllosticta fraxinicola Curr. — по Fraxinus excelsior L.: около Ломския разсадникъ — 349.

Phyllosticta hederae Sacc. et Rout. — по Hedera helix L.: при Рилския монастиръ — 262.

Phyllosticta helleborella Sacc. — по Helleborus odorus W. K.: Опитното поле София — 262.

Phyllosticta helleboricola Mass. — по Helleborus odorus W. K.: при Радуилъ — 262.

Phyllosticta helleborina Brun. — по Helleborus odorus W. K.: около Опитното поле при с. Горна-Баня — 349.

Phyllosticta juglandina Sacc. — по орѣха: гр. Казанлъкъ, с. Церово (Софийско) — 349, *$_{*}$* — 352[a], с. Стакьовци (Бѣлоградчишко) — 219, изъ България — 179.

Phyllosticta lappae Sacc. — по Lappa macrosperma: при Рилския монастиръ — 262.
Phyllosticta maculiformis Sacc. — по Fagus silvatica L.: държавната гора Петрохански проходъ (Берковско), Генишъ Ада — 134.
Phyllosticta mali Prll. et Delacr. — по Pyrus malus L.: Садово — 245, 252, 254, 261.
Phyllosticta malkoffii Bubák — по памука: Садово — 253, 257, 352, 260, Образцовъ чифликъ — 219, *.* — 352[a]; — по Gossypium herbaceum L.: Садово — 254, 261, 69.
Phyllosticta medicaginis (Fuckel) Sacc. — по Medicago sativa L.: Садово — 254, 261.
Phylosticta melanoplaca Thüm. — по Veratrum nigrum L.: Меча поляна до Петроханъ — 349; — по Veratrum album L.: при рибнитѣ езера въ Рила — 262.
Phyllosticta milenae Bubák — по Hedera helix L.: при Рилския монастиръ — 262.
Phyllosticta osteospora Sacc. forma quercus — по Quercus sessiliflora Salisb.: Садово — 254, 261.
Phyllosticta passerinii Berlese et Vogl. — по Prunus mahaleb L.: Агрономически факултетъ София — 349.
Phyllosticta paulowniae Sacc. — по Paulownia imperialis Sieb. et Zucc.: Шуменъ — 344; Кабиюкъ — 219.
Phyllosticta persicae Sacc. — по прасковата: *.* — 352[a]; — по овощнитѣ дървета: изъ сбирката на Центр. земл. изп. институтъ София — 177.
Phyllosticta phaseolina Sacc. — по фасула: Оп. поле София — 352, 352[a].
Phyllosticta polygonorum Sacc. — по Polygonum fagopyrum L.: Садово — 252, 254, 261.
Phyllosticta pruni — по слива: Вратца — 240.
Phyllosticta pruniavium Allesch. — по вишна и праскова: описана по материалъ включ. въ сбирката на Центр. земл. изпит. институтъ София — 177, 352[a].
Phyllosticta prunicola Sacc. — по черешитѣ и сливитѣ: разсадника гр. Добричъ — 215; — по череши и вишни: Балчишко — 215; — по сливата, вишната и зарзалата: описана по материали включени въ сбирката на Центр. земл. изпит. институтъ София — 177, 352[a]; — по сливата: Държ. овощ. разс. гр. Шуменъ — 209, Садово — 244, Садово и околностьта — 240, 245.
Phyllosticta pruni domestica Vog. — по слива: *.* — 352[a].
Phyllosticta pyrina Sacc. — по круша: Садово: 244, 240, 246, описана по материали вкл. въ сбирката на Центр. земл. изп. институтъ София — 179, 352[a]; — по Pyrus communis: Садово — 252, 254, 245, 261; — по слива: Троянско — 220.
Phyllosticta quercus Sacc. et Speg. — по Quercus sessiliflora Salisb.: Садово — 252.
Phyllosticta ruborum Sacc. — по Rubus idaeus: Садово — 252, 254, 261.
Phyllosticta syringae Westend — по Syringa vulgaris L.: парка на Казанлъшкия разсадникъ — 349.
Phyllosticta tabaci Pass. — по тютюнъ: с. с. Абоба и Сенебиръ — 344, *.* — 31, Добричко — 209, Хасково — 240, Дупнишко, с. Меше Махле (Тутраканско) — 219, Ловечъ — 351, Станимашко — 174, Ловечъ, Шуменъ, Горна-Джумая — 352, Т.-Пазарджикъ, Пловдивъ, Ст.-Загора, В. Търново и околноститѣ имъ — 119, Харманлий, Рила — 352[a], гр. Дупница, Баланово, Палатово (Хасковско), Ловешко, Горно-Джумайско — 165, Хасково — 252, *.* — 245.
Phyllosticta trifolii Rich. — по детелина: Кабиюкъ, малката мера — 344, 352[a].
Phyllosticta ulmi West. — по Ulmus montana: при Бѣлово — 262.
Phyllosticta vindabonensis Thüm. — по зарзалитѣ: *.* — 352[a], 219, Садово и околностьта — 240, описана по материали включени въ сбирката на Централния земл. изпит. институтъ София — 177; — по зарзали и каисии: Шуменъ — 344; — по праскови: Ломъ — 253; — по *.*: *.* — 245.
Phyllosticta vitis Sacc. — по лоза: Орѣховския лозовъ разсадникъ — 219, 352[a].
Phyllosticta vulgaris — по Viburnum opulus L.: Чамъ Кория — 134.
Phytophthora infestans de Bary — по картофи: Шуменската гимназия — 344, Търновско — 219, Ситово, Бойково, Садово — 252, 254, Търновска, Бѣлоградчишка околии — 220, Пирдопъ, София, Казанлъкъ, Самоковъ — 352, Пирдопъ, София — 184, Самоковъ, Попово и Садово — 352[a], Садово, Родопитѣ, Срѣдна гора и др. — 253, опитното поле Садово — 59, 149, 150, 198, 260, Садово — 261.
Phytophthora nicotianae Breda de Haan — по тютюнъ: с. Рила, Дупнишко — 48.
Phytophthora omnivora de Bary — по Pinus silvestris L.: гр. Тръновъ — 143.
Plasmodiophora brassicae Woronin — по зеле: Енево, Имрихоръ (Шуменско) — 344, военнитѣ зеленчукови градиии задъ Вайсовата мелница София — 318, Берковско — 215, Софийско — 352, градината на Агрономическия факултетъ — 118, *.* — 352[a].

Plasmodiophora vitis Viala et Sauv. — по лоза: с. Бѣла Черква (Търновско) — 219.
Plasmopara cubensis Ham. Syn. Pseudoperonospora cubensis Rostow. — по листата на тиква: *‸* — 352[a].
Plasmopara densa Rabenh. — по Rhinanthus angustifolius L.: Юндола — 334.
Plasmopara nivea (Unger) Schröt — по Pastinaca hirsuta Panč: Юндола — 334; — по анасонъ: Садово — 184, 352, *‸* — 352[a]; — по Aegopodium podagraria L.: при Баня Костенецъ — 262, при Костенецъ, Бойково, Рилския монастиръ, Криво бърдо — 203.
Plasmopara pusilla (de Bary) Schröt. — по Geranium silvaticum L.: Пиринъ — Василаки — 334; — по Geranium sp.: при Рилския монастиръ — 262.
Plasmopara viticola Berlése et de Toni. Syn. Perenospora viticola de Bary — по лоза: Дивдядово. Осмаръ, Шуменъ — 344, Видинско, Бѣлоградчишко, Севлиевско - 220, Садово — 245,253,252,254,261,240, Станимашко, Видинско, Старо-Загорско, Русенско, Кюстендилско, Орхане, София — 352, с. Водица (Поповско), Кулския Държ. разсадникъ, Дрѣново, Държ. ов. разсадникъ, Добричъ и околностьта, Севлиево, Бѣлоградчикъ, с. Рабиша — 215, Дълбокъ Долъ, Пазарджикъ — 352[a], описана по материали, включени въ сбирката на Цанр. земл. изп. институтъ София — 182, с. Скриняно, София — 336, Садово и Долна Кремена (Вратчанско) — 246.
Pleospora avenae Died. Syn. Helminthosporium avenae Br. et Cav. — по овеса: *‸* — 352[a].
Pleospora (Pyrenophora) flavo-fusca Feltg. — по Clematis vitalba L.: Рила — 202.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh. — по Clematis vitalba L.: при Рилския монастиръ — 202; — по Cichorium intybus L.: Кочариново — 202.
Pleospora hispida Niessl. — по Clematis vitalba L.: при Рилския монастиръ — 202.
Pleospora media Niessl. — по Chondrilla juncea L.: Баня Костенецъ 202.
Pleospora putrefaciens. Syn. Sporidesmium putrefaciens Fuch. — по цвекло: описана по материали включени въ сбирката на Центр. земл. изпит. институтъ София — 176.
Pleospora putrefaciens. Syn Phoma betae Fr., Mycosphaerella tabifica (Prill. et Del.) John.
Pleurotus acerosus Er. — по земята: боровата гора надъ Княжево — 81.
Pleurotus almeni Er. — по дънеръ отъ Abies excelsa Link: при Рилския монастиръ — 203.
Pleurotus cornu copioides P. — по Fagus silvatica L.: Алабакъ и Бѣлово — 203.
Pleurotus dryinus Pers. — по джбови траверси сапрофитно: спирка Робертово — 82.
Pleurotus fimbriatus Fr. — по сухо буково клонче: с. Пройновци (Габровско) — 81.
Pleurotus limpidus Fr. — по кората на букъ: Западнитѣ дѣлове на Витоша — 81.
Pleurotus palmatus Bull. — по изгнило буково парче: Гората при Златнитѣ мостове, Витоша — 81.
Pleurotus planus A. et S. — по буковъ пънъ: около Черепишкия монастиръ; — по сухо буково клонче: монастирската гора при Габровския монастиръ; — по отсеченъ джбовъ пънъ: надъ с. Лисецъ, Габровско — 81.
Pleurotus renifomis Fr. — върху кората на черница: Бунарджика, Пловдивъ — 81.
Pleurotus septicus — по *‸*: Батакъ — 203.
Pleurotus spodoleucus Fr. — по отсеченъ джбовъ дънеръ, сапрофитно: на истокъ отъ Елешничкия монастиръ къмъ с. Потопъ — 82.
Pleurotus striatulus Pers. — по изгнило буково парче: Златнитѣ мостове, Витоша — 81.
Pluteus exiguus Pat. — по изгнилъ буковъ пжнъ: по коритото на рѣка Петровичка — Витоша — 81.
Pluteus pellitus (Pers.) Fr. — по стари греди: монастира при с. Струпецъ, Вратчанско — 81; — по джбовитѣ гори около монастира Св. Богородица при с. Елешница, къмъ с. Потопъ на истокъ и къмъ с. Желява на западъ — 82.
Podacrea cornu-damae (Pat.) Lindau — по земята: София — 82.
Podosphaera leucotricha Salmon. Syn. Oidium farinosum Cook., Sphaerotheca mali Burr. — по ябалкитѣ: с. Сливница и Панагюрище — 172, Лозовия разсадникъ гр. Ловечъ, Балчишко — 215, Панагюрище, Габрово, Пещера, Станимака, с. Сливница (Софийско) — 352, Панагюрище и Габрово — 352[a]; — по ябълки и круши: описана по материали включени въ сбирката на Центр. земл. изпитателенъ институтъ София — 179.
Podosphaera myrtillina Kunze — по Vaccinium myrtillus L.: при Бойково (Пловдивско) — 203.
Podosphaera oxyacanthae (D. C.) de Bary. Syn. Oidium crataegi Gr. — по ябалката: Садово — 254, 261; — по дюля: Панагюрище — 352[a], описана по материали включени въ сбирката на Центр. земл. изпит. институтъ София — 179; — по дюли и глогъ: гр. Шуменъ и лозята му — 344.

Podosphaera tridactyla de By. — по слива: с. Овчарово (Шуменско) — 344, *$_{*}$* — 352 a ; — по сливата, черешата, зарзалата: описана по материали включ. въ сбирк. на Центр. земл. изп. инст. София — 177.

Podosphaeria mali — по ябалка: с. Лозно (Кюстендилско) — 253.

Polyporus abietinus (Dicks.) Fries. — по буковъ пънъ: Черепишкия монастиръ — 80; — по Picea xcelsa Link: Баташката държавна гора — 134; — по Abies excelsa: въ горитѣ на Рилскитѣ планини — 203.

Polyporus amorphus Fr. — по сухи клонки отъ Pinus nigricans Host.: боровата гора София — 80.

Polyporus annosus Fr. Syn. Trametes radiciperda R. Hart. — по изгнило смърчово стебло: при хижата Златнитѣ мостове, Витоша — 80; — по бѣла мура: Чамъ кория — 80.

Polyporus applanatus Pers. — по върба: шосето за Княжево при Павлово — 80.

Polyporus arcularius Batsch. — по букъ: Витоша, западнитѣ предѣли къмъ с. Владая, Златнитѣ мостове, с. Симеоново, София — 80.

Polyporus betulinus Bull. — по отсеченъ брезовъ пънъ: с. Бояна — 80; — по брѣза: Борисовата градина София — 129, Кн. Борисовитѣ горски култури край София, Чамъ Кория — 131.

Polyporus borealis Vahl. — по *$_{*}$*: Рила, Крива рѣка — 203.

Polyporus brumalis Pers. — по букови парчета: Витоша — 80; — по умрѣли клоне и траверси: с. Владая, ж. п. линия къмъ с. Владая — 80.

Polyporus caesius Sch. — по букъ: надъ с. Княжево — 80.

Polyporus cinnabarinus Jacq. — по *$_{*}$*: западнитѣ горски склонове на Витоша — 80.

Polyporus colceolus Bull. — по буковъ пънъ: гората на Габровския монастиръ — 80.

Polyporus connatus Fr. — по буковъ клонъ: Витоша къмъ Сухитѣ кумини — 80.

Polyporus corticola Fries. — по мъртви клоне отъ Crataegus sp.: при Черепишкия монастиръ — 203.

Polyporus dryadeus Fries — по Quercus sessiliflora Smith.: гората Генишъ Ада — 129, 131.

Polyporus ferruginosus Schr. — Fagus silvatica L.; държавната гора Петрохански проходъ (Берковско) — 134.

Polyporus fulva Fr. — по череша: шосето Свищовъ—Търново — 80.

Polyporus fomentarius (L.) Fries. — по буковъ пънъ: монастирската гора на Габровския монастиръ, Кокалянския монастиръ — 80, гората на с. с. Дживелъ и Хърсово (Шуменско) — 344, буковата гора на западъ отъ мина Плакалница — 82, с. Бойково (Пловдивско) — 252, 254; — по Fagus silvatica L.: с. Бойково (Пловдивско) — 261, Държавната гора Петрохански проходъ (Берковско) — 134; — по Ulmus effusa Willd.: Лонгоза — 131, 129; — по джба: с. Бойково (Пловдивско) — 252, 254; — по Quercus cerris L., Q. pedunculata Ehrh.: Лонгоза — 129.

Polyporus fucatus Q. — по стебло на сливи: с. Водици, подъ Габровския манастиръ — 80.

Polyporus fulvus Scop. Syn. Fomes fulvus Scop. — по засъхващи и загнили стебла отъ Abies pectinata D. C.: Баташката държавна гора м. Беглика — 134; — по повалени стебла и пънове отъ Fagus silvatica L.: държавната гора Петрохански проходъ (Берковско) — 134; — по джанка: — 352 a, описана по материали включени въ сбирката на Централния земледѣлски изпитателенъ институтъ София — 177; — по Prunus armenica L.: Севлиево — 203; — по Prunus domestica: Зеленика — 203; — по ябълката: описана по материали включени въ сбирката на Централния земледѣлски изпитателенъ институтъ София — 179.

Polyporus fumosus (Pers.) Fries. — по Quercus sp.: Черепишъ — 203.

Polyporus hartigii All. — по ела: Чамъ Кория — 131; — по Abies pectinata D. C.: Чамъ Кория — 175.

Polyporus hirsutus Wulf. — по акация: гробищата на гр. Свищовъ — 80; — по букъ: около Вършецъ, Витоша, Паша-Бунаръ — 80; — по отсеченъ пънъ отъ боръ: околноститѣ на Варна — 80; по кората на дърветата: Керсенликъ (Еленско) — 80, Мургашъ планина — 82, Алабакъ, Рилския и Зеленишкия манастири — 203.

Polyporus igniarius, L. Syn. Fomes igniarius (L.) Fries — по Populus tremula L.: Князъ Борисовитѣ горски култури — 131; — по лѣтенъ джбъ: Лонгоза — 131; — по букъ: Якорудската държавна гора Мѣста — 131; — по сливата: Кюстендилско — 36, *$_{*}$* — 352 a, Шуменско — 344; — по сливата, крушата, ябълката, орѣха, вишната и черешата: описана по материали включенн въ сбирката на Централния земледѣлски изпитателенъ институтъ София — 177, 179; — по Salix alba L.: Садово — 254, 261, 252; — по *$_{*}$*: Рила — 203.

Polyporus imbricatus Bull. — по дѫбовъ пѫнъ: подъ Габровския монастиръ при чарковетѣ — 80.
Polyporus lucidus (Leyss.) Fr. — по дѫбови дънери: с. Папазли, с. Цинга (Дрѣновско), околноститѣ на Османъ Пазаръ и Карнобатъ — 82.
Polyporus medulla panis Fries — по пѫнъ отъ дѫбъ: Генишъ Ада — 134.
Polyporus montanus Quél. — по земята: Свети Лука (Рила) — 203.
Polyporus neesii Fr. — по сухи клоне: Златнитѣ мостове, Витоша — 80.
Polyporus officinalis (Vill.) Fr. — по букъ паразитно: Златнитѣ мостове, Витоша — 82.
Polyporus perennis L. — по земята: къмъ Златнитѣ мостове, Витоша — 80.
Polyporus pergamenens Fr. — по *⁎*: Троянския и Зеленишки балкани — 203.
Polyporus picipes Fr. — по паднали клончета: източния склонъ на Люлинъ — 80.
Polyporus radiatus Sow. — по повалени дървета отъ букъ: общинската гора с. Ракитово, м. Стояново Дере, Чепинско — 134, Черепишъ — 203.
Polyporus ribis Fr. Syn. Xantochrons ribis — по роза: Казанлъшко — 172, на всѣкъде изъ Розовата долина — 352, *⁎* — 352[a]; — по Ribes rubrum L.: Шуменско — 344.
Polyporus sp. — по земята: сѣнчестия пѫть на малкия пѣсъкъ въ Чамъ Кория — 109,
Polyporus squamosus Huds. — по букъ: монастирската гора при Габровския монастиръ — 80. Чамъ Кория — 134; — по дѫбъ: изъ горитѣ на с. Хърсово (Шуменско) — 344.
Polyporus sulphureus (Bull.) Fr. Syn. Polyporus candicinus Schroet. — по акация: Ботаническата градина на Университета София — 80; — по пѫнъ отъ дѫбъ: Генишъ Ада — 134; — по върба: с. с. Каспичанъ, Имриховъ (Шуменско) — 344; — по киселица: Дьовленъ — 352[a]; — по вишна: *⁎* — 352[a]; — по вишна и круша: описана по материали включени въ сбирката на Централния земледѣлски изпитателенъ институтъ София — 177, 179; — по Morus alba L.: Садово — 252, 254, 261.
Polyporus ungulatus Schaeff. — по Abies excelsa Link: Чамъ Кория — 203.
Polyporus vaporarius Fries. — по Pinus silvestris L.: Чамъ Кория — 129, 131; — по Picea excelsa Lk.: Баташката държавна гора м. Беглика — 134.
Polyporus velutinus Fr. — по букъ: Якорудската държавна гора Места — 131, Витоша — 80; — по глогъ: западно отъ с. Лисецъ — 80; — по сухо стебло отъ лешникъ: надъ с. Княжево — 80; — по Betula pubescens Ehrh., изсъхнали екземпляри: Князъ Борисовитѣ горски култури край София — 134; — по дѫбъ: Генишъ Ада — 134.
Polyporus versicolor Fries. — по дѫба: надъ с. Княжево — 80, Генишъ Ада, Коджа баланъ, Рошковица (Бургазско) — 129; — по *⁎*: Севлиево, Рилския монастиръ — 203; — по Fagus silvatica L.: държавната гора Петрохански проходъ (Берковско) — 134; — по отсеченъ буковъ пѫнъ: около Габровския монастиръ — 80; — по габъръ: надъ с. Лисецъ (Габровско) — 80; — по *⁎*: край Варна — 80.
Polyporus viridans B. et Br. Syn. Poria viridans Berk. et Br. — по чамови дъски сапрофитно: парника на Ботаническата градина на Университета София — 82.
Polyporus zonatus Fr. — по отсеченъ буковъ пѫнъ: Черепишкия монастиръ — 80.
Polystictus hirsutus (Wulf) Fr. — по буковъ пѫнъ: въ гората при колибитѣ на с. Бовъ и Желенъ, Витоша — 82.
Polystigma ochraceum (fulvum) Wahl. Sacc. — по бадемитѣ: Шуменъ — 344, 352[a].
Polystigma rubrum Tul. — по слива: Ловчанско, с. Казаларъ (Поповско), Орѣховския лозовъ разсадникъ, с. Стакевци (Бѣлоградчишко), Берковско, Вратчанския лозовъ разсаднпкъ, Горно Орѣховско, Балчишко, Ески Джумайско, Търновския разсадникъ, Търновско, Луковитска и Тетевенска околии, Плѣвенско, Ломскиятъ разсадникъ, Кулския овощенъ разсаднихъ, Севлиевско, Тутраканъ — 219, Троянско — 244, Кулския овощенъ разсадникъ — 260, Шуменско — 344, Бѣлоградчишка и Добричка околии — 209, Белоградчишко — 30, Кюстендилско — 36, Садово и околността — 240, Кулския овощенъ разсадникъ, гр. Преславъ, околността на Берковица, с. Гурково (Видинско), с, Влаховичъ (Бѣлоградчишко), гр. Балчикъ, Тетевенска околия — 215, Севлиевския и Кулски овощни разсадници, с. Старопатица, Раковица и гр. Кула, Държавния разсадникъ при с. Гурково (Видинско), Луковитска и Тетевенска околии, Берковско, Руженци, Боровица и гр. Бѣлоградчикъ, Троянско, Поповско, Севлиевско, Ломския и Горно Орѣховския разсадници — 220, с. Осиковска Лакавица (Орханийско), Габровско и Габровския монастиръ, Севлиевско — 246, с. Алломировци (Софийско) и гр. Босилеградъ — 253, Садово — 149, Татаръ Пазарджикъ, Пловдивъ, Ст. Загора, В. Търново и околноститѣ имъ — 119, Земледѣлското училище Образцовъ чифликъ — 110, Луковитско и Дрѣновско — 32[a], отъ разни мѣста изъ страната 352, 352[a]; — по Prunus domestica: изъ цѣлото искърско дефиле — 335,

с. Кюлешино — 161, Садово, Троянъ, Търново, Севлиево — 252, 254, 245, 261, Софийско, Кюстендилско — 336; — по сливата и черешата: *$_{*}$* — 352[a]; — по сливата, зарзалата, бадема: описана по материали включени въ сбирката на Централния земледѣлски изпитателенъ институтъ София — 177, с. Сливница, гр. Кюстендилъ — 351.

Polythrincium trifolii Kunze Syn. Phyllachora trifolii (Pers.) Fuck., Plowrigthia trifolii Kil. — по детелина: Опитно поле София — 348, *$_{*}$* — 352[a]; — по Trifolium elegans Savi.: Садово — 66; — по Tr. repens: Садово — 252, 254, 261; — по Tr. incarnatum L.: Своге — 335; — по Tr. alpestris L.: навсѣкждe изъ Пиринъ — 334; — по Tr. meneghinianum Clem., Tr. montanum L.: Шуменско — 344.

Poria ferruginosa Schrand — по смърчъ: Якорудската гора — 131; — по зименъ джбъ: Генишъ Ада — 131, 129.

Poria viridans Berk. et Br. Syn. Polyporus viridans B. et Br.

Prosthemium Guepinium Syn. Pestalozzia guepini Desm. — по розитѣ: Шуменска градска градина — 344.

Psalliota campestris L. Syn. Agaricus edulis Bull.

Psalliota comtula Fr. — по земята: с. Пройновци (Габровско) — 81.

Psathyrella crenata Lasch. — по земята: Сухитѣ камани, Витоша — 81.

Psathyrella gracilis Fr. — по земята: София — 81

Pseudomonas phaseoli — по фасула: Шуменъ — 351.

Pseudomonas sesami Malkoff — по сусама: Садово — 244, 246, 253, 260, 149, 254, Харманлийска, Търново-Сейменска, Хасковска, Казълъ Агачска околии — 240, Айтосъ, Свиленградъ — 351, Айтосъ, Свиленградъ, Елхово — 352.

Pseudoperonospora cubensis Rostow. Syn. Plasmopara cubensis Ham.

Pseudopeziza medicaginis (Lib.) Sack. — по Medicago sativa L.: Садово — 254, 252, 261.

Pseudopeziza trifolii (Bernh.) Fuck., Syn. Sporonema phacidioides Desm. — по детелината: *$_{*}$* — 352[a], 202; — по люцерната: Садово 244.

Pseudoplectania nigrella (Pers.) Fuck. — по земята: боровата гора задъ Семинарията, София — 81.

Psilocybe atrorufa Sch. — по земята: боровата гора надъ Княжево — 81.

Puccinia absynthii D. C. — по Artemisia absynthium L. Садово — 254, 261, Черепишкия монастиръ, Мездра — 335, Черепишъ — 203; — по Artemisia vulgaris L.: Елисейна — 335; — по Artemisia abrotanum L.: Зеленишки край, Троянъ — 203.

Puccinia acetosae (Schum.) Körn. — по Rumex acetosella L.: по билото на Бѣласица — 161, Рилския монастиръ — 203, 262.

Puccinia actaeae-agropyri E. Fisch. — по Actaea agropyri: Чамъ Кория — 203.

Puccinia agropiri Ell. et Ev. — по Triticum junceum: Садово — 253; — по Triticum repens: Черепишъ — 203; — по Clematis vitalba L.: Чамъ Кория, Рила — 203; — по Clematis viticella: колонията Свети Лука при Рилския монастиръ — 262.

Puccinia alli Dr. Rudolphi — по Allium sativum L.: гр. Струмица — 161; по чесъна: *$_{*}$* — 352[a].

Puccinia angelicae (Schum.) Fuckel. — по Angelica silvestris L.: Рила, (Криво Бърдо) — 203.

Puccinia annularis (Strauss) Schl. Wint. — по Teucrium chamaedrys L.: София — 159, по течението на реката Бъндерица — 334, Черепишъ — 203.

Puccinia arenariae (Schnm.) Winter. — по Stellaria nemorum L.: задъ Борисовия постъ — 161, Чамъ Кория — 262, Костенецъ, Рила (Крива рѣка), Чамъ Кория — 203; — по Stellaria media Will.: Университетската градина при медицинския паметникъ София — 336; — по Moehringia trinervia Clairv.: Рилския монастиръ, Долна Ломница — 262, Рила, Криво Бърдо — 203.

Puccinia argentata(Schultz) Winter. — по Impatiens noli tangere L.: при Костенецъ Баня — 262, Костенецъ, Чамъ Кория — 203.

Puccinia asarina Kze. — по Asarum europaeum L.: Пиринъ до Дамяница — 334.

Puccinia asparagi D. C. — по Asparagus officinalis L.: Садово — 261, 254, 245, 262, 352[a].

Puccinia atragenes Hausman. — по Atragene alpina L.: Чамъ Кория 203.

Puccinia balsamitae (Strauss) Rabh. — по Tanacetum balsamita L.: Витоша — 159, Зеленишки монастиръ — 203, Опитното поле София — 352[a].

Puccinia bardanae Corda — по Lappa major Gaer.: Витоша — 159; — по Lappa sp.: при Рилския монастиръ — 262.

Puccinia baryi (Berk. et Br.) Wint. — по Brachypodium silvaticum R. S.: Бойково: (Пловдивско) — 203.

Puccinia bromina Erikss. — по Bromus sterilis L.: Садово — 252, 254, 261.
Puccinia bullata (Pers.) Wint. — по Peucedanum alsaticum L.: Клептуза надъ Баня Чепино — 262, Баня при Лѫджене — 203.
Puccinia bupleuri-falkati (D. C.) Winter — по Bupleurum falcatum L.: Люлинъ — 159; — по Bupleurum apiculatum Friv.: при Шуменъ — 66, 203.
Puccinia buxi D. C. — по Buxus sempervirens L.: изъ градинитѣ на гр. Шуменъ — 344.
Puccinia caricis (Schum.) Reb. — по Urtica dioica L.: Владая — 159, Своге — 335.
Puccinia caricis frigidae Ed. Fischer — по Carex leporina L.: Шуменско — 344.
Puccinia caricis-montanae E. Fischer — по Centaurea Jacea L.: Владая — 80.
Puccinia carlinae E. Jaeky — по Carlina vulgaris L.: Своге — 335; — по Carlina longifolia Rchb.: *$_{*}$* — 68.
Puccinia caryophyllearum Wallr. — по *$_{*}$*: *$_{*}$* — 245.
Puccinia celakovskyana Bubàk — по Galium cruciata Scop.: Цереса при Рилския монастиръ — 262, Рила, Троянския монастиръ — 203, Владая — 159, Бѣласица — 161, Пиринъ по р. Бъндерица — 334.
Puccinia centaurea D. C. — по Centaurea jacea L.: боровата гора при Княжево — 159; — по Centraurea nervosa Willd.: боровата гора при Княжево — 159, с. Бойково (Пловдивско) — 252, Черепишкия монастиръ, Мездра — 335; — по Centaurea iberica Fr., Centaurea panonica Heuff.: София — 336; — по Centaurea maculosa Lam.: Казичене — 336, Своге, Елисейна — 335; — по Centaurea stenolepis A. Kern.: Баня при Лѫджене — 203; — по Centaurea chrysolepis Vis., Centaurea diffusa Lam.: Черепишъ — 203.
Puccinia cerasi Cast. — по череша: *$_{*}$* — 352[a], описана по материали включени въ сбирката на Центр. земл. изп. институтъ София — 177.
Puccinia cesatii Schröter — по Andropogon ischaemum L.: при с. Бояна — 262, Долна Баня, Костенецъ, Алабакъ, Черепишъ — 203.
Puccinia chaerophylli Purton — по Chaerophyllum sp.: при Рилския монастиръ — 262; — по Chaerophyllum aureum: Рила — 203.
Puccinia chondrillae Corda — по Lactuca muralis L.: Долна Ломница, близо до Рилския монастиръ — 262, Чамъ Кория — 203, Витоша — 336.
Puccinia cichorii (D. C.) Bel. — по Cichorium intybus L.: Реброво, Лакатникъ — 335.
Puccinia circaeae Pers. — по Circaea lutetiana L.: при Троянския монастиръ — 203.
Puccinia cirsii Lasch. Syn. Puccinia suaveolens Rostrup. — по Cirsium appendiculatum Grisb.: Рила — 203; — по Cirsium arvense L.: Шуменското земледѣлско училище, с. Абоба — 344, с. Тарфа до Дерковското езеро (Цариградско) — 336, София — 159, Церово — 335.
Puccinia cirsii-eriophori E. Jacky — по Cirsium eriophorum Scop.: с. Драгалевци (Софийско) — 336, Лакатникъ — 335.
Puccinia cirsii lanceolati Schröter — по Cirsium lanceolatum Scop.: Садово — 254, 261, Княжево — 159, Черепишъ, Троянския монастиръ — 203.
Puccinia cirsii oleracei Pers. — по Cirsium appendiculatum Grsb.: с. Бойково (Пловдивско) — 254, 261.
Puccinia cirsium Lasch. — по Cirsium appendiculatum Grsb.: Пиринъ по Бъндерица — 334;
Puccinia cnici-oleracei Pers. — по Cirsium appendiculatum Grsb.: Долна Ломница при Рилския монастиръ — 262, Рилския монастиръ, Ситняково, Демиръ Капия — 203; — по Cirsium oleraceum Scop.: Рила — 203.
Puccinia conglomerata (Strauss) Kunze et Schw. — по Homogyne alpina Cass.: Черно езеро (Рила) — 203.
Puccinia conii (Strauss) Fuck. — по Conium maculatum L.: Банско — 334.
Puccinia convolvuli (Pers.) Cast. — по Calystegia sepium L.: Габровско и с. Колишино — 131, Садово — 252, 254, Садово, Черепишъ, Бачково — 203.
Puccinia coronifera Klebahn — по овеса: Садово — 231, 253, Садово и околностьта — 240, Бѣлоградчикъ, Враца, Ломъ — 352, Балладжа, Айорманъ, Богдановo и др. (Добричко) — 220, Геленджишка община (Добричко) — 215, Добричкото земледѣлско училище — 219, Бѣлоградчикъ — 351, Образцовъ чифликъ — 378, Силистренско и с. Хасаново (Преславско) — 209, Търновско — 61, Шуменското земледѣлско училище, Търновско, Опитното поле София — 288, Кабиюкъ — 344; — по Avena sativa L.: Садово — 245, 254, 261, Искърския проломъ отъ Курило до Мездра — 335; — по Rhamnus cathartica L.: Павлово — 159; — по Lolium perenne L., Festuca elatior L., Alopecurus pratensis L., Alopecurus agrostis L., Alopecurus geniculatus L.: Кабиюкъ — 344.

Puccinia coronifera avenae Kleb. — по овеса: Садово — 244, 252, *$_{*}$* — 352[a].

Puccinia crepidicola Syd. — по Crepis setosa Hill.: Опитното поле при Горна Баня — 349.

Puccinia crucianellae Desm. — по Crucianella oxyloba Jka.: Масаръ Паша-Теке — 203.

Puccinia cyani (Schleich.) Pass. — по Centaurea cyanus L.: Садово — 252, 254, 261, *$_{*}$* — 203.

Puccinia cynodontis Desm. — по Cynodon dactylon L.: Садово — 252, 261, Бѣлово — 203.

Puccinia dianthi D. C. — по Dianthus barbatus L.: Садово — 252, 254, 261.

Puccinia dioicae P. Mag. — по Carex junceum (?): Садово — 252.

Puccinia dispersa Erikss. et Henning. Syn. Puccinia rubigo-vera — по ржжь: Садово — 244, 246; — по пролетенъ ечемикъ(?): Баладжа, Аиорманъ, Куруджакьой (Добричко) — 220; по зимни и пролѣтни ечемици: Образцовъ чифликъ — 110 (P. simplex); — по зимницитѣ: Добричкото земледѣлско училище, Геленджишка и Езибейска общини (Добричко), околностьта на гр. Фердинандъ — 215; — по житнитѣ посеви: Бѣлоградчишко — 220; — по *$_{*}$* : с. Велибей (Преславско) — 209; — по пшеницата(?): Опитното поле София — 231 (P. triticina).

Puccinia divergens Bubák. — по Carlina longifolia Rchb.: при Бойково, Станимашко — 68, 203, 254, 261.

Puccinia doronici Niessl. — по Doronicum macrophyllum Fisch.: м. Череша при Рилския монастиръ — 281, Ситаково (Пловдивско), Рила — 203.

Puccinia echinopis D. C. — по Echinops banaticus Roch.: Елисейна, Черепишкия монастиръ, Мездра — 335; — по Echinops albidus Boiss. et Sprun.: при Рилския монастиръ — 262, Рила — 203; — по Echinops microcephalus S. S.: Рила — 203; — по Echinops sphaerocephalus L.: между Чамъ Кория и Радуилъ — 203.

Puccinia epilobii D. C. — по Epilobium virgatum Fries.: Витоша — 336.

Puccinia epilobii-tetragoni (D. C.) Winter. — по Epilobium montanum L.: по пѫтя отъ Княжево за Владая — 336, Садово — 252, 254, 261, Лакатникъ — 335, *$_{*}$* — 203; — по Epilobium montanum L.: Пиринъ по р. Бъндерица — 334, Рила (Криво Бърдо) — 203; — по Epilobium sp.: Долна Ломница, близо до Рилския монастиръ — 262; — по Epilobium collinum Gmel.: Родопитѣ (Лъджозица) — 203.

Puccinia eryngi D. C. — по Eryngium campestre L.: Княжево — 159, по пѫтя между Станимака и Бачково — 252, 254, 201; — по Eryngium sp.: Кочариново, Дупница — 203.

Puccinia galii Pers. — по Asperula odorata L.: Витоша — 336; — по Galium mollugo L.: Павлово — 159, Черепишъ — 335, с. Колешъ — 161; — по Galium verum L.: Павлово — 159.

Puccinia galiorum Link. — по Galium anisophyllum Vill. Schult.: Свети Лука при Рилския монастиръ — 263.

Puccinia genistae Schröt. — по Galega officinalis L.: въ ботаническата градина на Университета София — 336.

Puccinia gentianae (Strauss) Winter — по Gentiana cruciata L.: при Драгоманъ — 66, Рила — 203.

Puccinia gigantea Karst. — по Epilobium angustifolium Vill. Schult. Долна Ломница, Криво Бърдо (Рила) — 203.

Puccinia glechomatis D. C. — по Glechoma hederacea L.: с. Колешъ — 161, София, Казичане — 336, Реброво, Черепишъ, Мездра — 335, Троянския монастиръ — 203.

Puccinia glumarum Eriks. et Henn. — по пшеница: София Опитното поле — 172, 348, 350, Садово — 246, 253, 252, 254, 261, с. Садово и с. Кара Бунаръ (Бургазко) — 44, Добричкото земледѣлско училище и с. Короджа Кьой (Добричко) — 215, с. Кара Бунаръ (Бургазско) — 252, 254, 261, Бѣлоградчишка и Луковитска околии — 220, Русенско, Търновско, Войника, Ени Махле, Арнаутъ Кьой (Ямболско), Търновско, Чарганъ, Мидарисъ и гр. Ямболъ, Бургазска околия, Преславска околия, Опитното поле София — 288, Мурадалларъ, Марковча, Кюлевча, Макакъ, Кайкж, Клиседжикъ, Хърсово и Ишикларъ (Шуменско) — 344; — по ржжь: при монастира Бѣла Черква (Родопитѣ) — 244, 252, 254, 261, Мурадалларъ, Марковча, Кюлевча, Макакъ, Хърсово, Кайкж, Клиседжикъ и Имрихоръ (Шуменско) — 344; — по жито: Ихтиманъ, Садово — 352[a]; — по Triticum vulgare Vill.: Зеленишкия балканъ (Троянъ) — 203; — по *$_{*}$* : Опитното поле София, Бѣла, Бѣлоградчикъ, Свиленградъ, Вратца, Ломъ, Садово, гр. Фердинандъ, с. Стамболово — 352.

Puccinia graminis Pers. — по пшеница: Царската ботаническа градина — 166, Търновско — 61, с. Кочово (Преславско), Ески Джумайска околия, Земледѣлското училище край Силистра, Балчишко — 209, Опитното поле София — 166,288,348,350, Аиорманъ, Коруджа-Кьой (Добричко), Шуменско, — 219, Сливенско — 246, Ямболъ — 149,

Опитното поле Садово — 240, Опитното поле Образцовъ чифликъ — 110, 378, Турски Изворъ (Тетевенско) — 215, изъ цѣла България — 327, Русенско — 288; — по Triticum vulgare Vill.: Искърския проломъ отъ Курилово до Мездра — 335, Банско, Якоруда, — 334, Садово — 245, 252, 254, 261; — по Triticum durum Dsf, Triticum turgidum L.: Садово — 245, 252, 254, 253, 261; — по житото: Орхание — 184, 351, Опитното поле София — 352, 352[а], Садово — 244, Попово, Разградъ — 352[а], с. Кирилово (Преславско) — 215; — по ечемикъ: Опитното поле София — 288, 352, Добричка околия, Видинско — 220, Балчишко — 209; по ржжь: Опитното поле София — 288, 348, Балчишко — 209, землището на гр. Бѣлоградчикъ — 215, Макакъ, Ендже, Имрихоръ и гр. Нови-Пазаръ (Шуменско) — 344; — по Secale cereale L.: Садово — 245, 252, 254, 261; — по овесъ: Опитното поле София, с. Горни Инджикъ (Шуменско) — 288, Котелъ — 352, Макакъ, Индже, Имрихоръ и гр. Нови-Пазаръ (Шуменско) — 344, Балчишко — 209; — по Berberis vulgaris L., Cynodon dactylon Pers.: Борисовата градина София — 159.

Puccinia helianthi Schw. — по слънчогледъ: София — 352,172, с. Макакъ (Шуменско) — 344, Образцовъ чифликъ — 219, Кнежа — 352[а], Ямболския държ. овощ. разсадникъ — 260, Садово — 252,261.

Puccinia helianthorum Schw. — по Helianthus tuberosus L.: София — 336.

Puccinia helvetica Schröt. — по Asperula taurina L.: Черепишъ — 203,335.

Puccinia herniariae Unger. — по Herniaria incana Lam.: при Търново — 203.

Puccinia hieracii (Schum.) Mart. — по Hieracium pilosella L.: Витоша — 159, с. Бойково (Пловдивско) — 252,254,261; — по Hieracium bauhini Bss.: Витоша — 336; — по Hieracium sp.: Пиринъ по р. Бъндерица — 344; — по Hieracium murorum: Алабакъ—Бѣлово, Чамъ Кория, Криво Бърдо (Рила) — 203.

Puccinia hypochaeridis Oudem. — по Hypochaeris radiata L.: Борисовата градина София — 159.

Puccinia iridis Wallr. — по Iris graminea L.: Ботаническата градинл на Университета София — 336; — по Iris germanica L.: Садово — 252, 254, 161, Сакаръ балканъ — 203;

Puccinia jaceae (Otth) Mart. — по Centaurea jacea L.: с. Бойково (Пловдивско) — 203, 254, 261; — по Centaurea stenolepis Kern.: Кобилино Бранище (Рила) — 262, Бойково, Костенецъ, Ракитово — 203.

Puccinia lactucarum Sydow. — по Lactuca muralis L.: Пиринъ — 334, Лакатникъ — 335.

Puccinia lapsanae (Schultz) Fuck. — по Lapsana communis L.: Шуменъ — 334, пѫтя отъ Княжево за Владая — 336, с. Бачково (Станимашко) — 252, 254, 261, Реброво, Бойково, Зеленишкия балканъ при Троянъ, Черепишъ, Рила — 208; — по Glechoma hederacea L.: с. Колешъ — 161.

Puccinia leonthodontis E. Jacky — по Leonthodon hastilis L.: София — 336, Троянския балканъ — 203; — по Leonthodon hispidus L.: Троянския балканъ — 203.

Puccinia magnusiana Koern. — Phragmites communis Trin.: Садово — 254, 254, 261, 203.

Puccinia magnusii Klebh. — по Carex riparia Curt.: Садово — 203.

Puccinia major Dietel. — по Crepis paludosa Good.: Чамъ Кория — 203.

Puccinia malvacearum Mont. — по Malva rotundifolia L.: София — 159, Лѫджене — 203; — по Malva silvestris L.: София — 159, при с. Колешъ (Бѣласица) — 161, Харманлий — 66, Садово — 245, 252, 254, 261, навсѣкѫде изъ Искърското дефиле — 335, Троянския балканъ, Черепишъ — 203; — по Malva sp.: Сарай (Тракия) — 336; — по слеза и ружата: градинитѣ на гр. Шуменъ и с. Инджикъ (Шуменско) — 344; — по Althaea rosea L.: Садово — 203, 245, 252, 254, 261, Рила, Зеленишкия балканъ, Садово — 203, Опитното поле София — 352[а]; — по Malva vulgaris L.: Банско — 334.

Puccinia maydis Berang. — по Zea mays L.: София — 245, 252, 254, 261, Опитното поле София — 349, София, Кюстендилъ — 352, Софийско — 184, 352[а].

Puccinia menthae Pers. — по Clinopodium vulgare L.: Владая — 159, Пиринъ по р. Бъндерица — 334; — по Mentha aquatica L.: Владая — 159, Банско — 334; — по Mentha piperita Huds.: Бѣласица — 161, Опитното поле София — 352[а]; — по Chenopodium vulgare L.: Бѣласица — 161; — по джоджена: Шуменъ — 344; — по Origanum vulgare L.: Кьошковетѣ при гр. Шуменъ — 344, изъ цѣлото Искърско дефиле — 335, Опитното поле София — 352[а]; — по Mentha nigricans Mill.: Лозенъ планина около Германския монастиръ — 336; — по Mentha silvestris L.: Черепишъ, Троянско, Бойково (Пловдивско), Рила — 203, с. Бойково (Пловдивско) — 261, 254, 252, Опитното поле София — 352[а]; — по Mentha silvatica L.: Пиринъ по р. Бъндерица — 334; — по Mentha mollissima Brkh.: изъ цѣлото

Искърско дефиле до Мездра — 335, Лозенъ планина около Германския монастиръ — 336; — по Satureja kitaibelii Werzb.: изъ цѣлото Искърско дефиле — 335; — по Calamintha officinalis Moench.: изъ цѣлото Искърско дефиле: 335, Троянския, Зеленишкия балкани, Рила — 203; — по Calamintha clinopodium: Костенецъ, Рила — 203; — по Mentha arvensis L.: Лджене, Ракитово — 203; — по Mellissa officinalis L.: Черепишъ — 203.

ccinia millefolii Fuckel — по Achillea millefolium L.: билото на Бѣласица — 161, Шуменско — 344, София Борисовата градина — 336.

ccinia molinae Tul. — по Molinia coerulea Mch.: Садово — 254, 261.

ccinia nigrescens Kirchner — по Salvia verticillata L.: Лакатникъ — 335, при Черепишъ, Костенецъ, Зеленишкия балканъ, Троянския балканъ, Ракитово, Рила — 203.

ccinia obscura Schroet. — по Bellis perennis L.: с. Овчарово (Шуменско) — 344; — по Luzula maxima D. C.: Рила — 203.

ccinia obtegens (Link.) Tul. — по Cirsium arvense Scop.: Садово — 252, 254, 261, Троянския, Зеленишкия балкани, Ракитово — 203.

ccinia opizii Bubák — по Lactuca virosa L.: Борисовата градина София — 159; — по Lactuca muralis L.: Рила, Зеленишкия балканъ — 203; — по Carex muricata: Криво Бърдо (Рила) — 203.

ccinia passerini Schroeter — по Thesium montanum Ehrh.: Люлинъ — 159.

ccinia phragmitis Körn. — по Phragmites communis Trin.: Садово — 252.

ccinia picridis Hezsl. — по Picris hieracioides L.: Черепишъ — 335.

ccinia pimpinellae (Strauss) Mart.—по анасона: Садово — 253; — по Pimpinella saxifraga L.: Витоша — 159, Бѣласица — 161; — по Pimpinella anisum L.: Садово — 254, 261, 203.

ccinia poarum Nielsen — по Tussilago farfara L.: Владая — 159, Бѣлово — 203; — по Poa pratensis L.: Садово — 252, 254, 261.

ccinia polygoni Alb. et Schw. — по Polygonum convolvulus L.: с. Скрянино (Кюстендилско), София Борисовата градина — 336, Реброво, Лакатникъ — 335, Троянския балканъ — 203.

ccinia polygoni amphibii Pers. — по Polygonum amphybium L.: по брѣговетѣ на Ново Пазарската рѣка и Боклужда дере (Шуменско) — 344; — по Polygonum persicaria Садово — 252, 254, 261; — по Polygonum sp.: Садово — 203.

ccinia porri Winter — по Allium schoenoprasum L.: София — 159; — по праза: гр. Шуменъ и с. Салманово (Шуменско) — 344: *** — 352[a].

uccinia proecox Bubák — по Crepis biennis L.: Рила — 203.

uccinia prenanthis purpurea (Pers.) Lind. — по Prenanthes purpurea L.: Витоша — 159, Бойково (Родопитѣ), Чамъ Кория, Рила — 203.

uccinia pruni Doc. — по сливитѣ: Овощния разсадникъ гр. Шуменъ — 209, Садово — 244. гр. Преславъ — 215; — по Prunus domestica L.: Садово — 245, 254, 252, 261.

uccinia pruni spinosae Pers. — по сливата: Шуменското земледѣлско училище, с. Мурадалларъ (Шуменско) — 344, Бѣлоградчикъ и Кула — 352. Бѣлоградчикъ — 351, *** — 352[a], Садово и околностьта — 240, Севлиевскиятъ овощенъ разсадникъ — 220; — по Prunus spinosa L., Prunus domestica L.: Черепишкия монастиръ и Люти Бродъ — 335; — по сливата, прасковата, зарзалата и бадема: описана по материали включени въ сбирката на Централния земледѣлски изпитателенъ институтъ София — 172.

uccinia punctata Link. — по Galium silvestre Poll.: Рилския монастиръ — 203; — по Galium rotundifolium L.: Криво Бърдо (Рила) — 203.

uccinia purpurea Cke. — по Sorghum halepense Pers.: Садово — 254, 261.

uccinia retifera Lind. — по Chaerophyllum bulbosum: с. Бойково — 254, 261, 203.

uccinia retifera Lind. — по Chaerophyllum bulbosum; с. Бойково (Пловдивско) — 203.

uccinia ribis D. C. — по Ribes petraeum Wult.: Чамъ Кория, Рилски монастиръ — 203.

uccinia romangnoliana Maire et Sall. — по Cyperus longus L.: Садово — 252, 254, 261, 203.

uccinia rubigo vera. Syn. Puccinia dispersa Eriks. et Hening (зборни видове).

uccinia rubigo vera var. dispersa Eriks. Syn. P. triticina — по пшеницата: Садово — 240, 245.

uccinia rubigo vera var. glumarum. Syn. P. glumarum — по ржжьта: монастира Бѣла Черова (Родопитѣ) — 240, 245.

uccinia rumicis Westend — по Rumex acetosella L.: Павлово — 159.

uccinia salviae Unger. — по Salvia glutinosa L.: при Баня Костенецъ — 262, Батакъ, Бѣлово, Костенецъ, Черепишъ, Рила — 203.

uccinia secalina Eriks. et Henning — по ръжьта: Садово — 254, 261.

Puccinia silenes Schroet. — по Silene inflata Sm.: Шуменско — 344.
Puccinia silvatica Schroet. — по Carex sp.: Садово — 254, 261; — по Carex atrata: Рила — 203.
Puccinia simplex (Kern.) Eriks. et Henning — по ечемикъ: с. Макакъ, Кабиюкъ, Шуменското земледѣлско училище — 344, Шуменското земледѣлско училище — 288, Садово — 254, 261, 352ª, 253, 149, Образцовъ-чифликъ — 331, Кръстецъ, Садово, Котелъ — 352, Котелъ — 184; — по Hordeum murinum L.: Борисовата градина София — 336; — по Hordeum vulgare L.: нивитѣ надъ с. Якоруда — 334.
Puccinia smyrnii Corda. — по Smyrnium perfoliatum L.: Своге, изъ христалацитѣ около монастира — 335.
Puccinia soldanellae (D. C.) Fuck. — по Soldanella pusilla Bmg.: с. Маринковица — 203.
Puccinia sonchi Rob. — по Sonchus oleraceus L. Садово — 252, 254, 261; — по Sonchus uliginosus: Садово — 203.
Puccinia stipae (Opiz.) Hora. — по Thymus ovatus Mill.: Троянския балканъ — 66.
Puccinia suaveolens Rostrup. Syn. Puccinia cirsii Lasch.
Puccinia symphyti bromorum Müller — по Bromus arvensis L.: София — 150; — по Bromus mollis L. Bromus tectorum L.: София — 336.
Puccinia tanaceti D. C. — по Tanacetum vulgare L. Опитно поле София — 352ª.
Puccinia taraxaci (Reb.) Plowr.—по Taraxacum officinale Web.: Борисовата градина София—159, Садово — 252, 254, 261, Лакатникъ — 335, Троянския балканъ — 203; — по глухарчето: с. с. Макакъ, Кадж и Овчарово (Шуменско) — 344; — по Taraxacum serotinum (W. K.) Poir., Taraxacum lanuginosum, Taraxacum sericeum: Садово — 252, 254, 256.
Puccinia thesii (Devs). — по Thesium ramosum Hayne: Драгоманъ (Рила) — 203; — по Thesium divaricatum Janka: Чалъ планина при Хасково — 66.
Puccinia tragopogi (Pers.) Corda — по Tragopogon pratensis L.: София — 159.
Puccinia trailii Plowr. — по Phragmites communis Trin.: Садово — 254, 261.
Puccinia tremeloides Hart. — по ябалка: Земл. училище Видинъ — 215.
Puccinia triticina Friks. et Henn. — по пшеницата: Търновско — 61; Садово — 244, 246, 253, 252, 254, 352ª. 288; — по Triticum vulgare Vill., Triticum durum: Садово — 261.
Puccinia typhae Raichbar — по Typha latifolia L.: изъ блатата на Струма — 161.
Puccinia uralensis Tranzschel — по Senecio nemorensis L: Чамъ Кория, Демиръ Капия, Рила, Ситняково — 203.
Puccinia valantiae Pers. — по Galium cruciata Scop.: градината при медицинския паметникъ София — 336, Реброво, Лакатникъ, Черепишъ — 335; — по Galium vernum: Троянския балканъ, Рила — 203.
Puccinia veronicae Schröter — по Veronica urticaefolia Jacq.: Пиринъ — 334, м. Череша до Рилския монастиръ — 262.
Puccinia veronicarum D. C. — по Veronica urticaefolia Jacq.: Чамъ Кория, Ситняково, Демиръ Капия подъ Мусала, Рила — 203.
Puccinia vincae (D. C.) Berk. — по Vinca major L.: Кабиюкъ — 344.
Puccinia violae (Schum.) D. C. — по Viola silvatica Fr.: Витоша — 159, с. Колешъ (Бѣласица) — 161, Своге — 335; — по Viola odorata L.: с. Колешъ (Бѣласица) — 161, Кьошковетѣ при гр. Шуменъ — 344, с. Бойково (Пловдивско) — 154, 261, Рила м. Свети Лука — 203; — по Viola vandasii Vel.: Ботаническата градина на Университета София — 336; — по Viola sp.: Пиринъ по р. Бъндерица — 334; — по Viola silvestris Rchb.: Рила, Бѣлово, Родопитѣ, Чамъ Кория — 203; — по Viola alba Bess.: Бѣласица — 161.
Puccinia virgaureae (D. C.) Lib. — по Solidago virga aurea L.: с. Бойково (Пловдивско) — 252, 254, 261, Рила, Чамъ Кория — 203.
Pucciniastrum agrimoniae (D. C.) Tranzchel. — по Agrimonia eupatoria L.: Елисейна — 335; — по Agrimonia sp.: Бачково — 203.
Pucciniastrum caryophyllacearum. Syn. Melampsorella caryophyllacearum (D. C.) Schroet., Melampsorella cerastii, Aecidium elatinum Alb. et Schw.
Pucciniastrum chamaenerii Rostr. — по Epilobium angustifolium L.: Рила, Чамъ Кория — 203.
Pucciniastrum epilobii (Pers.) Otth. — по Epilobium roseum Schreb.: Рила — 203; — по Epilobium montanum L.: Батакъ — 203; — по Epilobium hirsutum L.: при Троянския монастиръ — 203.
Pucciniastrum goeppertianum Kleb. Syn. Aecidium columnare, Calyptospora goeppertiana Kühn.
Pyrenopeziza bubàkii Klika — по *.*: *.* — 202.

hyum de baryanum Hesse. — по тютюна: опитнитѣ полета София, с. Рила (Дупнишко) — 352[а], Пловдивския тютюневъ районъ — 206; — по цвеклото: с. Пордимъ (Плѣвенско) — 176, захарната фабрика София — 349, Плѣвенско — 350; — по захарно цвекло: Софийско, Плѣвенско — 352, Опитното поле София — 348, Горни Богровъ, Горна Баня, Опитното поле София и др. — 351; — по зеленчуковъ разсадъ: София, Пловдивъ, с. с. Фердинандово и Куртово Конаре (Пловдивско), Минкова махала—153.

Q

aternaria persoonii Tul. — по * * * ; при Рилския монастиръ — 202.

R

mularia ajugae (Niessl.) Sacc. — по Ajuga reptans L.: гората Алабакъ при с. Бойково (Пловдивско) — 262.
mularia anchusae C. Mass. — по Anchusa officinalis L.: м. Свети Лука при Рилския монастиръ — 262.
mularia armoraciae Fuck. — по Cochlearia armoracia L.: при Германския монастиръ (Софийско) — 336; — по Armoracia rusticana L.: Садово — 252, 254, 261; — по хрена: Садово — 240; * * * — 352[а].
mularia betae Rostr. — по Beta trigyina W. K.: Хасково — 254, 261.
mularia calcea Desm. — по Glechoma hirsutum W. K.: при Баня Костенецъ — 262.
mularia cylindroides Sacc. — по Pulmonaria officinalis L.: при Рилския монастиръ — 262.
mularia evanida Kühn — по Gentiana asclepiadea L.: Долна Ломница при Рилския монастиръ — 262.
mularia gei (Elias.) Lindr. — по Geum montanum L.: при Рибнитѣ езера въ Рила — 262.
mularia geranii (West.) Fuckel. — по Geranium macrorrhizum L.: с. Бойково (Пловдивско) — 254, 261; — по Geranium pyrenaicum L.: при Рилския монастиръ — 262.
mularia heraclei (Oud.) Sacc. — по Heracleum ternatum Vel.: при Рилския монастиръ — 262.
mularia heraclei Sacc. var. apii graveolentis — по керевиза: Минкова махала — 165, 167, 352[а].
mularia lapsanae Desm. — по Lapsana communis L.: при Рилския монастиръ — 262.
mularia leonuri Sorok. — по Leonurus cardiaca L.: при Рилския монастиръ — 262.
mularia macrospora Fries. — по Campanula sp.: Свети Лука, близо до Рилския монастиръ — 262.
mularia montana Speg. — по Epilobium angustifolium L.: Родопитѣ — 254, 261.
mularia onopordi Mass. — по Onopordon acanthium L.: Дупница 349.
mularia primulae Thümen — по Primula sp.: с. Бойково, Бѣла Черкова (Пловдивско) и др. — 254, 261.
mularia sambucina Sacc. — по Sambucus nigra L.: при Рилския монастиръ — 262; — по Sambucus racemosa L.: Долна Ломница, при Рилския монастиръ — 262.
mularia scrophulariae Tunt. et Bon. — по Scrophularia sp.: Бачково 254, 261.
mularia senecionis (Berk. et Br.) — по Senecio nebrodensis L.: при Рибнитѣ езера въ Рила — 262.
mularia tulasnei Sacc. Syn. Sphaerella fragariae (Tul.) Sacc., Ascochyta fragariae Lib., Mycosphaerella fragariae (Sacc.) Lind. — по ягода: Шуменското земледѣлско училище — 344.
mularia variabilis Fuckel. — по Verbascum glabratum Friv.: Чамъ Кория — 262.
inanthus crista galli L. Syn Fustularia crista galli Wetstein — по * * * : малката мера на Кабиюкъ — 344.
inanthus major Ehrh. — по ливадни треви: * * * 352[а].
izina inflata Schaeff. Syn. Rhizina undulata Fries.
izina undulata Fries. Syn. Rhizina inflata Schaeff. — по Pinus silvestris L.: Карловската секция по залесяването — 173, м. Чуменика надъ с. Шипка — 175, Карловско и казанлъшко въ секциитѣ по залесяването — 350, 351; — по Pinus laricio austriaca Host.: Сопотската секция по залесяване, м. Трапито — 173, 175, Карловско и Казанлъшко въ секциитѣ по залесяването — 350, 131; — по борови култури: отъ с. Мухово, до с. Радославово по двата брѣга на Тополница, край гр. Панагюрище и Стрелченскитѣ бани — 139.

Rhizoctonia medicaginis D. C. Syn. Leptosphaeria circinans Sacc. — по коренитѣ на люцерната: *** — 352[a].

Rhizoctonia sp. — по тютюневъ разсадъ: Пловдивския тютюневъ районъ — 206; — по зеленчуковъ разсадъ: София, Пловдивъ, Фердинандово, Куртово Конаре (Пловдивско), Минкова махала — 153.

Rhizoctonia violacea Tul. — по люцерната: Разградско — 165, с. Арнаутито (Ст. Загорско) — 220; — по цвекло: с. Самоводене (Търновско) — 219, *** — 352[a], на много мѣста изъ царството — 176; — по захарно цвѣкло: землището на с. с. Джембазито, Арнаутито (Ст. Загорско), по течение на р. Сюлиплейка — 105.

Rhizomorpha fragilis — по черницитѣ: Станимака — 209.

Rhizopus nigricans — по слънчогледъ: Образцовъ-чифликъ — 219.

Rhynchosporium graminicola Hein. Syn. Marssonia graminicola Nod. — по ръжь: Садово — 244, 254, 261, 252; — по ечемикъ: Садово — 252, 254, 246, 253, *** — 352[a]; — по пшеница: Садово — 244; — по ***: *** — 245; — по ръжь и ечемикъ: Садово и околностьта — 240.

Rhytisma acerinum Fries. — по Acer campestre L.: Генишъ Ада, гората на Клисурския монастиръ, Князъ Борисовитѣ горски култури край София — 134, Шуменското земл. училище, гората на с. Марковча (Шуменско) — 344, около Германския монастиръ — 336, Черепишъ — 335; — по Acer pseudoplatanus L.: Генишъ Ада, гората на Клисурския монастиръ, Кн. Борисовитѣ горски култури край София — 134, Шуменското земл. училище, гората на с. Марковча (Шуменско) — 344, Борисовата градина София, Князъ Борисовитѣ горски култури — 129, 131, с. Вѣтренъ — 161; — по Acer platanoides L.: Князъ Борисовитѣ горски култури край София — 129, 131, Сотиръ и Бойково (Пловдивско) — 252, 254, 261.

Rhytisma punctatum Pers. — по Acer pseudoplatanus L.: Чамъ Кория — 131, 175.

Rhytisma salicinum Pers. — по Salix alba L.: Самоковъ — 134: — по Salix caprea: Соколецъ въ Рила — 262, Чамъ Кория — 202.

Roestelia cancellata Rabenh. Syn. Gymnosporangium sabinae Winter.

Roestelia cornuta Fr. Syn. Gymnosporangium conicum Hedw., Gymnosporangium aucupariae juniperinum (L) Kleb. — по скорушата: градината на Семинарията София — 349; — по Sorbus aucuparia (L.) Gärtn.: с. Бойково (Пловдивско) — 252, 254, 261.

Roestelia lacerata Sow. — по Crataegus oxyacantha L.: Садово — 252, 254, 261; — по глога: Садово и околностьта — 240.

Roestelia penicillata Fr. — по Pirus malus L.: с. Бойково (Пловдивско) — 252, 254, 261.

Rosellinia necatrix Berl. Syn. Dematophora necatrix Hart.

Rosellinia quercina R. Hart. — по джбъ: Аязмото гр. Ст. Загора — 41.

Russula aeruginea Fries. — по сѣнчеститѣ мѣста на смърчовитѣ гори на Чамъ Кория — 109.

Russula alutacea Pers. — по сѣнчеститѣ мѣста на смърчовитѣ гори на Чамъ Кория — 109.

Russula aurata With. — по земята: на западъ отъ с. Симеоново, Витоша — 81; Мургашъ планина — 82.

Russula citrina Cillet. — по земята: смърчовитѣ гори при Горското училище въ Чамъ Кория — 109.

Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. — по земята: джбовата гора на изтокъ отъ Елешничкия монастиръ — 82, Буковата гора на западъ отъ мина Плакалница — 82.

Russula densifolia Cillet. — по земята: сѣнчеститѣ мѣста на смърчовитѣ гори на Чамъ Кория — 109.

Russula emetica (Schaeff.) Fr. — по земята: боровата гора при Духовната семинарня София, джбовата гора около Елешничкия монастиръ, къмъ с. Потопъ на изтокъ и къмъ с. Желява на западъ — 82.

Russula fellea Fr. — по земята: джбовата гора около Елешничкия монастиръ — 82.

Russula foetens Pers. — по земята: сѣнчеститѣ мѣста на смърчовитѣ гори на Чамъ Кория — 109.

Russula fragilis Pers. Syn. Agaricus fragilis Pers.

Russula incarnata Q. — по земята: на западъ отъ Касж-Тепе при с. Бояна, въ гористия склонъ на Витоша — 81.

Russula lactea Pers. — по земята: на западъ отъ Касж-Тепе при с. Бояна, по гористия склонъ на Витоша, Златнитѣ мостове, Витоша — 81.

Russula lepida Fr. — по земята: Боровата гора надъ с. Княжево — 81.

Russula mollis Q. — по земята: Витоша на западъ отъ Момина скала при с. Бояна, въ буковата гора, надъ с. Княжево, по гористия склонъ — 81.

ssula mustelina Fr. — по земята: около монастира Св. Богородица при с. Елешница, къмъ с. Потопъ на изтокъ и къмъ с. Желява на западъ — 82, гората при Златнитѣ мостове, Витоша — 81.
ssula nigricans Bull. — по земята: джбовата гора надъ Елешничкия монастиръ — 82.
ssula puncta ta — по земята: по сѣнчеститѣ мѣста на смърчовитѣ гори на Чамъ Кория — 108.
ssula rubra Fr. — по земята: джбовата гора надъ с. Горно Оризово — 82.
ssula sanguinea Bull. — по земята: отъ сѣнчеститѣ мѣста на смърчовитѣ гори на Чамъ Кория — 109.

S

rhyzophullum alneum (L.) Schröt. — по Fraxinus ornus L.: Черепишъ — 203; — по орѣхи: гр. Нови Пазаръ — 344, *** — 352[a], описана споредъ материали включени въ сбирката на Централния земледѣлски изпитателенъ институтъ София — 179.
rhyzophyllum commune Fr. — по кората на конски кестенъ, подпоренъ дирекъ: София — 81; — по ***: мѣстностьта „Остритѣ камъни" — Харманлии, около Вършецъ — 81. буковата гора на западъ отъ мина Плакалница — 82, твърде разпространена — 203.
irrhia rimosa Fuckel. — по Phragmites communis Trin.: Садово — 254, 261.
lerotinia cepivorum Berk. — по червения и чесновъ лукове: *** — 352[a].
lerotinia cinerea Schröt. Syn. Stromatinia cinerea Schröt., Monilia cinerea Bon. — по сливи: Кюстендилъ, Софийско, Луковитско, Бѣлоградчикъ, Дрѣново, Ески Джумая — 352, Шуменско — 344, *** — 352[a], описана споредъ материали отъ страната включени въ сбирката на Централния земледѣлски изпитателенъ институтъ София — 177; — по зарзали: Кюстендилъ, Софийско, Луковитъ, Бѣлоградчикъ. Дрѣново, Ески Джумая — 352; — по праскови: Кюстендилъ, Софийско, Луковитъ, Дрѣново, Ески Джумая — 352, описана по материали отъ страната включени въ сбирката на Централния земледѣлски изпитателенъ институтъ София — 177; — по череши и вишни: Шуменско — 344, описана споредъ материали изъ страната включени въ сбирката на Централния земледѣлски изпитателенъ институтъ София — 177; — по бадема: описана по материали изъ страната включени въ сбирката на Централния земледѣлски изпитателенъ институтъ София — 177.
lerotinia cydoniae Schell. Syn. Sclerotinia linhartiana Prill et Del. — по дюла: Панагюрския овощенъ разсадникъ, Т. Пазарджикъ — 165, описана по материали отъ страната включени въ сбирката на Централния земледѣлски изпитателенъ институтъ София — 179, *** — 352[a].
lerotinia fructigena (Pers.) Schröt. Syn. Monilia fructigena Pers., Stromatinia fructigena Schröt. — по овощнитѣ дървета: Т. Пазарджикъ, Пловдивъ, Стара Загора, В. Търново и околноститѣ имъ — 119, описана по материали изъ страната, включени въ сбирката на Централния земледѣлски изпитателенъ институтъ София — 177; — по ябълки: Кюстендилъ, Т. Пазарджикъ, Казанлъкъ, Ески Джумая, Ихтиманъ, София, Трънъ, Шуменъ — 352, Княжево, Дълбокъ Долъ, *** — 352[a], описана по материали включени въ сбирката на Централния земледѣлски изпитателенъ институтъ София — 179; — по круша: София, Мехомия — 352, *** — 352[a], описана споредъ материали отъ страната включени въ сбирката на Централния земледѣлски изпитателенъ институтъ София — 179; — по сливи: описана споредъ материали изъ страната включени въ сбирката на Централния земледѣлски изпитателенъ институтъ София — 179.
lerotinia fuckeliana de Bary, Syn. Botritis cinerea Pers. — по лукъ, слънчогледъ: Ст. Загора, Кюстендилъ, с. Рила (Дупнишко) — 352[a].
lerotinia laxa Aderh. et Ruhl. Syn. Monilia laxa Aderh. et Ruhl, Stromatinia laxa Ehren. — по зарзала: София — 351, Княжево — 352[a], с. Сливница — 352, описана споредъ материали изъ страната включени въ сбирката на Централния земледѣлски изпитателенъ институтъ София — 177; — по каисии: описана по материали изъ страната и пр. — 177.
lerotinia libertiana Fuck. — по тютюна: с. Коршуна (Ловечко) — 166, *** — 31, Ловечко—352, *** — 352[a], изъ България — 165; — по слънчогледъ: с. Сливница (Софийско) — 351, *** — 352[a]; — по захарно и кръмно цвекло, Образцовъ-чифликъ — 215; — по рапица: Образцовъ-чифликъ — 110.
lerotinia linhartiana Prill. et Del. Syn. Monilia linhartiana Sacc., Sclerotinia cydoniae Schell.
lerotinia mespili Schell. Syn. Stromatinia mespili Schell.

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) Schröt. — по Pulmonaria officinalis L.: при Търново — 66
Sclerotinia sp. — по черница: Адата, Бисеръ, Българинъ, Доситиево, Константиново, Преславецъ, Шишманово, (Харманлийско), гр. Харманлий, Князъ Борисово, Любимецъ (Свиленградско), гр. Свиленградъ — 404.
Sclerotinia trifoliorum Eriks. по — люцерната: с. Аспарухово (Плѣвенско) — 47; — по сусамови стебла: Садово — 184, 352, *$_{*}$* — 352[a].
Scolecotrichum graminis Fuchel. — по ръжь: Садово — 253, 245, 252; — по Dactylis glomerata L.: Садово — 245, 252, 261, 240; — по ръжь: Садово — 261, Садово и околността — 240, *$_{*}$* — 352[a]; — по овесъ: *$_{*}$* — 352[a].
Scolecotrichum melophtorum Prill. et Del. — по краставици: с. с. Каспичанъ, Горни Инджикъ (Шуменско) — 344, градина на Горно Банския пжть (Софийско) — 298, с. Конско (Кюстендилско) — 352[a]; — по дини: с. с. Каспичанъ, Горни Инджикъ (Шуменско) — 344
Septoria ampelina Berk. — по лоза: Ески Джумайския лозовъ разсадникъ, Шуменското земл. училище — 344, Варненския лозовъ разсадникъ — 352, 165, 167, 182, *$_{*}$* — 352[a].
Septoria apii Br. et Cav. — по кервиса: с. Салманово (Шуменско) — 344.
Septoria ari Desm. — по Arum maculatum L.: с. Бойково (Пловдивско) — 254, 261.
Septoria atriplecis Fuckel — по Atriplex hortensis L.: Садово — 252, 254, 261.
Septoria bidensis Sacc. — по Bidens orientalis Vel.: при Баня Чепино — 263.
Septoria bulgarica Bubàk et Malkoff — по Cirsium appendiculatum Grsb.: с. Бойково (Пловдивско) — 79, 254, 260, 261.
Septoria calistegi West. — по Calystegia sepium R. Br.: Садово — 252, 254, 261.
Septoria canabis (Lasch.) Sacc. — по конопа: с. Абоба и с. Мурадалларъ (Шуменско) — 344, Садово 245, 352, *$_{*}$* — 352[a].
Septoria cheliodonii Desm. — по Cheliodonium majus L.: с Бойково (Пловдивско) — 245, 261.
Septoria clematidis Rab. — по Clematis viticella L.: при Рилския монастиръ — 262.
Septoria convolvuli Desm. — по Convolvulus arvensis L.: Шуменско — 344.
Septoria corni maris Sacc. — по Cornus mas L.: гората Шуменъ, Кюлевча и Марковча — 344.
Septoria cornicola Desm. — по Cornus sanguinea L.: с. Бойково (Пловдивско) — 254, 261.
Septoria cotini C. Massal. — по Rhus cotinus L.: Родопитѣ — 254, 261.
Septoria crataegi Kicke. — по Crathaegus oxyacanta: около Вратца — 254, 261.
Septoria digitalis Pass. — по Digitatilis lanata L.: с. Бойкво (Пловдиско) — 252,254,261.
Septoria ebuli Desm. — по Sambucus ebulus L.: при Дупница — 262.
Septoria elaegni (Chev.) Desm. — по Elaeagnus angustifolius L.: мѣстото на Агрономическия факултетъ София — 349.
Septoria epicarpi Thüm. — по орѣха: с. Черенче (Шуменско) — 344, Образцовъ-чифликъ — 219, Садово и околността — 240, *$_{*}$* — 252[a], описана по материали изъ страната включени въ сбирката на Центр. земл. изпитателенъ институтъ София — 179; — по Juglans regia L.: Садово — 245, 252, 254, 261.
Septoria fragariae Desm. Syn. Sphaerella fragariae Sacc. — по ягода: Орѣховския лозовъ разсадникъ — 215.
Septoria galeopsidis West. — по Galeopsis ladanum L.: изъ ливадитѣ на Петроханъ — 349, с. Бойково (Пловдивско) — 254, 261.
Septoria gei Desm. — по Geum bulgaricum Panč.: при Рибнитѣ езера (Рила) 262.
Septoria graminum Desm. — по пшеница: Садово — 246, 253, с. Хамзоренъ (Ямболско) — 288; — по ечемика: *$_{*}$* — 352[a]; — по житото: Опитното поле София — 352; — по Triticum vulgare Vill: Садово — 252, 254, 261.
Septoria humuli West. — по Humulus lupulus L.: при Рилския монастиръ — 262.
Septoria lamii Pass. — по Lamium bithynicum Benth.: Свети Лука при Рилския монастиръ — 262.
Septoria lamiicola Sacc. — по Lamium sp.: при Рилския монастиръ — 262.
Septoria lycopersici Speg. — по домати: Шуменско — 344, Садово — 252, 254, 261. с Горублене (Софийско) — 352, *$_{*}$* — 352[a].
Septoria melicae Passer. — по Melissa officinalis L.: с. Кюлевча (Шуменско) — 344.
Septoria mori Lev. Syn. Phleospora mori Sacc.
Septoria nepetae Ell. et Ev. — по Nepeta nuda L.: с. Бойково (Пловдивско) — 254, 261.
Septoria nigerrina Fuck. Syn. Septoria pyricola Desm., Mycosphaerella sentina Schröt.
Septoria pallens Sacc., Syn. Gnomonia erytrostoma Auer.
Septoria petroselini Desm. — по магданоза: с. Саламаново (Шуменско) и гр. Шуменъ — 344, *$_{*}$* — 352[a].
Septoria podagrariae Lasch. — по Aegopodium podagraria L.: при Рилския монастиръ — 262.

ptoria polygonicola (Lasch) Sacc. — по Polygonum lapatifolium L.: с. Бойково (Пловдивско) — 254, 261, Опитното поле при с. Горна Баня (Софийско) — 349.
ptoria populi Desm. — по Populus pyramidalis Roz.: Шуменската градска градина — 344.
ptoria pyricola Desm. Syn. Septoria nigerrina Fuck., Mycosphaerella sentina Schröt; — по круша: Садово — 244, 245, 252, 254, 261, 240, изъ Княжеството — 246.
ptoria rubi Westend. — по Rubus caesius L.: с. Бойково (Пловдивско) — 254, 261.
ptoria salicicola Sacc. — по Salix viminalis L.: Садово — 252, 254, 261.
ptoria saponariae D. C. — по Saponaria officinalis L.: с. Бойково (Пловдивско) — 254, 261.
ptoria scabiosicola Desm. — по Scabiosa sp.: при Баня Костенецъ — 262; — по Succisia pratensis Mch.: с. Бойково (Пловдивско) — 261, 254.
ptoria senecionis West. — по Senecio nemorensis L.: пжтя отъ Рилския монастиръ къмъ рибнитѣ езера — 262.
ptoria stachydis Rob. et Desm. — по Stachys sp.: Свети Лука при Рибнитѣ езера (Рила) — 262.
ptoria tanaceti Niessel. — по Tanacetum vulgare L.: с. Бойково (Пловдивско) — 254, 261.
ptoria tosevi Bubàk. — по Genitana cruciata: при Драгоманъ — 67.
ptoria tritici Desm. — по пшеница: Опитно поле София 348.
ptoria urticae Desm. et Rob. — по Urtica urens L.: при Рилския монастиръ — 262, 349; — по Urtica dioica L.: при Рилския монастиръ — 262.
ptoria vandassii Bubàk. — по Alsine glomerata: Родопитѣ — 67[a].
ptoria verbenae Rob. et. Desm. — по Verbena officinalis L.: при Рилския монастиръ — 262.
lenia poriaeformis (Pers.) Fuck. — по букови парчета: Златнитѣ мостове, Витоша — 81.
rdaria fimicola (Rob.) Ces. et. de Not. — по *⁎*: *⁎* — 202.
rdaria fimiseda Rob. — по кочана на царевицата: Образцовъ-чифликъ — 79.
rosporium panici-miliacei (Pers.) Takahachi. Syn. Ustilago panici-miliacei (Pers.) Winter.
haceloma ampelinum de Bary. Syn. Gloeosporium ampelophagum Sacc.
hacelotheca andropogonis (Opiz.) Bubàk. — по Andropogon sp.: Долна Баня при Костенецъ — 203.
hacelotheca hydropiperis (Schum.) de Bary — по Polygonum hydropiper L.: Садово — 254, 261, Радуилъ при Самоковъ, Долна Баня, Садово — 203.
hacelotheca sorghi (Link.) Clinton. — по Sorghum (Andropogon) sp.: Садово — 203.
haerella depazieformis (Auersw.) Rehm. — по Oxalis acetosella L.: Чамъ Кория — 202.
haerella fragariae Sacc. Syn. Septoria fragariae Desm., Phyllosticta fragaricola Desm. et Rob., Ramularia tulasnei Sacc. — по ягодитѣ: Търновския и Кулски разсадници — 215, Садово, Ямболския овощенъ разсадникъ — 149, 253, 246, Садово и околностьта — 149, 240, с. Мурадалларъ (Шуменско), Шуменското земл. училище — 344; — по Fragaria vesca L.: Садово — 252, 245, 254, 261.
haerella mori Fuck. Syn. Cylindrosporium mori — по черница: с. с. Касапларъ, Долни Инджикъ (Шуменско), Шуменъ — 344, Садово — 244, 246, 240, Свиленградъ — 351, Образцовъ чифликъ — 219, Кулския овощ. разсадникъ — 215; — по Morus alba L.: Садово — 245, 254, 252, 261, Свиленградъ — 352.
haerella sentina Fuckel. Syn. Septoria pyricola Desm. — по черници и круши: Шуменско — 344.
haerella topographica Sacc. et Speg. — по Sorbus torminalis (L.) Ehrh.: гората на с. Марковча (Шуменско) — 344, описана по материали изъ страната, включени въ сбирката на Центр. земл. изпитителенъ институтъ София — 345.
haeropsis rusci Thüm. — по Ruscus aculeatus L.: с. Бойково (Пловдивско) — 262.
haerotheca castagnei Lev. — по Humulus lupulus L., Cucurbita pepo L.: Бачковския монастиръ — 245, 252, 254, 261, 240, 231; — по краставици: с. Девенци (Луковитско) — 220.
haerotheca fuliginea (Schleht.) Bur. — по Crepis paludosa Mch.: Чамъ Кория, Родопитѣ при Бойково — 203; — по Euphrasia officinalis L.: Криво Бърдо при Рилския монастиръ — 203; — по Impatiens noli tangere L.: Рила — 203; — по Melampyrum sp.: Чамъ Кория — 262; — по Saxifraga rotundifolia L.: Рилския монастиръ — 203; — по Senecio nemorensis L.: Рила — 203; — по Taraxacum officinale Web.: при Троянския монастиръ — 203;—по Xanthium spinosum L.: Баня при Лжджене — 203.
haerotheca humuli (D. C.) Burs. — по Humulus lupulus L.: с. Коларево (Бѣласица) — 161; Витоша — 336, по пжтя отъ с. Якоруда за с. Банско — 334, Своге — 335, Княжево при София, Рилския монастиръ — 203; — по Lagenaria vulgaris Ser.: при с. Кратуна (Бѣласица) — 161; — по тиквитѣ: около гр. Шуменъ — 344, Кюстендилъ — 184, 351, 352, Образцовъ чифликъ — 219, София — 352, Горна Джумая — 352[a]; — по краставици: около гр. Шуменъ — 344, Образцовъ чифликъ — 219; —

по пжпеши: около гр. Шуменъ — 344; — по хмелъ: около гр. Шуменъ (лозята) — 344, *$_{*}$* — 352[a]; — по дини: Кюстендилъ, София — 352, Горна Джумая — 352[a]; — по Agrimonia eupatoria L.: Елисейна, Лакатникъ — 335, Бачково — 203; — по Alchemilla subsericea Gaud.: Срѣдна гора — 203, 66; — по Alchemilla vulgaris L.: Родопитѣ при с. Бойково (Пловдивско), Рилския монастиръ, Чамъ Кория — 203; — по Agrimonia agrimonoides: Рилския монастиръ, Криво Бърдо (Рила) — 203; — по Erigeron canadensis L.: по брѣга на р. Марица близо до Садово — 203; София — 336, Елисейна, Лакатникъ — 335; — по Epilobium virgatum Fries.: Витоша — 336; — по Physalis alkekengi L.: Елисейна, Лакатникъ — 335; — по Potentilla argentea L.: между Лжджене и Ракитово — 203; — по Sanguisorba minor L.: София — 336; — по Scrophularia canina L.: Банско — 334; — по Taraxacum officinale L.: Казичене — 336; — по Veronica chamaedrys L.: София — 336; Рила, Криво Бърдо — 203; — по Xanthium spinosum L.: при Дервенъ Дере (Казълъ-агачко) — 336, Елисейна, Лакатникъ — 335; — по Xanthium strumarium L.: Елисейна, Лакатникъ — 335; — по Impatiens noli tangere L.: при Рилския монастиръ — 262; — по Bidens tripartitus L.: Казичене — 336, Елисейна, Лакатникъ — 335.

Sphaerotheca mors-uvae Berk. et Curt. — по татарско грозде: Бѣлоградчикъ — 172, 352[a], Шуменското земл. училище, Кулския овощенъ разсадникъ — 23; — по френско грозде: с. Мурадалларъ (Шуменско) — 344.

Sphaerotheca pannosa (Vallr.) Lév. Syn. Oidium leucoconium Desm. — по Rosa centifolia L.: Ямболъ — 245, 254, 261, 252; — по роза: Разградъ — 215, Панагюрище, Лжджене, Габрово — 352[a]. Шуменъ — 344, с. Червена Вода (Русенско), Ихтиманъ, София, Айтосъ — 352, 172; — по диви рози: Шуменското земледѣлско училище — 219; — по праскова: Горна-Джумая — 172, 352, Поповско — 260, Фюлбеллеръ, Дриново (Поповско) — 215, описана споредъ материали изъ страната, включени въ сбирката на Централния земл. изпит. институтъ София — 177, Панагюрище, Лжджене, Габрово — 352[a]; — по японска роза: с. Червена Вода (Русенско), Айтосъ — 351; — по Morchella sp.: *$_{*}$* — 109; — по Rosa canina L.: Чамъ Кория, между Бѣлово и Алабакъ — 203; — по Rosa dumetorum Thuill.: при Троянския монастиръ — 203; — по Rosa gallica L.: между Троянския монастиръ и гр. Троянъ — 203; — по Rosa sepium Thuill.: Черепишкия монастиръ — 203.

Sphaerotheca persicae Wor. — по праскова: *$_{*}$* — 352[a].

Sphaerulina intermixta (Berk. et Br.) Sacc. — по Rosa canina L.: Троянския монастиръ — 202.

Spongospora subterranea (Wallr.) John. Syn. Erysibe subterranea Wallr. (?) — по картофи: двореца Врана — 349, 352[a].

Sporidesmium melongenae Thüm. — по синъ патладжанъ: Минкова махала — 165, 352, *$_{*}$* — 352[a].

Sporidesmium putrefaciens Fuck. — по захарно цвекло: с. Куртово Конаре (Пловдивско)—105.

Sporidesmium solani — по картофа: Садово — 246, 254, 252.

Sporidesmium solani varians Yahn. Syn. Alternaria solani Sorauer, Macrosporium solani Ell. et Mart. — по картофа: Садово — 58, 59, 150, 352[a].

Sporonema phacidioides Desm. Syn. Pseudopeziza trifoli (Bernh.) Fuck.

Sporonia intermedia Auerswald. по * $_{*}$ * : * $_{*}$ * — 202.

Staganospora trifoli Fautrey — по Trifolium sp.: при Рилския монастиръ — 262.

Steganosporium kosaroffii Briosi. — по черница: Вратца — 326.

Steganosporium sirakoffii Bubàk. Syn. Thyrostroma kosaroffii Bubàk. — по черницата: Шуменското земл. училище, Макакъ, Каспичанъ (Шуменско), гр. Нови Пазаръ — 344, Вратца — 215, 76, 220, Орханийско — 220, *$_{*}$* — 352[a].

Stereum gausapatum Fr. — по дъски сапрофитно: оранжерията на Ботаническата градина на Университета София — 82.

Stereum hirsutum Willd. — по зименъ джбъ: Генишъ Ада — 131; — по джбъ: фандаклийското сечище на Държ. гора Генишъ Ада — 129, Дживелъ, Хърсово (Шуменско) — 344; — по букъ: гората на с. с. Хърсово, Дживелъ (Шуменско) — 344; — по буково корито: при върхъ Издремецъ (Стара планина) — 82; — по *$_{*}$*: Разпространена изъ България — 203.

Stereum insigne Bres. — по Fagus sp.: Зеленишкия балканъ — 203.

Stereum insignitum Q. — по буковъ пжнъ: при Габровския монастиръ — 81.

Stereum purpureum Pers. — по акация: Ботаническата градина на Университета София — 81; — по буковъ пжнъ: гората на Бофскитѣ колиби — 82.

ereum repandum Fr. — по буковъ пънъ: по коритото на р. Петровичка, западно отъ Боянския водопадъ, Витоша — 81.
ereum rugosum Pers. — по Corylus avellana L.: Рила — 203.
ereum spadiceum Pers. — по кората на дирекъ отъ акация: София — 81.
ereum suaveolens Fr. — по сухо стебло на топола, сапрофитно: София — 82.
gmatea mespili Sor. Syn. Entomosporium mespili (D. C.) Sacc., Entomosporium maculatum Lév., Morthiera Fuck.
romatinia cinerea (Bon.) Schr. Syn. Monilia cinerea Bon. — по сливи: Бургасъ — 352[a], с. с. Сливница, Студена (Софийско) — 351.
romatinia cydoniae Schell. Syn. Stromatinia linhartiana Prill. et Del. — по дюла: гр. Шуменъ — 344.
romatinia fructigena (Pers.) Schröt. Syn. Monilia fructigena Pers. — по ябълки, круши: Шуменско — 344, Княжево, Дълбокъ Долъ — 352[a], Мехомия и с. Божаница — 351.
romatinia laxa Ehrenb. Syn. Monilia laxa Ader. et Ruhl. — по каисии: Шуменско — 344.
romatinia mespili Schell. Syn. Sclerotinia mespili Schell. — по мушмули: лозята на гр. Шуменъ — 344, 179, *** — 352[a].
ropharia aeruginosa Curt. — по земята: боровата гора надъ с. Княжево — 81.

T

phrina alni incanae Magn. — по Alnus incana Moench.: по течение на р. Рила въ Рилскомонастирскитѣ гори — 136.
phrina aurea (Pers.) Fries. — по пирамидална топола: Кьошковетѣ при гр. Шуменъ, с. Каспичанъ — 344; — по Populus canadensis Mönch.: Арборетума на Агрономическия факултетъ София — 136.
phrina bullata Berk. et Br. — по круша: Шуменъ — 344, *** — 352[a]; — по круши и люли: описана по материали отъ страната, включени въ сбирката на Центр. земл. изпит. институтъ София — 179.
phrina carpini Rostr. Syn. Exoascus carpini Rostr.
phrina deformans Tul. Syn. Exoascus deformans Tul.
phrina insititiae Sad. — по джанка: *** — 352[a]; — по овощнитѣ дървета: Пирдопско—350.
phrina polyspora (Sorok.) Joh. — по Acer tataricum L.: Садово — 202, 254, 261.
phrina rostrupiana Giesenh. — по трънка: София — 184, *** — 352[a].
phrina sadebecki Johans — по Alnus glutinosa Gärtn.: Банско — 334.
aecospora vacciniorum (Link) Karst. — по Vaccinium sp.: Рила — 203; — по Vaccinium vitis idaea L.: между Соколецъ и Чамъ Кория — 262; — по Vaccinium myrtillus L.: м. Череша близо до Рилския монастиръ — 262.
aelephora cristata Pers. — по земята: боровата гора надъ с. Княжево — 81.
aelephora diffusa Fr. Syn. Thelephora palmata (Scop.) Fr. — по чамови дъски сапрофитно: парницитѣ на Ботаническата градина на Университета София — 82.
aelephora palmata (Scop.) Fr. Syn. Thelephora diffusa Fr.
nyrococum sirakoffii Bubák Syn. Steganosporium sirakoffii Bubák—по черница: Вратца—76, 78.
nyrostroma kosaroffii (Briosi) Bubák Syn. Steganosporium sirakoffii Bubák, Steganosporium kosaroffii Briosi, Thyrococum sirakoffii Bubák — по черница: Вратца — 78.
Illetia belgradensis Magnus Syn. Tilletia velenovsky.
Illetia caries Tull. Syn. Tilletia tritici Bjerk.
Illetia decipens (Pers.) Körnicke — по Agrostis rupestris All.: Рила — 66; — по Agrostis vulgaris With.: между Троянъ и Троянския монастиръ — 203.
Illetia foetens Berkeley et Curtis Syn. Tilletia levis Kühn.
Illetia glomerulata Cocc. et Mor. — по Trifolium repens L.: Садово — 252.
Illetia levis Kühn Syn. Tilletia foetens — по пшеница: Бургаско, Ст.-Загорско, Пловдивско — 244, с. Харманлъкъ (Добричко) — 149, Образцовъ-чифликъ — 378, опитнитѣ полета Садово и София — 282, Садово и околностьта — 240, 231, Русенско — 272, 187, Опитното поле София — 352[a], 352, Ломъ — 273, Луковитска, Троянска, Никополска околии, Търновско. с. Руженци (Бѣлоградчишко) — 220, Образцовъ-чифликъ, Опитното поле София, Шуменъ — 352, 184, на много мѣста изъ царството — 253; — по Triticum vulgare Vill., Triticum durum Dsf., Triticum turgidum L.: твърде много разпространена у насъ — 245, 252, 254, 261; — по Triticum vulgare Vill.: при Троянския балканъ — 203, Банско — 334.

Tilletia loli Auersw. — по Lolium temulentum L.: с. Бойково (Пловдивско)—203, 252, 254, 261.
Tilletia pančići Bubàk et Ranojevič — по ечемикъ: Образцовъ чифликъ — 219, 72, 218, 352[a]; — по Hordeum tetrastichum: Русе — 203.
Tilletia secalis (Corda) Kühn — по Secale cereale L.: с. Бойково (Пловдивско) — 203, 252, 254, 261.
Tilletia tritici Bjerk. Syn. Tilletia caries Tull. — по пшеница: с. с. Макакъ, Мадара, Имрихоръ, Калугерица, Дормушъ, Кюлевча, Инджикъ и Овчарово (Шуменско) — 344, Плѣвенска околия, Дрѣново — 209, Русенско — 187, 272, с. Бѣла Черкова (Търновско) с. с. Бейпунаръ, Карапелитъ (Куртбунарско), Тутраканско, Севлиевско, Луковитско, Тетевенско, Плѣвенско, с. с. Каравеллеръ и Горица (Поповско), Ловчанско, Дрѣновско, с. с. Кириндж и Кованлъкъ (Добричко), Стакевци, Дражица (Бѣлоградчишко), Горна Орѣховица — 219, Балджи Омуръ и Водица (Поповско), Преславско, гр. Видинъ — 215, Садово — 252, 245, Луковитска, Троянска, Никополска околии, Търновско, и с. Руженци (Бѣлоградчишко) — 220, Опитното поле София, 348, *** — 352[a]; — по Triticum vulgare Vill.: София — 336, Садово — 254, 261.
Tilletia velenovsky Syn. Tilletia belgradensis Magnus — по Bromus arvensis L.: Садово — 66.
Trametes hispida Bagl. — по джбови греди: монастира при с. Струпецъ (Вратчанско) — 80.
Trametes odorata (Wulf.) Fr. — по чамови дъски сапрофитно: Ботаническата градина на Университета София — 82.
Trametes radiciperda R. Hart. Syn. Polyporus annosus Fries — по Pinus peuce Grisb.: Чамъ Кория — 131, 175.
Tremella encephala Willd. Syn. Noematelia encephala Willd. — по сухи борови клончета: Борисовата градина София — 82.
Tremella mesenterica Retz. — по клончета: с. Лѣтница (Чепинско), Родопитѣ, Костенския балканъ, София — 81; — по ***: при с. Лѣтница (Чепинско) — 109.
Tremella nigriscens Fr. — по кората на топола сапрофитно: Борисовата градина София — 82.
Trichocladia bäumleri (Magnus) Neger — по Vicia cassubica L.: Костенецъ Баня, между Чамъ Кория и Радуилъ — 203.
Trichocladia evonymi (D. C.) Neger — по Evonimus europaeus: между Лджене и Ракитово — 203.
Tricholoma album Sch. — по земята: Света гора (Търново), с. Пройновци (Габровско) въ буковата гора, Вратчанския балканъ — 81, Мургашъ планина — 82.
Tricholoma carneum (Bull.) Fr. — по земята: с. Лисецъ (Габровско) — 81.
Tricholoma equestre (L.) Fr. — по ***: Крива рѣка (Рила) — 203.
Tricholoma georgii (L.) (Fr.) — по земята: брѣзовата гора при Духовната семинария София — 81.
Tricholoma murinaceum Bull. — по дънери отъ зименъ джбъ, сапрофитно: джбовата гора на западъ отъ Елешничкия монастиръ къмъ с. Желява — 82.
Tricholoma nudum Bull. — по земята: боровата гора при Духовната семинария, София — 81, Мургашъ планина — 82.
Tricholoma terreum Schaeff. — по земята: боровата гора при Духовната семинария София — 82.
Trichosphaeria parasitica Hart. — по Abies pectinata L.: Чамъ Кория — 134.
Trichotecium roseum Link — по круши: Ямболския разсадникъ — 179, *** — 352[a]; — по царевични кочани: Образцовъ-чифликъ — 79.
Triphragmium filipendula (Lasch.) Pass. — по Spiraea ulmaria L.: Витоша — 336; — по Spiraea filipendula L.: близо до Рилския монастиръ — 262.
Triphragmium ulmariae (Schum.) Winter — по Spiraea ulmaria L.: Рилския монастиръ, Рибнитѣ езера (Рила) — 262, Чамъ Кория, Рила — 203.
Tragia faginea Schr. — по букъ: държ. гора Петрохански проходъ — 134.
Tubercularia nigricans Tode — по черница: Вратца — 78.

U

Uncinula aceris (D. C.) Sacc. — по Acer campestre L.: Кьошковетѣ при гр. Шуменъ, с. Кюлевча (Шуменско) — 344, пѫтя отъ Княжево за Владая — 336, между Бѣлово и Алабакъ, Костенецъ, Черепишкия монастиръ, между Колибитѣ и Зеленишкия монастиръ — 203.
Uncinula bivonae (Lév) Schr. Syn. Uncinula clandestina Schr

ncinula cladestina Schr. Syn. Uncinula bivonae Lév. — по Ulmus campestris var. suberosa Wahl.: гората на с. Марковча (Шуменско) — 344.

ncinula necator (Schw.) Burr. — по лоза: Кюстендилъ, Русе — 351, *** : 352[a], Т. Пазарджикъ, В. Търново, Ст. Загора, Пловдивъ и околноститѣ имъ — 119.

ncinula necator (Schw.) Burr. Syn. Oidium tuckeri Berk.

ncinula prunastri (D. C.) Sacc. — по Prunus spinosa L.: при Баня Костенецъ — 262, Костенецъ, Баня при Лъджене, Черепишкия монастиръ, между гр. Троянъ и Троянския монастиръ — 203.

ncinula salicis (D. C.) Winter — по Salix alba L.: Садово — 245, 252, 254, 261; — по Salix purpurea L.: Садово, Родопигѣ при Бойково — 203.

ncinula spiralis Burr. Syn. Oidium tuckeri Berk.

redo pirolae (Gmelin) Winter — по Pirola rotundifolia L.: Пиринъ по р. Бъндерица — 334.

rocystis anemones (Pers.) Winter — по Helleborus viridis L.(?): Драгалевци, Витоша, Долно Тлъмино (Кюстендилско) — 336; — по Helleborus odorus W. K.: Троянския балканъ при Черепишъ — 203.

rocystis occulta Rabenh. — по ръжь: изъ Родопитѣ — 244, Садово и с. Бѣла Черкова (Родопитѣ) — 240, 252, 254, 261, Садово — 253, *** — 352[a].

romyces alchemillae (Pers.) Winter — по Alchemilla vulgaris L.: Витоша — 159, 351, Петроханъ — 349, при постъ Доганица (Крайщето) — 336, на всѣкждe по Пиринскитѣ върхове надъ 1,000 м. височина — 334, Долна Ломница при Рилския монастиръ — 262, Рила — 203; — по Alchemilla pubescens Buser.: Демиръ Капия (Рила) — 203.

romyces alpinus Schroet. — по Rumex alpinus L.: при Рилския монастиръ — 262.

romyces anthyllidis (Grév.) Schr. — по Anthyllis vulneraria L.: София — 159, малката мера на Кабиюкъ (Шуменско) — 344; — по Coronilla varia L.: Черепишкия монастиръ 335.

romyces apiosporus Hazelinski — по Primula minima L.: на северо-западъ отъ Попово езеро (Пиринъ планина) — 334.

romyces appendiculatus (Pers.) Lév. Syn. Uromyces phaseoli (Pers.) Winter — по фасула: зеленчуковитѣ градини на гр. Шуменъ — 344, Ловчанска околия, Образцовъ чифликъ — 219; — по Phaseolus vulgaris L.: с. Драгалевци (Софийско) — 336, Банско — 334, с. Церово — 335.

romyces armeriae (Lév.) Schl. — по Armeria majellensis Boiss. var rodopea V.: Витоша — 159.

romyces behenis (D. C.) Ung. — по Silene inflata Sm.: Кобилино бранище (Рила) — 262, Рила — 203.

romyces betae (Pers.) Tul. — по захарно цвекло: с. Каспичанъ (Шуменско) — 344; — по градинско цвекло: Шуменъ — 344; — по кръмно и захарно цвекло: *** — 352[a].

romyces caryophyllinus (Schr.) Winter — по Dianthus corymbosus Sibt.: Лозеница — 159.

romyces dactylidis Otth. — по Ranunculus arvensis L.: Борисовата градина (София) — 159; — по Ranunculus acer L.: Галвицъ — 161; — по Molinia coerulea Mch.: Садово — 252, 254, 261.

romyces ervi (Wallr.) Plowr. — по Vicia hirsuta: Рила — 203.

romyces erythronii (D. C.) Pass. — по Erythronium dens canis L.: Курило — 159.

romyces fabae (Pers.) de Bary — по Vicia sepium L.: Витоша — 159, Рила, Чамъ Кория — 203; — по Orobus vernus L.: Борисовъ постъ (Бѣласица) — 161, Алабакъ при Бѣлово — 262, 203; — по бакла: Шуменската мжжка гимназия — 344, Опитното поле Образцовъ чифликъ — 219, Попово — 220, Софийско — 184, 352, Драгалевския монастиръ (Софийско) — 336, Садово — 252, 254, 261, Троянския балканъ — 203; — по Lathyrus tuberosus L.: *** — 349; — по Lathyrus vernus Bernh.: Лакатникъ — 335; — по фий: Садово — 351, Горна Джумая — 352[a]; — по Vicia sativa L.: надъ Банско по р. Бъндерица — 334.

romyces ficariae (Schum.) Winter — по Ficaria verna Huds.: Бѣласица — 161.

romyces fulgens (Hazsel) Bubàk — по Cytisus hirsutus L.: Костенецъ, Бѣлово, Чамъ Кория — 203.

romyces genistae Schr. — по Genista elatior L.: Витоша — 159; — по Cytisus laburnum L.: Борисовата градина София — 161; — по Galega orientalis L.: Бѣласица, Ботаническата градина на Университета София — 161; — по Galega officinalis L., Cytisus sp.: Бѣласица — 161; — по Colutea arborescens L.: Ботаническата градина на Университета София — 161; — по Cytisus sagitalis: Витоша — 336.

romyces genistae tinctoria Fuckel — по Galega officinalis L.: Садово — 254, 261.

Uromyces geranii (D. C.) Otth. et Winter — по Geranium rotundifolium L.: Персенка балканъ — 66, Баня при Лжджене — 203; — по Geranium pyrenaicum L.: Витоша при Бояна — 336.

Uromyces graminis (Niessl.) Diet. — по Melica ciliata L.: Черепишъ — 203.

Uromyces medicaginis falcatae D. C. — по Medicago minima Bert.: по течение на р. Бъндерица (Пиринъ) — 334.

Uromyces minor Schroeter — по Trifolium subterraneum L.: Казанлъкъ изъ разсадника — 349; — по детелина: *$_{*}$* — 352[a].

Uromyces narbonensis — по кардонски фий: Садово опитното поле — 231.

Uromyces onobrychidis (Desm.) Lév. — по Onobrychis gracilis Bess.: Хасково — 66; — по Onobrychis sativa L.: Мездра — 335.

Uromyces orobi (Pers.) Plowr. — по Lathyrus montanus Bernh.: Витоша — 159.

Uromyces phaseoli (Pers.) Winter Syn. Uromyces phaseolorum — по фасула: Родопскитѣ села — 244, Хасково — 66, *$_{*}$* — 352[a], при Лжджене — 203; — по Phaseolus vulgaris L.: с. Нареченъ (Станимашко), с. Бойково (Пловдивско) — 245, 252, 254, 261.

Uromyces phaseolorum Syn. Uromyces phaseoli (Pers.) Winter.

Uromyces pisi (Pers.) de Bary — по Euphorbia cyparissias L.: около София — 159; — по грахъ: *$_{*}$*—352[a]; — по фий: с. с. Мурадалларъ, Макакъ, Марашъ (Шуменско) — 344; — по млѣчка: Витоша — 351; — по Lathyrus setifolius L.: Харманлий — 66; — по Lathyrus silvestris L.: Садово — 203, 254, 261.

Uromyces poae Rab. — по Ficaria verna Huds.: Галвицъ — 161, около Сарай (Тракия), — 336; — по Poa trivialis L., Poa nemoralis L.: Садово — 254, 261.

Uromyces poiraulti Hariot. — по Verbascum thapsiforme Schrad.: Опитното поле София — 349, 352[a].

Uromyces polygoni (Pers.) Fuckel — по Polygonum aviculare L.: Борисовата градина София — 159, Елисейна — 335, Троянския балканъ — 203.

Uromyces primulae-integrifoliae (D. C.) Niessl. — по Primula deorum Vel.: Рибнитѣ езера (Рила) — 262, Рила, Мусала — 203.

Uromyces reticulatus (Thüm.) Bubàk — по Alium victorialis L.: Рила — 203.

Uromyces rumicis (Schum.) Winter — по Rumex obtusifolius L.: Рила — 203.

Uromyces scirpi — по Scirpis maritimus L.: Садово — 254, 261.

Uromyces scrophulariae (D. C.) Winter — по Verbascum nigrum L.: Витоша — 159; — по Verbascum phlomoides L.: с. Драгалевци (Софийско) — 336; — по Scrophularia nodosa L.: Алабакъ (Пловдивско) — 203.

Uromyces scutellatus (Schrank) Winter — по Euphorbia gerardiana Jaq.: София — 159; — по Euphorbia cyparissias L.: по р. Бъндерица (Пиринъ) — 334.

Uromyces striatus Schroet. — по люцерна: Кабиюкъ — 344, *$_{*}$* — 352[a], с. Минкова махала (Фердинандско) — 220; — по детелината: *$_{*}$* — 352[a]; — по Medicago rigidula Desf.: Харманлий — 66; — по Trifolium procumbens L.: с. Бойково (Пловдивско) — 254, 261; — по Trifolium aureum L.: пѫтя отъ Юндола къмъ с. Якоруда — 334; — по Medicago falcata L., Medicago sativa L., Trifolium arvense L.: Своге, Черепишкия монастиръ, Мездра — 335.

Uromyces trifolii (Alb. et Schw.) Winter — по Trifolium pratense L.: с. Колешъ (Бѣласица) — 161, Борисовата градина София — 159, Садово — 245, 252, 254, 261, 203; — по Trifolium fragiferum L.: с. Колешъ (Бѣласица) — 161; — по детелина: *$_{*}$* — 352[a], Опитното поле София — 348, Садово — 231, 240; — по Trifolium medium L.: Борисовата градина София — 159.

Uromyces trifolii repentis (Cast.) Liro — по Trifolium repens L.: Троянския балканъ — 203.

Uromyces valerianae (Schum.) Fuck. — по Valeriana tripteris L.: Пиринъ, Илинска ржка — 334; — по Valeriana montana L.: Рила, Чамъ Кория — 203; — по Valeriana officinalis L.: Костенецъ — 203.

Uromyces valesiacus Ed. Fischer — по Ervum ervilia L.: Белишки ханъ, по пѫтя отъ старата граница къмъ с. Якоруда — 334.

Uromyces veratri (D. C.) Winter — по Veratrum album L.: Витоша — 159.

Uromyces viciae fabae Schröter — по бакла: Ямболъ — 246; — по *$_{*}$*: *$_{*}$* — 245.

Ustilago andropogonis Kellerm. et Swingle — по Sorghum halepense Pers.: Ломския лозовъ разсадникъ — 349.

Ustilago arrhenatheri — по Arrhenatherum elatius: Садово — 244.

Ustilago avenae (Pers.) Jensen — по овеса: Макакъ, Енджe, Кабиюкъ (Шуменско) — 344, Зараево, Гагово, Опака, Хайдаръ (Поповско), Самоводене (Търновско), Раковски, Юзгюбелникъ (Балчишко) — 209, Опитното поле София — 348, 351, 350, 352, Садово — 244, 240, 231, с. Пранга (Станимашко) — 149, Образцовъ чифликъ — 378, 331, 379, Видинъ, Вратца — 352, *$_{\text{ж}}$* — 352$^{\text{а}}$, Луковитска, Тетевенска, Ловчанска, Търновска, Ески Джумайска околии — 220, Добричкото земл. училище и околностьта, с. Имренчево (Преславско) — 215, с. Асфаткьой (Тутраканско), с. Ганчовецъ (Дрѣновско), Владимирово, Сердементъ, Каралезъ, Пчеларово и др. (Добричко), Фердинандъ и с. Бѣлотинци, Бѣла Черкова, Хотница, Голѣмо Ййларе, Михалци, Мусина (Търновско), Добричкото земл. училище, изъ задния край на Плѣвенска околия, Кнежа, Рабиша, Кладорупъ (Бѣлоградчишко), Ломска, Горно Орѣховска околии — 219, с. Трънска-Клисура — 260; — по Avena sativa L.: с. Драгалевци (Софийско), с. Батановци (Брѣзнишко) — 336, Банско — 334, изъ Искърския проломъ отъ Клисура до Мездра — 335. Садово — 245, 252, 254, 261.

Ustilago bromivora Fischer v. Wald. — по Bromus arvensis L.: Каваклий — Геренъ — 66.

Ustilago bulgarica Bubàk — по Sorghum vulgare L.: Садово — 77, *$_{\text{ж}}$* — 352$^{\text{а}}$; — по Sorghum vulgare scoparium: Садово — 203.

Ustilago carbo Syn. Ustilago tritici (Pers) Jens.

Ustilago carnea Liro — по Polygonum convolvulus L.: Троянския балканъ, Черепишъ, Драгоманъ — 203.

Ustilago cramerii Körn. — по лудо просо: Имрихоръ, Кайкж (Шуменско) и Шуменското земледѣлско училище — 344, *$_{\text{ж}}$* — 352$^{\text{а}}$; — по Setaria italica: Садово — 245, 252. 254, 261.

Ustilago cruenta Kühn — по Sorghum saccharatum L.: Образцовъ чифликъ — 203.

Ustilago crus galli Tracy et Earle — по Panicum crus galli L.: Садово — 203.

Ustilago cynodontis P. Henning — по Cynodon dactylon Pers.: Садово — 252, 254, 261.

Ustilago hordei (Pers.) Kell. et Sw. Syn. Ustilago jenseni Rostrup — по ечемикъ: с. Макакъ (Шуменско) — 344. Търновско, с. Хайдемиръ (Силистренско), Борушъ, Разградска, Поповска околии — 209, Опитното поле София — 348, 172, 352, Садово — 149, 244, 253, 240, 380, 231, Шуменъ, Ески Джумая, Ст. Загора, Попово — 352, *$_{\text{ж}}$* — 352$^{\text{а}}$, Шуменъ — 351, Бранковци, Царь Шишманово (Бѣлоградчишко), Троянска, Луковитска, Разградска, Видинска, Добричка, Ловчанска околии — 220, Луковитска Тетевенска околии, гр. Фердинандъ и с. Бѣлотинци, Врабево, Дебнево (Троянско), с. Каралезъ, Владимирово, Сердементъ (Добричко), Балчишка околия, Севлиевско, с. Ковачевецъ (Поповско), с. с. Голѣма и Малка Кайнарджа (Силистренско), Добричкото земледѣлско училище, Долна Орѣховица, Влашица, Миндя (Горно Орѣховско), с. Раковица, Старопатица (Кулско), Дрѣновско, Ломско, Ловчанско, с. Стамболово (Търновско) — 219, Ловчанска околия, с. Янково (Преславско), Бѣлинска, Русенска. Луковитска околии, Текенска община (Балчишко), Добричко земледѣлско училище — 215; — по Hordeum vulgare L.: Садово — 245, 252, 254, 261.

Ustilago jenseni Rostrup Syn. Ustilago hordei (Pers.) Kellerm. et Sw.

Ustilago ischaemi Fuckel — по Andropogon ischaemum L.: при с. Горна-баня (Софийско) — 349, при с. Бояна (Софийско) — 262.

Ustilago kolleri Wille — по овесъ: *$_{\text{ж}}$* — 352$^{\text{а}}$.

Ustilago levis (Kellerm. et Sw.) Magnus — по овеса: с. с. Абоба, Мурадалларъ (Шуменско) — 334, *$_{\text{ж}}$* — 352$^{\text{а}}$; — по Avena sativa L.: Батановци (Брѣзнишко) — 336, с. Бойково (Пловдивско) — 262, 203, Садово — 203,

Ustilago maydis Corda Syn. Ustilago Zeae (Beck.) Ung. — по царевица: Дупница — 172, Шуменско — 344, Кюстендилъ и Опитното поле София — 351, с. Велибей (Преславско), с. Батембергъ (Разградско), Ески Джумайско — 209, *$_{\text{ж}}$* — 352$^{\text{а}}$, Садово — 149, 240, 244, 245, 252, 253, 254, 260, 261, 150, 231, Образцовъ чифликъ — 378, Борушъ, Добричкото земледѣлско училище, Бѣлоградчишко, Фердинандско, Ломско, Шуменско, Разградско, Тутраканско, Луковитско, Тетевенско, Ески Джумайско — 219, Върба, Рабиша (Бѣлоградчишко), Царь Шишманово, Бранковци, Старопатица, Раковица (Кулско), Видинска и Луковитска околии — 220, Дупница, София — 352, с. Колешъ (Бѣласица) — 161, София, Казичане, с. Скриняно (Кюстендилско) — 336, навсѣкжде изъ Искърския проломъ, гдето е засѣта царевица отъ Курило до Мездра — 335, Бѣлоградчишко, Луковитско — 215.

Ustilago notarisii F. von Waldh. — по *$_{\text{ж}}$* : *$_{\text{ж}}$* — 245.

Ustilaga nuda (Jens.) Kellerm. — по ечемика: с. Макакъ, Кюлевча, Памукчий, Кайкж, Кабиюкъ (Шуменско), гр. Нови Пазаръ — 344, Русе — 352, Образцовъ чифликъ — 378, с. Макакъ (Шуменско), Попово, Златица, Ст. Загора, Горна Джумая — 352[a], Горно Тлъмино (Кюстендилско) — 336.

Ustilago (?) pančiči Bubàk et Ran. — по ечемикъ: с. Макакъ (Шуменско) — 344.

Ustilago panici-miliacei (Pers.) Wint. Syn. Sorosporium panici-miliacei (Pers.) Takahashi — по просо: Кадж, Дивдядово (Шуменско), гр. Нови Пазаръ — 344, Опитното поле София — 348, с. Кнежа — 352[a], Образцовъ чифликъ — 219, Тюркъ Смилъ, Старо село и др. (Тутраканско) — 215, София задъ Семинарията — 245, 252, 254, 261.

Ustilago perenans Rostr. — по Arrhenatherum elatius: Садово — 203, 252, 254, 261, с. Кждж (Шуменско) — 344.

Ustilago rabenhorstiana Kühn — по Panicum sanguinale L.: Садово — 252, 254, 261, 203.

Ustilago reiliana Kühn — по царевица: с. Абоба (Шуменско) — 344, Образцовъ чифликъ, Търновско — 219; — по захарна метла: Т. Пазарджикъ — 172, *** — 352[a]; — по обикновена метла: Образцовъ чифликъ, Търновско — 219; — по Sorghum halepense Pers.: Садово — 203, 252, 254, 261.

Ustilago segetum — по Андербергски овесъ: Садово — 253.

Ustilago sorghi (Link) Pass. — по метла: Садово — 149, 260, Образцовъ чифликъ — 219; — по Sorghum scoparium: по пжтя за Станимака — 252, 254, 261.

Ustilago sp. — по ечимика: Садово — 198.

Ustilago tecta hordei Jens. — по ечемикъ: Сливенъ, Земледѣлското училище Борушъ — 253.

Ustilago tritici (Pers.) Jensen Syn. Ustilago carbo — по пшеница: Шуменско — 344, с. Сайманово (Преславско), с. Хайдемиръ (Силистренско), Ески Джумайска околия, с. Поликрайще (Горно Орѣховско), околностьта на Разградъ, с. Борисово (Разградско), Кулска околия — 209, Опитното поле София — 348, 352, Садово — 244, 253, 149, 260, 240, 231, Тутраканско, Видинско, Кулско, Бѣлоградчишко, с. Махла (Берковско), Образцовъ чифликъ, с. Люта (Фердинандско), Борушкото земл. училище, Добричкото земл. училище, с. Каваклий (Ески Джумайско), Троянско, Ломско, Шуменско, Луковитска, Тетевенска, Севлиевска околии, с. Каябейкьой (Балчишко) — 219, околностьта на Тутраканъ, с. Тройца (Преславско), Русенско, Бѣлоградчишко (Батановци, Долни Ломъ, Срѣдогривъ, Руженци и др.), Бѣленско, Добричкото земл. училище, Текенска община (Балчишко) — 215, с. Недокланъ (Разградско), с. Руженци (Бѣлоградчишко), Ловчанска, Кулска, Луковитска, Плѣвенска, Троянска, Севлиевска околии — 220, Образцовъ чифликъ — 378, Русе, Пещера, Пирдопъ, Фердинандъ — 352, Видинъ, Ихтиманъ, Елхово, Ст. Загора — 352[a]; — по Triticum vulgare Vill., Triticum durum Dsf.: Садово — 245, 252, 254, 161; — по житото: гр. Фердинандъ — 184; — по Улка (Triticum vulgare Vill. var. lutescens All.): Садово — 240.

Ustilago utriculosa (Nees) Corda — по Polygonum persicaria L.: София Борисовата градина, Владая — 336, Лакатникъ, Черепишкия монастиръ — 335; — по Polygonum mite Schrank: Махала при Самоковъ — 203; — по Polygonum hydropiper L.: Садово — 252.

Ustilago violacea (Pers.) Tul. — по Silene inflata Sm.: с. Макакъ (Шуменско) — 344; — по Silene acaulis L.: между Батакъ и Пещера, Зеленишкия Балканъ, Рила, Мусала (2.900 м.) — 203; — по Saponaria officinalis L.: при Рилския монастиръ — 262, Черепишкия балканъ — 203.

Ustilago zeae (Beck.) Ung. Syn. Ustilago maydis Corda.

Ustilago zeae mays (D. C.) Winter — по Zea mays L.: Разпространена навсѣкжде изъ България — 203.

V

Valsa prunastri (Pers.) Fr. — по зарзали: овощния разсадникъ гр. Орѣхово — 215.

Venturia cerasi Eriks. — по череши, вишни: описана споредъ материали включени въ сбирката на Централния земледѣлски изпитателенъ институтъ София — 177.

Venturia inaequalis Aderh. Syn. Fusicladium dendriticum (Wal.) Fuck.

Venturia pyrina Aderh. Syn. Fusicladium pyrinum (Lib.) Fuck.

Venturia rumicis (Desm.) Winter — по Rumex alpinus L.: при Рибнитѣ езера въ Рила — 262, Демиръ Капия (Рила) — 203; — по Rumex obtusifolius L.: с. Бойково (Пловдивско) — 202, 254, 261.

enturia tremulae Aderh. — по Populus tremula L.: Чамъ Кория — 134.

ermicularia trichella Fries — по Hedera helix L.: Кюстендилско — 175.

ibrilaria sp. — по лоза: лозовия разсадникъ гр. Берковица — 312.

scum album L. — по ябълки: с. с. Хърсово, Дживелъ, Мурадалларъ, Клиседжикъ (Шуменско) — 344, Провадийско, Търновско и др. Въ България е доста разпространенъ — 317; Описанъ по материали включени въ сбирката на Централния земледѣлски изпитателенъ институтъ — 179; — по круши: с. с. Хърсово, Дживелъ Мурадалларъ, Клиседжикъ (Шуменско) — 344, с. Каравелларъ, Геванча (Поповско) — 215, описанъ споредъ материали включени въ сбирката на Централния земледѣлски изпитателенъ институтъ София — 179; — по габаръ, букъ, джбъ: Хърсово, Дживелъ (Шуменско) — 344; — по елха: Райково-Пашмакли — 351; — по Abies alba Mill.: с. Райково — 180.

X

antochrons ribis Syn. Polyporus ribis Fr.

ylaria hypoxylon L. — по каисия: Шуменъ — 344; — по изгнили парчета и клончета отъ букъ: Витоша — 81; — по буковъ пънъ: около Габровския монастиръ (Витоша) — 81; — по **: ** — 109.

ylaria polymorpha (Pers.) Grév. — по Lonicera sp.: Шуменско — 344.

Списъкъ

на причинителитѣ на болести по растенията, групирани по гостоприемникъ.

Гостоприемникъ неизвестенъ:

Amanita voginata
Boletus badius
„ edulis
„ luteus
„ piperatus
„ scaber
„ subtomentosus
Bovista gigantea
„ nigrescens
„ plumbea
Calvatia cyathiformis
Cantharellus aurantiacus
„ cibarius
Cercospora armoraciae
Clasterosporium carpophyllum
Clavaria aurea
„ flava
Claviceps purpurea
Clitosybe brumalis
„ ericetorum
„ inversa
Collybia radicata
Corticium cinereum
Daedalea quercina
„ unicolor
Evernia prunastri
Exoascus pruni
Fustularia crista galli
Geaster hydrometricus
Gomphidius roseus
Humaria convexula
Hypholoma fasciculare
Lactarius deliciosus
„ piperatus
„ torminosus
Lenzites saepiaria
Marasmius alliaceus
Melampsora salicina
Melampyrum arvense
Microsphaera evonymi
Ophiobolus vitalbae
Panus rudis
„ stypticus
Parmelia caperata
Pleurotus septicus
Polyporus borealis
Polyporus cinnabarinus
„ hirsutus
„ igniarius
„ pergamenens
„ radiatus
„ versicolor
Psaliota campestris
Puccinia actaeae-agropyri
„ caryophyllacearum
Rhinanthus crista galli
Rusula aeruginea
„ alutacea
Schizophyllum commune
Septoria urticae
Stereum hirsutum
Tricholoma equestre
Uromyces fabae
„ vicia fabae
Ustilago bulgarica
„ notarisii

Борикови храсталаци:

Agaricus fragilis
Russula fragilis

Дъски:

Fomes pinicola
Lentinus lepideus
„ squamosus
„ suffrutescens
Panus patellatis
Pluteus pellitus
Polyporus viridans
Poria viridans
Stereum gausapatum
Thelephora diffusa
„ palmata
Trametes odorata

Жита:

Puccinia glumarum
„ graminis
Septoria graminum

Житни зърна:

Gibberella saubinetii
Fusarium graminearum

Зеленчуковъ разсадъ:

Rhizoctonia sp.

Иглолистни дървета:

Lophodermium pinastri

Изъ нивитѣ:

Melampyrum arvense
Черенъ вѣтъръ

Овощни дървета:

Capnodium salicinum
Monilia fructigena
Nectria cinnabarina
„ ditissima
„ galligena
Phyllosticta persicae
Sclerotinia fructigena
Stromatinia fructigena
Taphrina insititiae

По земята:

Agaricus acris
„ amanita
„ edulis
„ ionis
„ muscarius
„ procerus
Amanita caesarea
„ voginata
Boletus badius
„ bovinus
„ bovinus var. mitis
„ chrysenteron
„ duriusculus
„ edulis
„ edulis var. reticulatus
„ flavus
„ glutinosus
„ granulatus
„ obsonius var. buxeus
„ pachypus
„ piperatus
„ pruinatus
„ satanas
„ scaber
„ scaber var. aurantius
„ scaber var. niveus
„ spadiceus
Bovista gigantea
Cantarellus aurantiacus
„ cibarius
„ cibarius var. ramosus
„ friesii
Choiromyces melandriformis
Clavaria aurea
„ coraloides
Clavaria flava
„ subtilis
Clitocybe candicans
„ cavipes var. comitialis
„ detrusa
„ diatreta
„ gyrans var. angustissima
„ hirneola
„ inversa var. flaccida
„ nebularis
„ parillis
„ rivulosa var. cerussata
„ rivulosa var. connata
„ rivulosa var. phyllophylla
„ splendens
„ suaveolens
„ tuba
Collybia clusilis
„ collina
„ driophila
„ erosa
„ fusipes
„ maculata
„ nitellina
„ radicata
Coprinus fimetarius var. macrorhizus
„ plicaceus
„ plicatilis
Cortinarius anomalus
„ brunneofulvus
„ firmus
Dermocybe anomalus
Dictyolus muscigenus
Geaster coliforme
„ hygrometricus
Geoglossum hirsutum
Hebeloma firmum
Helvella lacunosa
Hydnum cinereum
Hygrophorus chrysodon
„ coccineus
„ eburneus
„ niveus
„ penarius
„ virgineus
Hypholoma dispersum
Lactarius deliciosus
„ pallidus
„ piperatus
„ sp.
Lepiota castanea
„ citrophylla
„ clypeolaria var. ciratata
„ „ „ fellina
„ fellina
„ gracilentus
„ granulosa var. carcharias
„ holocericea
„ procera
„ procera var. rhacodes

Lycoperdon bovista
„ gemmatum
„ hyemale
„ pyriforme
Marasmius alliatus
„ ceratopus
„ dryophilus
„ oreades
Morchella esculenta
Mycena flavo-alba
„ nivea
„ pupa var. rosea
Omphalia leucophylla
Panaeolus campanulatus
„ sphinctrinus
Paxillus unvolutus
Peziza vesiculosa
Phallus impudicus
Pholiota togularis
„ unicolor
Pleurotus acerosus
Pluteus pellitus
Podocrea cornu-domae
Polyporus monthanus
„ perennis
„ sp.
Psalliota campestris
„ comtula
Psathyrella crenata
„ gracilis
Pseudoplectania nigrella
Psilocybe atrorufa
Russula densifolia
„ emetica
„ fellea
„ foetens
„ incarnata
„ lactea
„ lepida
„ mollis
„ mustelina
„ nigricans
„ punctata
„ rubra
„ sanguinea
Schizophyllum commune
Stropharia aeruginosa
Thelephora cristata
Tricholoma album
„ carneum
„ georgii
„ nudum
„ terreum

сухи клончета и листа:

Phisisporus bissinus
„ vulgaris
Polyporus neesii
„ picipes
Tremella mesenterica

Разни граминеи:

Epichloe typhina
Euphrasia officinalis
Rhinanthus major

Abies alba Mill. Syn. Abies pectinata L.:

Aecidium columnare
„ elatinum
Agaricus melleus
Armillaria mellea
Caliptospora goepertiana
Dasyscypha calyciformis
Lophodermium nervisequium
Melampsorella caryophyllacearum
„ cerastii
„ symphyti
Nectria cucurbitula
Polyporus fulvus
„ hartigii
Pucciniastrum caryophyllacearum
„ goeppertianum
Trichosphaeria parasitica
Метлообразенъ нарастъ отъ непаразитенъ произходъ.

Abies excelsa Link:

Pleurotus almeni
Polyporus abietinus
„ ungulatus

Abies sp. — ела:

Polyporus fulvus
„ hartigii
Viscum album

Acer campestre L. — кленъ:

Rhytisma acerinum
Uncinula aceris

Acer platanoides L. — шестилъ:

Rhytisma acerinum

Acer pseudoplatanus L. — яворъ:

Phleospora aceris
„ pseudoplatani
Rhytisma acerinum
„ punctatum

Acer sp. — кленъ, яворъ:

Nectria cinnabarina

Acer tataricum L. — кленъ, яворъ:

Taphrina polyspora

Achillea millefolium L. — равнецъ:

Puccinia millefolii

Aegopodium podagraria L. — благъ бъзъ:

Plasmopara nivea
Septoria podagrariae

Aesculus hippocastanum L. — дивъ (конски) кестенъ:
Cladosporium epiphyllum
Nectria cinnabarina
Schizophyllum comune

Ageratum sp. — сакъсче:
Cladosporium herbarum
Hormodendron cladosporioides
Mycosphaerella tulasni

Agrimonia (?) agrimonoides L. — камшикъ:
Sphaerotheca humuli

Agrimonia eupatoria L. — камшикъ, мотика:
Pucciniastrum agrimoniae
Sphaerotheca humuli

Agrimonia sp. — камшикъ, мотика:
Melampsora agrimoniae
Pucciniastrum agrimoniae

Agropyrum repens B. B. — троскотъ, пирей:
Claviceps purpurea

Agrostis rupestris All. — полевица:
Tilletia decipiens

Agrostis vulgaris With. — полевица:
Tilletia decipiens

Ajuga reptans L. — стрѣстниче, меча стжпка:
Ramularia ajugae

Alchemilla montana Willd. — шапиче, пàриче, самодивски ягоди:
Ovularia haplospora

Alchemilla pubescens Buser. — шапиче:
Uromyces alchemillae

Alchemilla subsericea G. G. — шапиче:
Sphaerotheca humuli

Alchemilla vulgaris L. — шапиче:
Ovularia haplospora
„ pussilla
Sphaerotheca humuli
Uromyces alchemillae

Alisma plantago L.:
Cylundrosporium alismacearum
Ovularia alismatis

Allium cepa L. — лукъ:
Botritis cinerea
Fusarium allii sativi
Macrosporium parasiticum
Peronospora schleidenii
Sclerotinia cepivorum
„ fuckeliana

Allium porrum L. — прасъ-лукъ:
Macrosporium parasiticum
Puccinia porri

Allium sativum L. — чесновъ лукъ:
Fusarium allii sativi
Peronospora schleideni
Puccinia allii
Sclerotinia cepivorum

Allium schoenoprasum L. — видъ лукъ:
Puccinia porri

Allium victorialis L. — видъ лукъ:
Uromyces reticulatus

Alnus glutinosa Gärtn.. — елша:
Capnodium salicinum
Leptolhyrmum alneum
Phyllactinia corylea
„ suffulta
Phyllosticta alni-glutinosae
Taphrina sadebecki

Alnus incana Moench. — бѣла елша:
Peniophora incarnata
Taphrina alni-incanae

Alnus viridis Lam. et D. C. — планинска елша
Passalora bacilligera var. alnobetulae

Alopecurus agrestis L. — класица:
Claviceps purpurea
Puccinia coronifera

Alopecurus geniculatus L. — класица:
Puccinia coronifera

Alopecurus pratensis L. — класица:
Claviceps purpurea
Puccinia coronifera

Alsine glomerata Wahl.:
Septoria vandassii

Althea rosea Cav. — ружа:
Puccinia malvacearum

Althea sp. — ружа:
Puccinia malvacearum

Alyssum calycinum L.—игловърхъ, поималка
Erysiphe polygoni

Alyssum orientale Ard.—игловърхъ, поималка
Albugo candida
Cystopus candidus

Amaranthus retroflexus L. — щиръ:
Albugo bliti
Cystopus bliti

aranthus silvestris Desf. — щиръ:
Cystopus bliti

ygdalus communis L. — бадемъ:
Cladosporium carpophyllum
Diplodia amygdali
Exoascus deformans
Polystigma ochraceum
„ rubrum
Puccinia pruni spinosae
Sclerotinia cinerea

chusa officinalis L. — паче гнездо:
Erysiphe cichoriacearum
Ramularia anchusae

dropogon ischaemum L.—садина, бузалъкъ:
Puccinia cesatii
Ustilago ischaemi

dropogon sp. — садина:
Sphacelotheca andropogonis

gelica silvestris L.:
Erysiphe polygoni
Fusicladium depressum
Puccinia angelicae

ethum graveolens L. — копъръ:
Erysiphe umbeliferum
Phoma anethi

hoxanthum odoratum L. — миризливка:
Epichloe typhyna

hriscus cerefolium Hoffm.:
Erysiphe polygoni

hyllis vulnearia L.:
Uromyces anthyllidis

um graveolens L. — целина, кирвизъ:
Cercospora apii
Phlyctaena magnusiana
Ramularia heraclei var. apii-graveolentis
Septoria apii

ilegia vulgaris L. — кандилка, кандило:
Erysiphe poligoni
Oidium erysiphoides

bis ochroleuca? (A. flavescens Grsb.):
Albugo candida
Cystopus candidus

bis turrita L.:
Albugo candida
Cystopus candidus
Erysiphe polygoni

Aristolochia clematitis L. — вълча ябалка:
Microthyrium microscopicum

Armeria majellensis var. rhodopea Vel.:
Uromyces armeriae

Armoracia rusticana L. (Cochlearia armoraciae L.) — хренъ:
Ramularia armoraciae

Arrenatherum elatior M. B. — французки райграсъ:
Ustilago arrenatheri
„ perenans

Artemisia absinthium L. — пелинъ:
Erysiphe cichoriacearum
Oidium tabaci
Puccinia abssynthi

Artemisia abrotamum L. — пелинъ:
Puccinia absynthii

Artemisia vulgaris L. — пелинъ:
Erysiphe cichoracearum
Oidium tabaci
Puccinia absynthii

Arum maculatum L. — змиярникъ:
Septoria ari

Asarum europaeum L. — копитникъ:
Puccinia asarina

Asparagus officinalis L. — зайча сѣнка:
Aecidium asparagi
Puccinia asparagi

Asperula odorata L. — лазаркина:
Puccinia galii

Asperula taurina L. — дивъ брочъ:
Puccinia helvetica

Astragalus glycyphyllus L. — клинъ, сграбиче, востегъ:
Erysiphe polygoni
Oidium erysiphoides

Astrantia major L.:
Farbaea astrantiae

Atragene alpina L. (Clematis alpina):
Puccinia atragenes

Atriplex hortense L. — лобода:
Peronospora effusa
Septoria atriplecis

Atriplex sp.:
Peronospora effusa

Avena elatior:
Epichloe typhina

Avena sativa L. — овесъ:
Cladosporium herbarum
Erysiphe graminis
Helminthosporium avenae
„ „ sativae
Hormodendron cladosporioides
Mycosphaerella tulasni
Oidium moniloides
Pleospora avenae
Puccinia coronifera
„ „ avenae
„ graminis
Scolecotrichum graminis
Ustilago avenae
„ kolleri
„ levis
„ segetum

Ballota nigra L. — копривка:
Erysiphe galeopsidis

Barbarea vulgaris R. Br. — елина:
Albugo candida
Cystopus candidus

Bellis perennis L. — парички:
Puccinia obscura

Berberis vulgaris L. — киселъ трънъ:
Aecidium berberidis
Puccinia graminis

Berteroa incana D. C. — я къркъ—я некъркъ:
Albugo candida
Cystopus candidus

Beta sp. — цвекло (захарно и кръмно), чукундуръ:
Бактериоза по цвеклото
Bacillus betae
„ bussei
„ lacerans
Bacterium tumefaciens
Cercospora beticola
Erysiphe communis
Fusarium beticola
Peronospora schachti
Phoma betae
Pleospora putrefaciens
Pythiun de baryanum
Rhizoktonia violacea
Sclerotinia libertiana
Sporidesmium putrefaciens
Uromyces betae

Beta vulgaris L. — цвекло:
Phoma betae

Beta trigyna W. K.:
Ramularia betae

Betula alba L. (Syn. Betula verrucosa Ehrh.)— бреза:
Melampsoridium betulinum
Phyllactinia corylea
„ suffulta

Betula pubescens E.:
Dothidella betulina
Polyporus velutinus

Betula sp. — бреза:
Capnodium salicinum
Gleosporium betulinum
Hypoxylon fuscum
Lenzites betulina
Phyllosticta fagi
Polyporus betulinus

Bidens orientalis Vel. — бутракъ:
Septoria bidentis

Bidens tripartitus L. — бутракъ:
Sphaerotheca humuli

Brachypodium silvaticum R. S.:
Puccinia baryi

Brassica napus oleifera D. C. — рапица:
Albugo candida
Cystopus candidus
Sclerotinia libertiana

Brassica oleracea L. — зеле:
Albugo candida
Cystopus candidus
Mycosphaerella brassicola
Olpidium brassicae
Orobanche ramosa
Peronospora brassicae
Phyllosticta brassicae
Plasmodiophora brassicae

Bromus arvensis L. — овсига:
Puccinia symphyti bromorum
Tilletia belgradensis
Tilletia velenovsky
Ustilago bromivora

Bromus mollis L. — овсига:
Puccinia symphyti-bromorum

Bromus sterilis L. — овсига:
Puccinia bromina

Bromus tectorum L. — овсига:
Puccinia symphyti-bromorum

pleurum apiculatum Friv.:
Puccinia bupleuri-falcati

pleurum falcatum L.:
Puccinia bupleuri-falcati

xus sempervirens L. — чимширъ:
Microthyrium macrosporium
Nectriella rousseliana
Phyllosticta buxi
Puccinia bixi

lamintha clinopodium:
Puccinia menthae

lamintha officinalis Moench.:
Puccinia menthae

ltha palustris L. — блатнякъ:
Erysiphe polygoni
Farbaea rousseauana

lystegia sepium R. Br. — зурлички, роклички:
Erysiphe polygoni
Puccinia convolvuli
Septoria calistegi

mpanula bononiensis L. — звънче:
Coleosporium campanulae

mpanula glomerata L. — звънче, кошче:
Coleosporium campanulae ranunculoides
Coleosporium campanulae

mpanula moesiaca Vel. — звънче, кошче:
Coleosporium campanulae ranunculoides
Coleosporium campanulae

mpanula ranunculoides L. — звънче, кошче:
Coleosporium campanulae

mpanula sp. — звънче, кошче:
Ramularia macrospora

mpanula trachelium L. — звънче, кошче:
Coleosporium campanulae

mpanula trachelium var. orientalis Boiss. — звънче, кошче:
Coleosporium campanulae

nnabis sativa L. — конопъ, гръсти:
Septoria canabis

psella bursa pastoris Moench. — овчарска торбичка, истравниче:
Albugo candida
Cystopus candidus

Capsicum annuum L. — пиперъ, чушки:
Cuscuta europaea
Cuscuta major
Macrosporium kosarowi

Carex atrata L. — острица:
Puccinia silvatica

Carex junceum (?) — острица:
Puccinia dioicae

Carex leporina L. — острица:
Puccinia caricis frigidaie

Carex muricata L. — острица:
Puccinia opizii

Carex riparia Curt. — острица:
Puccinia Magnusii

Carex sempervirens Vill. — острица:
Cintractia caricis

Carex sp. — острица:
Puccinia silvatica

Carlina longifolia Rchb. — решетка, бутракъ:
Puccinia carlinae
„ divergens

Carlina vulgaris L. — решетка:
Puccinia carlinae

Carpinus betulus L. — габъръ:
Exoascus carpini
Gnomoniella fimbriata
Polyporus versicolor
Taphrina carpini
Viscum album

Castanea sp. — кестенъ:
Cylyndrosporium castanicolum
Diplodina castaneae
Mycosphaerella maculiformis

Centaurea chrysolepis Vis. — метличина, синя метла:
Puccinia centaureae

Centaurea cyanus L. — метличина:
Puccinia cyani

Centaurea diffusa Lam. — метличина:
Puccinia centaureae

Centaurea iberica Fr. — метличина:
Puccinia centaureae

Centaurea jacea L. — метличина, синя метла:
Bremia lactucae
Puccinia caricis-montanae
„ centaureae
„ jacea

Centaurea maculosa Lam. — метличина:
Puccinia centaureae

Centaurea nervosa Willd. — метличина:
Puccinia centaureae

Centaurea pannonica Heuff. — метличина:
Puccinia centaureae

Centaurea stenolepis A. Kern. — метличина:
Puccinia centaureae
„ jacea

Cerastium semidecandrum L. — рожецъ:
Peronospora alisnearum

Chaerophyllum aureum L. — бълдаранъ, цволъ, шушанъ:
Puccinia chaerophylli

Chaerophyllum bulbosum L. — бълдаранъ:
Puccinia retifera

Chaerophyllum hirsutum L. — бълдаранъ:
Erysiphe polygoni

Chaerophyllum sp. — бълдаранъ:
Puccinia chaerophylli

Chaerophyllum temulum L. — бълдаранъ:
Erysiphe polygoni

Chamaecyparis lawsoniana Perl. — лаусонианскикипарисъ:
Bacterium tumefaciens

Chamaeoplium officinalle:
Albugo candida
Cystopus candidus

Cheiranthus annuus — шибой, ширбой, минкише:
Peronospora parasitica

Cheliodonium majus L. — змийско млѣко:
Septoria cheliodonii

Chenopodium album L. — сладка трева, лобода:
Peronospora effusa
„ effusa var. minor
„ minor

Chenopodium urbicum L. — лобода:
Cercospora chenopodii

Chenopodium vulgare L. — кокоша трева, смрѣдлива трева, лобода:
Puccinia menthae

Chondrilla juncea L. — млѣчка:
Erysiphe cichoriacearum
„ taurica
Oidium tabaci
Pleospora media

Cicer arietinum L. — нахутъ, лафутъ, слануткъ:
Ascochyta pisi

Cichorium intybus L. — синя жлъчка, жлъчка:
Entyloma cichorii
Pleospora herbarum
Puccinia cichorii

Circaea lutetiana L.:
Erysiphe polygoni
Puccinia circaeae

Cirsium appendiculatum Grsb. — паламида:
Puccinia cirsii
„ cirsii oleracei
„ cirsium
„ cnici-oleracei
„ suaveolens
Septoria bulgarica

Cirsium arvense Scop. — паламида:
Albugo candida
„ spinulosus
Cystopus candidus
„ spinulosus
„ tragopogonis
Puccinia cirsii
„ obtegens
„ suaviolens

Cirsium eriophorum Scop. — паламида:
Puccinia cirsii-eriophori

Cirsium lanceolatum Scop. — видъ паламида:
Erysiphe polygoni
Puccinia cirsii-lanceolati

Cirsium oleraceum Scop. — видъ паламида:
Puccinia cnici-oleracei

Citrus limonum — лимонъ:
Conyothyrium olivaceum var. hesperidium
Epicocum purpurascens

Clematis vitalba L. — поветъ:
Leptosphaeria haematites
„ rimalis
Pleospora flavo-fusca
„ herbarum
„ hispida
Pyrenophora flavo-fusca

Clematis viticella L. — поветь:
Puccinia agropiri
Septoria clematidis

Clinopodium vulgare L. Syn. Satureja clinopodium Benth. — черновръхъ:
Puccinia menthae

Cochlearia armoracis L. Syn. Armoracia rusticana L. — хренъ:
Ramularia armoraciae

Conium maculatum L. — бучинишъ:
Puccinia conii

Convolvulus arvensis L. — повитица:
Erysiphe communis
„ polygoni
Oidium erysiphoides
Septoria convolvuli

Convolvulus sp. — видъ повитица:
Aecidium convolvulinum

Cornus mas L. — видъ дрѣнъ:
Septoria corni maris

Cornus sanguinea L. — кучешки дрѣнъ, чашкодрѣнъ:
Erysiphe tortilis
Phyllosticta cornicola
Septoria cornicola

Coronilla varia L. — клинавче, бѣсно дърво:
Peronospora trifoliorum
Uromyces anthyllidis

Corylus avellana L. — обикновена леска:
Corticium comedens
Diatrype stigma
Diatrypella verrucaeformis
Gnomoniella coryli
Hypoxylon fuscum
Nectria cinnabarina
„ ditissima
„ galligena
Peniophora laevis
Phyllactinia corylea
„ suffulta
Stereum rugosum

Corylus colurna L. — турска леска:
Phyllactinia corylea
„ suffulta

Corylus sp. — леска:
Polyporus velutinus

Cotoneaster pyracantha Spch. Syn. Pyracantha coccinea Roem.:
Gymnosporangium confusum

Cotoneaster vulgaris Lindl. Syn. Cotoneaster integerrimus Med.:
Entomosporium maculatum
„ mespili
Morthiera sp.
Stigmatea mespili

Crataegus oxyacantha L. — глогъ:
Phleospora oxyacanthae
Roestelia lacerata
Septoria crataegi

Crataegus monogyna Jacq. — глогъ:
Gymnosporangium clavariaeforme
„ confusum

Crataegus sp. — глогъ:
Oidium crataegi
Panus hirtus
„ rubius
Podosphaera oxyacanthae
Polyporus corticola
„ velutinus

Crepis biennis L.:
Puccinia proecox

Crepis paludosa Mch.:
Puccinia major
Sphaerotheca fuliginea

Crepis rhoeadifolia M. B.:
Cystopus tragopogonis

Crepis setosa Hall.:
Puccinia crepidicola

Crucianella oxyloba Jka.:
Puccinia crucianellae

Cucumis melo L. — пъпешъ:
Gleosporium lagenarium
Macrosporium peponicolum
Sphaerotheca humuli

Cucumis sativa L. — краставица:
Gleosporium lagenarium
Scolecotrichum melophtorum
Sphaerotheca castagnei
„ humuli

Cucurbita pepo L. — тиква:
Erysiphe cichoriacearum
„ polygoni
Gleosporium lagenarium
Oidium erysiphoides
Plasmopara cubensis
Pseudoperonospora cubensis
Sphaerotheca castagnei
„ humuli

Cydonia vulgaris Pers. — дюла:
Bacterium tumefaciens
Cercospora tomenticola
Entomosporium maculatum
„ mespili
Gymnosporangium confusum
Monilia fructigena
„ linhartiana
Oidium crataegi
Phyllosticta cydoniae
Podosphaera oxyacanthae
Sclerotinia cydoniae
„ fructigena
„ linchartiana
Stigmatea mespili
Stromatinia cydoniae
„ linhartiana

Cynodon dactylon Pers. — троскотъ, пирей, айръкъ:
Phyllosticta cynodontis
Puccinia cynodontis
„ graminis
Ustilago cynodontis

Cynoglossum officinale L.:
Erysiphe cichoriacearum

Cyperus longus L. — кисела трева:
Puccinia romangnoliana

Cystopteris fragilis Bernh.:
Hyalospora polypodii

Cytisus hirsutus L. Syn. Cytisus falcatus Wik. — зановецъ, жълтъ салкъмъ:
Uromyces fulgens

Cytisus laburnum L. — жълтъ салкъмъ, жълто салкъмче:
Ceratophorum setosum
Uromyces genistae

Cytisus sagittalis L. — зановецъ, жълтурка, гроздана:
Uromyces genistae

Cytisus sp. — зановецъ, гроздана:
Uromyces genistae

Cytrulus vulgaris Schrad. — диня:
Gleosporium lagenarium
Macrosporium peponicolum
Scolecotrichum melophtorum
Sphaerotheca humuli

Dactylis glomerata L. — главица, ежова главичка, ежовка:
Claviceps purpurea
Epichloe typhina
Scolecotrichum graminis

Dianthus barbatus L.:
Puccinia dianthi

Dianthus corymbosus Sibth.:
Uromyces caryophillinus

Dianthus microlepis Boiss.:
Heterosphaeria linariae

Digitalis lanata Ehrh. — чехалче, бесниче, овча опашка:
Erysiphe taurica
Septoria digitalis

Digitalis viridiflora Lindl. — медна билка:
Erysiphe cichoriacearum
Oidium tabaci

Doronicum cordifolium Sternb. Syn. Doronicum columnale Ten. — дивъ трубенъ:
Puccinia doronici

Doronicum macrophyllum Fisch. Syn. Doronicum orphanidis Boiss.:
Puccinia doronici

Echinops albidus Boiss. et Sprun.:
Puccinia echinopis

Echinops banaticus Roch.:
Puccinia echinopis

Echinops microcephalus S. S.:
Puccinia echinopis

Echinops sphaerocephalus L.:
Puccinia echinopis

Echinops thracicus Vel.:
Erysiphe polygoni

Eleagnus angustifolius L. — миризлива върба:
Dichomera eleagni
Septoria eleagni

Epilobium angustifolium L.:
Puccinia gigantea
Pucciniastrum chamaenerii
Ramularia montana

Epilobium collinum Gmel.:
Puccinia epilobii tetragoni

Epilobium hirsutum L.:
Puccinia epilobii tetragoni

Epilobium montanum L.:
Puccinia epilobii tetragoni
Pucciniastrum epilobii

Epilobium roseum Schreb.:
Pucciniastrum epilobii

pilobium sp.:
Puccinia epilobii tetragoni

pilobium virgatum Fries:
Puccinia epilobii

rigeron canadensis L.:
Sphaerotheca humuli

rvum ervilia L. — уровъ:
Uromyces valesiacus

yngium campestre L. — вѣтрогонъ, вихрогонъ:
Puccinia eringi

ythronium dens canis L. — самодивско цвѣте, кривъ (наведенъ) дѣдо:
Uromyces erythronii

uonymus europaeus L. — чашкодрѣнъ:
Trichocladia euonymi

eonymus latifolius Scopp. — чашкодрѣнъ:
Marssonia thomasiana

uphorbia amygdaloides L. — млѣчка:
Endophyllum euphorbiae-silvaticae
Melampsora helioscopiae

uphorbia cyparissias L. — млѣчка:
Melampsora helioscopiae
Uromyces pisi
„ scutellatus

uphorbia dulcis Jacq. — млѣчка:
Melampsora euphorbiae dulcis

uphorbia esuloides Vel. — млѣчка:
Aecidium euphorbiae

uphorbia gerardiana Jacq. — млѣчка:
Uromyces scutellatus

uphorbia nuda Vel. — млѣчка:
Melampsora euphorbiae
„ helioscopiae

uphorbia peplis L. — млѣчка:
Melampsora helioscopiae

uphorbia salicifolia Host. — млѣчка:
Melampsora euphorbiae

uphorbia sp. — видъ млѣчка:
Uromyces pisi

uphorbia stricta L. — млѣчка:
Melampsora helioscopiae

uphrasia officinalis L. — млѣчка:
Sphaerotheca fuliginea

Fagus silvatica L. — букъ:
Chlorosplenium aeruginosum
Corticium lacteum
Hypoxylon fuscum
„ multiforme
Lenzites variegata
Nectria ditissima
Nummularia bulliardi
Peniophora cremea
„ setigera
Phyllactinia corylea
„ suffulta
Phyllosticta fagi
„ maculiformis
Pleurotus cornu copioides
„ striatulus
Polyporus ferruginosus
„ fomentarius
„ fulvus
„ versicolor

Fagus sp. — букъ:
Agaricus melleus
„ ostreatus
Armillaria mellea
Clavaria byssiseda
Crepidotus nollis
Daedalea unicolor
Fomes fulvus
„ igniarius
Gleosporium fagi
Lenzites flaccida
„ „ var. betulina
Lepiota persoonii
Marasmius cauticinalis
Mycena denticulata
Panus conchatus
„ pudens
„ stipticus
Peziza aurantiaca
„ coccinea
Phisosporus vulgaris
Pleurotus fimbricatus
„ limpidus
„ palatus
„ planus
„ striatulus
Pluteus exignus
Polyporus abietinus
„ arcularius
„ brumalis
„ caesius
„ colceolus
„ connatus
„ fomentarius
„ hirsutus
„ igniarius
„ officinalis
„ radiatus

Polyporus squamosus
„ velutinus
„ versicolor
„ zonatus
Polystictus hirsutus
Solenia poriaeformis
Stereum hirsutum
„ insigne
„ insignitum
„ purpureum
„ repandum
Tragia faginea
Viscum album
Xylaria hypoxylon

Festuca elatior L. — власатка, конецъ, бузалъкъ:
Puccinia coronifera

Ficaria verna Huds.:
Uromyces ficariae
„ poae

Filago arvensis L. — бѣла дъвка:
Cystopus tragopogonis

Foeniculum officinale L. — резене, дивъ копъръ:
Diplodia foeniculina

Fragaria sp. — ягода:
Ascochyta fragariae
Mycosphaerella fragariae
Phyllosticta fragaricola
Ramularia tulasnei
Septoria fragariae
Sphaerella fragariae

Fragaria vesca L. — ягода:
Ramularia tulasnei
Sphaerella fragariae

Fraxinus excelsior L. — осенъ:
Phyllosticta fraxinicola

Fraxinus ornus L. — маждрянъ:
Schyzophyllum alneum
Фасциация

Galega officinalis L. — жаблекъ, плюскачъ:
Erysiphe communis
Puccinia genistae
Uromyces genistae
„ „ tinctoria

Galega orientalis L. — жаблекъ, плюскачъ:
Uromyces genistae

Galeopsis bifida Boenn. — бударица:
Erysiphe galeopsidis

Galeopsis ladanum L. — бударица:
Septoria galeopsidis

Galeopsis pubescens Bess. — бударица:
Erysiphe galeopsidis

Galeopsis tetrahit L. — бударица:
Erysiphe galeopsidis

Galeopsis versicolor Curt. — бударица:
Erysiphe galeopsidis

Galium anisophyllum Vill. Schult. — енювче, драгайка:
Puccinia galiorum

Galium cruciata Scop. — енювче, венчила, гергевка:
Puccinia celacovskyana
„ valantinae

Galium mollugo L. — снювче, рослецъ:
Puccinia galii

Galium rotundifolium L. — енювче, драгайка:
Puccinia punctata

Galium silvestre Poll. — енювче, драгайка:
Puccinia punctata

Galium verum L. — енювче, енюва трева:
Puccinia galii
„ valantiae

Genista elatior L. — жълтуга:
Uromyces genistae

Gentiana asclepiadea L. — тинтява, свѣщилникъ:
Cronartium asclepiadeum
Ramularia evanida

Gentiana cruciata L. — тинтява, свѣщилникъ, злъчникъ:
Puccinia gentianae
Septoria тоševi

Geranium macrorrhitzum L. — здравецъ:
Ramularia geranii

Geranium pyrenaicum L. — здравецъ:
Ramularia geranii
Uromyces geranii

Geranium rotundifolium L. — здравецъ:
Uromyces geranii

Geranium silvaticum L. — здравецъ:
Dothidella confertissima
Plasmopara pusilla

eranium sp. — здравецъ:
Plasmopara pusilla

eum bulgaricum Panč. — невенъ, омайниче:
Septoria gei

eum montanum L. — омайниче, калешъ:
Erysiphe cichoriacearum
Ramularia gei

lechoma hederacea L. — гергьовдень, повлекливо изтравниче:
Puccinia glechomatis
„ lapsanae

lechoma hirsuta W. K. — урбаличи, рубалчи:
Ramularia calcea

ossypium herbaceum L. — памукъ:
Phyllosticta malkoffii

ossypium hirsutum — видъ памукъ:
Macrosporium nigricans

ossypium sp. — памукъ:
Bacterium gossypinus
„ malvacearum
Colletotrichum gossypii
Phyllosticta malkoffii
Бактериоза
Болесть по стеблото на памука
Растителни паразити отъ разреда на гжбитѣ

edera helix L. — бръшлянъ:
Phyllosticta hederae
„ milenae
Vermicularia trichella

elianthus annuus L. — слънчогледъ:
Botritis cinerea
Puccinia helianthi
Rhizopus nigricans
Sclerotinia fuckeliana
„ libertiana

elianthus tuberosus L. — голия, земна ябълка:
Puccinia helianthorum

elleborus odorus W. K. — кукурякъ:
Phyllosticta helleborella
„ helleboricola
„ helleborina
Urocystis anemones

elleborus viridis L. — кукурякъ:
Urocystis anemones

eracleum sibiricum L. — девесилъ:
Ascochyta heraclei

Heracleum ternatum Vel. — девесилъ:
Ramularia heraclei

Herniaria incana Lam. — бѣлило, развързанче:
Puccinia herniariae

Hibiscus esculentus L. — бамя, бамня, бамия:
Cicinnobolus abelmoschi
Erysiphe cichoriacearum
Macrosporium hibiscum
Oidium abelmoschi

Hieracium bauhini Bess. — миши уши:
Puccinia hieracii

Hieracium murorum L. — миши уши:
Puccinia hieracii

Hieracium pilosella L. — миши уши:
Puccinia hieracii

Hieracium sp. — миши уши:
Puccinia hieracii

Holcus lanatus L. — медовица:
Epychloe typhina

Homogyne alpina Cass.:
Puccinia conglomerata

Hordeum sp. — ечемикъ:
Alternaria brassicae
Ascochyta pisi (?)
Cladosporium herbarum
Claviceps purpurea
Erysiphe graminis
Helminthosporium gramineum
„ sp.
„ teres
Leptosphaeria herpotrichoides
Marssonia graminicola
„ secalis
Oidium moniloides
Ophiobolus herpotrichus
Puccinia dispersa
„ graminis
„ rubigo-vera
„ simplex
Rhynchosporium graminicola
Septoria graminum
Tilletia pančiči
Ustilago carbo
„ hordei
„ jenseni
„ nuda
„ pančiči
„ sp.
„ tecta hordei

Hordeum vulgare L. — ечемикъ:
Rhynchosporium graminicola
Ustilago hordei
„ jenseni

Hordeum tetrastichum — четириредовъ ечемикъ:
Tilletia pančiči

Humulus lupulus L. — хмелъ:
Cephalothecium roseum
Cuscuta europaea
„ major
Septoria humuli
Sphaerotheca castagnei
„ humuli

Hyoscyamus niger L. — блѣнъ, попадийка, буника:
Erysiphe cichoriacearum

Hypericum quadrangulum L. Syn. Hypericum maculatum Crantz. — звъника:
Erysiphe polygoni

Hypochaeris radicata L.:
Puccinia hypochaeridis

Impatiens noli tangere L. — слабонога, канаичичекъ:
Puccinia argentata
Sphaerotheca fuliginea
„ humuli

Inula britannica L. — оманъ:
Erysiphe cichoriacearum
Oidium tabaci

Inula helenium L. — оманъ:
Erysiphe cichoriacearum
Oidium tabaci

Inula sp. — оманъ:
Erysiphe communis

Iris germanica L. — перуника:
Heterosporium gracile

Iris graminea L. — перуника:
Puccinia iridis

Juglans nigra L. — орѣхъ:
Gnomonia leptostyla
Marssonia juglandis

Juglans regia L. — орѣхъ:
Corticium calceum
Cyphella albo-violascens
Gnomonia leptostyla
Marssonia juglandis
Septoria epicarpi

Juglans sp. — орѣхъ:
Ascochyta juglandis
Fomes igniarius
Gnomonia leptostyla
Marssonia juglandis
Microstroma juglandis
Phyllosticta juglandina
Polyporus igniarius
Schizophyllum alneum
Septoria epicarpi

Juniperus communis L.—смрика, хвойна, пиръ:
Gymnosporangium juniperinum

Juniperus nana Willd.—смрика, хвойна, пиръ:
Gymnosporangium juniperinum

Juniperus oxycedrus L. — смрика, хвойна, пиръ:
Arzenthobium oxycedri
Gymnosporangium clavariaeforme

Knautia arvensis var. rumelica Borb.:
Peronospora violacea

Knautia sp.:
Peronospora violacea

Lactuca muralis L. — видъ салата:
Puccinia chondrillae
„ lactucarum
„ opizii

Lactuca sativa L. — градинска салата, маруля, салата:
Bremia lactucae

Lactuca scariola L. — салата:
Erysiphe cichoriacearum
Oidium tabaci

Lactuca virosa L. — салата:
Puccinia opizii

Lagenaria vulgaris Ser. — кратуна:
Sphaerotheca humuli

Lamium bithynicum Benth. Syn. Lamium garganicum L. var. glabratum Grisb. — гергйовче:
Erysiphe galeopsidis
Septoria lamii

Lamium sp. — гергйовче:
Septoria lamiicola

Lapsana communis L. — горчива лобода, посѣкливче:
Puccinia lapsanae
Ramularia lapsanae

appa macrosperma Wallr. Syn. Lappa nemorosun Lej. — репей:
Phyllosticta lappae

appa major L. (Gaertn.) — репей:
Erysiphe cichoriacearum
Oidium tabaci
Puccinia bardanae

appa sp. — репей:
Puccinia bardanae

athyrus montanus Bernh. Syn. Lathyrus tuberosus L.:
Uromyces orobi

athyrus pratensis L.:
Erysiphe polygoni

athyrus setifolius L.:
Uromyces pisi

athyrus silvestris L. — секирче, костиломъ:
Uromyces pisi

athyrus tuberosus L. — орешковиня, фасуличе:
Uromyces fabae

athyrus vernus Bernh.:
Uromyces fabae

eontodon hastilis L.:
Puccinia leontodontis

eontodon hispidus L.:
Puccinia leontodontis

eonurus cardiaca L. — дяволски уста, поималки, наметливо биле:
Erysiphe galeopsidis
Ramularia leonuri

inaria dalmatica Mill. — лулички:
Didymaria linariae

inum sp. — ленъ:
Erysiphe sp.
Fusarium lini
Melampsora lini

inum usitatissimum L. — ленъ:
Erysiphe polygoni
Melampsora lini

olium perene L. — английски райграсъ:
Claviceps purpurea
Puccinia coronifera

olium temulentum L. — пиявица:
Tilletia loli

Lonicera sp. — дяволски нокътъ:
Xylaria polymorpha

Luzula maxima D. C. Syn. Luzula silvatica Gaud.:
Puccinia bscura

Malva rotundifolia L. — слезъ:
Puccinia malvacearum

Malva silvestris L. Syn. M. vulgaris Fries — слезъ, камбулешъ:
Puccinia malvacearum

Malva sp. — слезъ:
Puccinia malvacearum

Medicago falcata L. — жълта, шведска люцерна:
Uromyces striatus

Medicago minima Bart. — вилъ люцерна:
Uromyces medicaginis falcatae

Medicago rigidula Desr. — видъ люцерна:
Uromyces striatus

Medicago sativa L. — обикновена люцерна:
Erysiphe martii
„ polygoni
Peronospora trifoliorum
Phyllosticta medicaginis
Pseudopeziza medicaginis
Uromyces striatus

Medicago sp. — люцерна:
Ascochyta medicaginis
Cuscuta corymbosa
„ epithymum
„ minor
„ racemosa
„ sp.
„ suaveolens
„ trifoli
Gleosporium caulivorum
Leptosphaeria circinans
Orobanche rubens
Peronospora trifoliorum
Pseudopeziza trifoli
Rhizoctonia medicaginis
„ violacea
Sclerotinia trifoliorum
Sporonema phacidioides
Uromyces striatus

Melampyrum sp. — гайтаника:
Sphaerotheca fuliginea

Mecca ciliata L.:
Uromyces graminis

Melilotus albus L. — бѣла кумонига:
Erysiphe polygoni

Melilotus officinalis Desr. — жълта кумонига:
Erysiphe polygoni

Melissa officinalis L. — маточина:
Septoria melicae

Mentha aquatica L. — дивъ джоджунъ:
Puccinia menthae

Mentha arvensis L. — видъ джоджунъ:
Puccinia menthae

Mentha molissima Brkh. — видъ джоджунъ:
Puccinia menthae

Mentha nigricans Mill. — видъ джоджунъ:
Puccinia menthae

Mentha piperata Huds. — видъ джоджунъ:
Puccinia menthae

Mentha silvatica L. — видъ джоджунъ:
Puccinia menthae

Mentha silvestris L. — видъ джоджунъ:
Puccinia menthae

Mercurialis perennis L.:
Cercospora mercurialis

Mespilus germanica L. — мушмула:
Entomosporium maculatum
„ mespili
Gymnosporangium confusum
Hendersonia mespili
Sclerotinia „
Stigmatea „
Stromatinia „

Moehringia trinervia Clairv. — зайча трева:
Puccinia arenariae

Molinia coerulea Mch.:
Puccinia molinae
Uromyces dactylidis

Morchella sp.:
Oidium leucoconium
Sphaerotheca pannosa

Morus alba L. — бѣла черница:
Cylindrosporium mori
Dematophora necatrix
Dermatophora „
Dothidea sambuci
Polyporus sulphureus
Rosellinia necatrix

Morus sp. — черница:
Agaricus melleus
Armillaria mellea
Bacillus cubonianus
Bacterium mori
Camarosporium mori
Cylindrosporium mori
Dematophora necatrix
Dermatophora „
Diplodia mori
Dothidea sambuci var. moricola
Dothiorellina tankoffii
Fusarium lateritium
„ mori
„ urticarum
Gibberella moricolla
Mycosphaerella sentina
Phleospora mori
Pleurotus reniformis
Rhizomorpha fragilis
Rosellinia necatrix
Sclerotinia sp.
Septoria mori
Sphaerella mori
„ sentina
Steganosporium kosaroffii
„ sirakoffii
Thyrostroma kosaroffii
Tubercularia nigricans
Бактерийна болесть по черницитѣ

Mulgedium alpinum Cass.:
Erysiphe cichoriacearum

Myosotis caespitosa Schult. — незабравка:
Erysiphe cichoriacearum

Myosotis silvestris:
Erysiphe cichoriacearum

Narcissus poeticus L. — нарцисъ:
Heterosporium gracile

Nasturtium pyrenaicum R. Br. — поречъ, друмче, изтравниче:
Albugo candida
Cystopus candidus

Nasturtium silvestre R. Br. — поречъ, друмче:
Albugo candida
Cystopus candidus

Nepeta nuda L. — коча билка, овчарски босилекъ:
Septoria nepetae

Nepeta pannonica Jacq. — коча билка, овчарски босилекъ:
Erysiphe taurica

erium sp. — олеандъръ:

Capnodium nerrii

icotiana sp. — тютюнъ, тутунъ:

Alternaria tenuis
Aphanomyces sp.
Ascochyta nicotiana
„ tabaci
Bacillus maculicola
„ tabacivorus
Bacterium tabaci
Erysiphe cichoriacearum
„ communis
Fusarium sp.
„ tabacivorum
Macrosporium commune
„ tabacinum
Oidium sp.
„ tabaci
Orobanche ramosa
Phelipaea „
Phylosticta fabaei
„ tabaci
Phytophthora nicotiana
Pleospora herbarum
Pythium de baryanum
Rhizoctonia sp.
Sclerotinia libertiana
Бактериоза по тютюневитѣ листа
Бѣла петнистость по тютюневитѣ листа
Жълти сухи петна по тютюневитѣ листа
Мозаична болесть
Пепелница или мътеница
Почерняване тютюневото стебло
Чума по разсада
Шарка по листата на тютюна

onnea atra Grsb.:

Erysiphe polygoni

ocymum basilicum L. — босилекъ:

Phyllosticta basilici

nobrychis gracilis Bess.:

Uromyces onobrychidis

Onobrychis sativa Vel. et Lam. — еспарзета:

Uromyces onobrychidis

nonis spinosa L. — черъ трънъ:

Erysiphe polygoni

nopordon acanthium L. — главесто търне, магарешки будилъ:

Ramularia onopordi

riganum vulgare L. — риганъ, руски чай:

Erysiphe cichoriacearum
Puccinia menthae

Orobus vernus L. — свилинецъ, диво шекерче, секирче:

Uromyces fabae

Ostrya carpinifolia Scop. — воденъ габъръ, пикливъ габъръ:

Gnomonia ostryae

Oxalis acetosella L. — киселецъ, щавилъ:

Sphaerella depazeaeformis

Paeonia decora Anders. — божуръ:

Cronartium asclepiadeum
Phyllosticta baldensis

Paeonia officinalis — божуръ:

Cronartium asclepiadeum

Panicum crus galli L. — дараджанъ, солукъ:

Cintractia crus galli
Ustilago crus galli

Panicum miliaceum L. — просо:

Sorosporium panici-miliacei
Ustilago panici-miliacei

Panicum sanguinale L. — пиръ:

Ustilago rabenhorstiana

Panicum sp. — просо:

Sorosporium panici-miliacei
Ustilago panici-miliacei

Papaver sp. — макъ:

Alternaria brassicae (somniferi)
Dendriphium penicillatum
Heterosporium echinatum
Macrosporium commune
Pleospora herbarum

Pastinaca hirsuta Panč. — видъ пащарнакъ:

Plasmopara nivea

Pastinaca opaca Berth. Вижъ Pastinaca sativa L. var. opaca Berth., Pastinaca sativa L. var. elatior Roch. — видъ пащарнакъ:

Erysiphe polygoni D. C.

Pastinaca urens Req. Syn. Pastinaca opaca Brh. — видъ пащарнакъ:

Cylindrosporium pimpinellae var. pastinacae

Paulownia imperialis Sieb. et Zucc.:

Phyllosticta paulowniae

Peplis alternifolia M. B.:

Doassansia peplidis

Petasites officinalis Mönch. — чобанка:

Aecidium tussilaginis
Coleosporium petasites
„ petasitidis

Petroselinum sativum Hoffm. — магданосъ, мерудия:

Cercospora apii
Septoria petroselini

Peucedanum alsaticum L. — майсаливче:

Puccinia bullata

Phaseolus sp. — фасулъ, бобъ:

Ascochyta pisi
Bacterium phaseoli
Colletotrichum lindemuthianum
Fusarium vasinfectum
Gloeosporium lindemuthianum
Mycosphaerella pinodes
Phyllosticta phaseolina
Pseudomonas phaseoli
Uromyces appendiculatus
„ phaseolorum
„ phaseoli
Бактерийна болесть по фасула
Повреди отъ вѣтъра (топлия вѣтъръ)

Phaseolus vulgaris L. — бобъ, фасулъ:

Uromyces appendiculatus
„ phaseoli
„ phaseolorum

Phegopteris dryopteris:

Hyalospora polyrodii

Philadelphus coronarius:

Ascochyta philadelphii

Phleum pratense L. — тимотейка, миша опашка:

Epichloe typhina

Phlomis pungens Willd. var. hirta Vel.:

Erysiphe taurica

Phragmites communis Trin. — тръстика, тръстъ:

Aecidium inulae-helenii constantineanu
Puccinia magnusiana
„ phragmitis
„ traili
Scirrhia rimosa

Physalis alkekengi L. — мехунка, мехунче:

Sphaerotheca humuli

Picea excelsa Link. — смърчъ:

Aecidium strobilinum
Agaricus melleus
Armillaria mellea
Chrysomyxa abietis
„ pirolae
Fusarium blasticola
Fusoma parasiticum
„ pini
Herpotrichia nigra
Lenzites saepiaria
Lophodermium macrosporium
Polyporus annosus
„ vaporarius
Poria ferruginosa
Trametes radiciperda
Метли
Плосъкъ метлообразенъ нарастъ

Picea pungens Engel.:

Fusarium blasticola
Fusoma parasiticum
„ pini

Picris hieracioides L.:

Puccinia picridis

Pimpinella anisum L. — анасонъ:

Cercospora malkoffii
Plasmopara nivea
Puccinia pimpinellae

Pimpinella saxifraga L. — анасонъ:

Puccinia pimpinellae

Pinus laricio Host. Syn. Pinus nigricans Host. — черъ боръ:

Fusarium blasticola
Fusoma parasiticum
„ pini
Polyporus amorphus
Rhizina inflata
„ undulata
Плосъкъ нарастъ съ букетна форма

Pinus leucodermis Ant. Syn. Pinus nigricans Host. subsp. leucodermis Ant. — черна мура:

Lophodermium pinastri

Pinus mughus Scop. Syn. Pinus montana Mill., Pinus montana var. mughus Scop. — клекъ:

Dasyscypha calciformis
Herpotrichia nigra
Peridermium pini
Кълбестъ метлообразенъ нарастъ
Метли

inus peuce Grsb. — бѣла мура:

Agaricus melleus
Armillaria mellea
Polyporus annosus
Trametes radiciperda
Валчестъ метлообразенъ и фасциационенъ нарастъ
Фасциация

inus silvestris L. — бѣлъ боръ:

Caeoma pinitarquium
Coleosporium senecionis
„ sp., като Peridermium pini forma acicola
Fusarium blasticola
Fusoma parasiticum
„ pini
Lenzites saepiaria
Lophodermium pinastri
Melampsora pinitarqua
Peridermium oblongisporium
„ pini
„ sp.
Phytophthora omnivara
Polyporus vaporarius
Rhizina inflata
„ undulata
Кораловиденъ метлообразенъ нарастъ
Метли
Плосъкъ метлообразенъ нарастъ

inus sp. — боръ:

Armillaria glioderma
Coleosporium senecionis
Fusarium blasticola
Fusoma parasiticum
„ pini
Herpotrichia nigra
Lenzites saepiaria
Lophodermium pinastri
Noematelia encephala
Peridermium oblongisporium
Polyporus hirsutus
Rhizina inflata
„ undulata
Tremella encephalla

irola rotundifolia L.:

Uredo pirolae

isum sp. — грахъ:

Ascochyta pisi
Erysiphe pisi
Mycosphaerella pinodes
Uromyces pisi

lantago major L. — жаловлякъ:

Erysiphe cichoriacearum
Peronospora alta

Poa nemoralis L. — видъ ливадина:

Uromyces poae

Poa pratensis L. — ливадна ливадина:

Puccinia poarum

Poa trivialis L. — обикновена ливадина:

Uromyces poae

Polygonum amphibium L. — пипериче, лютика:

Puccinia polygoni amphibii

Polygonum aviculare L. — пача трева:

Erysiphe polygoni
Uromyces polygoni

Polygonum convolvulus L. — повитица, фасулявиче:

Puccinia polygoni
Ustilago carnea

Polygonum fagopyrum L. — елда, гречиха:

Phyllosticta polygonorum

Polygonum hydropiper L. — видъ гъшеница, лютивче, пипериче:

Sphacelotheca hydropiperis
Ustilago utriculosa

Polygonum lapatifolium L. Syn. Polygonum nodosum Pers. — прапоръ, лападъ:

Erysiphe polygoni
Septoria polygonicola

Polygonum mite Schrank — змийски пиперъ:

Ustilago utriculosa

Polygonum persicaria L. — прасковиче, прасковче:

Erysiphe polygoni
Puccinia polygoni amphibii
Ustilago utriculosa

Polygonum sp.:

Puccinia polygoni amphibii

Populus alba L. — бѣла, сребърна топола:

Marssonia castagnei

Populus balsamifera L. — миризлива топола:

Melampsora larici-populina

Populus canadensis Mönch. — канадска топола:

Melampsora mercuriali-tremulae
Taphrina aurea

Populus nigra L. — кавакъ, черна топола:

Melampsora populina

Populus pyramidalis Roz. — пирамидална топола:

Caeoma mercurialis
Melampsora larici-populina
Septoria populi
Taphrina aurea

Populus sp. — видъ топола:

Stereum suaveolens
Tremella nigrescens

Populus tremula L. — трепетлика, ясика, осика:

Fomes igniarius
Marssonia castagnei
Polyporus igniarius
Venturia tremulae

Portulaca oleracea L. — тученица, тлъстига:

Albugo portulacae
Cystopus portulacae

Potentilla alba L. — очеболецъ:

Phragmidium fragariastri

Potentilla arenaria L. — очеболецъ:

Phragmidium potentillae

Potentilla argentea L. — очеболецъ:

Phragmidium potentillae
Sphaerotheca humuli

Potentilla argentea L. var. angustisecta Th. W. — очеболецъ:

Phragmidium potentillae

Potentilla canescens Bess. Syn. Potentilla inclinata M. K. — очеболецъ:

Phragmidium potentillae

Potentilla fragariastri Ehrh. — очеболецъ:

Phragmidium fragariastri

Potentilla micranta Ram. — дива ягода:

Phragmidium fragariastri

Potentilla patula W. K. — очеболецъ:

Phragmidium fragariastri

Potentilla sp. — видъ очеболецъ

Phragmidium fragariastri
„ potentilae

Potentilla ternata C. Koch. — очеболецъ:

Peronospora potentilla

Prenanthes purpurea L.:

Erysiphe cichoriacearum
Puccinia prenanthis purpurea

Primula deorum Vel. — иглика:

Uromyces primulae integrifoliae

Primula minima L. — иглика:

Uromyces apiosporus

Primula sp. — иглика:

Ramularia primulae

Prunus armeniaca L. — зарзала, каисия:

Bacillus spongiosus
Cladosporium epiphyllum
Clasterosporium amigdalearum
„ carpophyllum
Cytospora rubescens
Dermattella prunastri
Exoascus deformans
„ insititiae
Fomes fulvus
Gloeosporium sp.
Lenzites betulina
Monilia cinerea
„ laxa
Phyllosticta prunicola
„ vindabonensis
Podosphaera tridactila
Polyporus fulvus
Polystigma rubrum
Puccinia pruni sponosae
Sclerotinia cinerea
„ laxa
Stromatinia cinerea
„ laxa
Taphrina deformans
„ insititiae
Valsa prunastri
Xylaria hypoxylon

Prunus avium L. — черешa:

Bacillus spongiosus
Bacterium tumefaciens
Cercospora cerasella
Cladosporium candilonema
Clasterosporium amygdalearum
„ carpophyllum
Cytospora rubescens
Dematophora necatrix
Exoascus cerasi
Fomes igniarius
Gloeosporium fructigenum
Gnomonia erytrostroma
Hydnum argutum
Monilia cinerea
„ fructigena
Mycosphaerella cerasella
Nectria ditissima
Phyllosticta cerasicola
„ prunicola
Podosphaera tridactyla

Polyporus fibula
„ igniarius
Puccinia cerasi
Rosellinia necatrix
Sclerotinia cinerea
„ fructigena
Septoria pallens
Stromatinia cinerea
„ fructigena
Taphrina cerasi
Valsa prunastri
Venturia cerasi
Слънчевъ изгоръ

Prunus cerasus L. — вишна:

Bacillus spongiosus
Cercospora cerasella
Clasterosporium carpophyllum
Exoascus cerasi
„ minor
Fomes igniarius
Gloeosporium fructigenum
Gnomonia erytrostroma
Monilia cinerea
Mycosphaerella cerasella
Phyllosticta prunicola
Polyporus candicinus
„ igniarius
„ sulphureus
Sclerotinia cinerea
Septoria pallens
Stromatinia cinerea
Taphrina cerasi
„ minor
Venturia cerasi
Слънчевъ изгоръ

Prunus divaricata Led. — джанка:

Agaricus melleus
Armillaria mellea
Cladosporium sp.
Fomes fulvus
Polyporus fulvus

Prunus domestica L. — синя слива:

Dematophora necatrix
Dermatophora necatrix
Exoascus pruni
Fomes fulvus
Polyporus fulvus
Polystigma rubrum
Puccinia pruni
„ „ spinosae
Rosellinia necatrix
Taphrina pruni

Prunus mahaleb L. — махалебка:

Phyllosticta passerinii

Prunus persica Sieb. et Zucc. Syn. Persica vulgaris L. — праскова:

Ascospora beijerinckii
Bacillus spongiosus
Bacterium gumis
Cercosporella persica
Cladosporium candilonema
Clasterosporium amigdalearum
„ carpophyllum
Cytospora rubescens
Exoascus deformans
Monilia cinerea
Oidium leucoconium
Phyllosticta persicae
„ pruniavium
„ vindabonensis
Puccinia pruni spinosae
Sclerotinia cinerea
Sphaerotheca pannosa
„ persicae
Stromatinia cinerea
Taphrina deformans
Смолоизтичане

Prunus sp. — слива:

Agaricus melleus
Armillaria mellea
Bacillus spongiosus
Bacterium tumefaciens
Capnodium salicinum
Cladosporium candilonema
Clasterisporium amigdalearum
„ carpophyllum
Cytospora rubescens
Dematophora necatrix
Dendrophagus globosus
Dermathella prunastri
Evernia prunastri
Exoascus insititiae
„ pruni
Fomes igniarius
Gloeosporium fructigenum
Monilia cinerea
„ fructigena
Nectria cinnabarina
„ ditissima
Parmelia caperata
Phyllosticta pruni
„ prunicola
„ pruni domestica
„ pyrina
Podosphaera tridactyla
Polyporus fucatus
„ igniarius
Polystigma rubrum
Puccinia pruni
„ „ spinosae
Rosellinia necatrix
Sclerotinia cinerea

Sclerotinia fructigena
Stromatinia cinerea
Taphrina insititiae
„ pruni
Valsa prunastri
Една ненаблюдавана болесть по сливитѣ
Разни мъхове

Prunus spinosa L. — трънка:

Puccinia pruni spinosae
Taphrina rostrupiana
Uncinula prunastri

Pseudotsuga douglasii (Lindl.) Syn. Pseudotsuga taxifolia (Lamb.) Carr.—дугласка:

Fusorium blasticola
Fusoma parasiticum
„ pini

Pyrus communis L. — круша:

Ascochyta pyrina
Bacterium tumefaciens
Capnodium salicinum
Cephalothecium roseum
Coniothirium tirolense
Entomosporium maculatum
„ mespili
Exoascus bullata
Fomes igniarius
Fusicladium pyrinum
Gloeosporium fructigenum
Gymnosporangium oxicedri
Gymnosporangium sabinae
Monilia fructigena
Morthiera sp.
Mucor sp.
Mycosphaerella sentina
Nectria cinnabarina
„ ditissima
Oidium farinosum
Phyllosticta pyrina
Podosphaera leucotricha
Polyporus igniarius
„ sulphureus
Roestellia cancellata
Sclerotinia fructigena
Septoria nigerrina
„ pyricola
Sphaerella sentina
Stigmatea mespili
Stromatinia fructigena
Taphrina bullata
Trichothecium roseum
Venturia pyrina
Viscum album
Ракъ

Pyrus malus L. — ябълка:

Agaricus melleus
Armillaria mellea
Bacterium tumefaciens
Capnodium salicinum
Cuscuta monogyna
Fomes fulvus
„ igniarius
Fusicladium dendriticum
Gloeosporium fructigenum
Gymnosporangium clavariaeforme
„ tremelloides
Monilia fructigena
Mycosphaerella sentina
Nectria cinnabarina
„ ditissima
Oidium crataegi
„ farinosum
Penicillium glaucum
Phoma pomorum
Phyllosticta briardi
„ mali
Podosphaera leucotricha
„ mali
„ oxyacanthae
Polyporus fulvus
„ igniarius
„ sulphureus
Puccinia tremelloides
Roestellia penicillata
Sclerotinia fructigena
Septoria nigerrina
„ pyricola
Sphaerotheca mali
Stromatinia fructigena
Venturia inaequalis
Viscum album
Остъкляване на ябълкитѣ
Ракъ

Pteris aquilina Gled. — орлова папрать:

Ascochyta pteridis

Puccinia thesii Devs. (Schröt.):

Darluca filum

Pulmonaria officinalis L. — меча пита, медуница:

Ramularia cylindroides
Sclerotinia sclerotiorum

Quercus cerris L. — церъ:

Agaricus melleus
Armillaria mellea
Daedalea quercina
Microsphaera alni var. quercina
„ alphitoides
Oidium quercinum
Polyporus fomentarius

Quercus pedinculata Ehrh. Syn. Quercus robur L. — лѣтенъ джбъ:

Daedalea quercina
Fomes igniarius
Microsphaera alni var. quercina
„ alphitoides
Oidium quercinum
Polyporus fomentarius
„ igniarius

Quercus pubescens Willd.:

Microsphaera alni var. quercina
„ alphitoides
Oidium quercinum

Quercus sessiliflora Salisb. — зименъ джбъ, горунъ:

Agaricus fascicularis
Daedalea quercina
Microsphaera alni var. quercina
„ alphitoides
Nectria ditissima
Oidium quercinum
Phyllosticta osteospora forma quercus
„ quercus
Polyporus dryadeus
Poria ferruginosa
Stereum hirsutum
Tricholoma murinaceum

Quercus sp. — джбъ:

Agaricus melleus
Armillaria mellea
Bulgaria inquinans
„ polymorpha
Clithris quercinum
Daedalea quercina
Favolus europaeus
Hydnum coralloides
„ diversidens
Lentinus ursinus
Loranthus europaeus
Merulis lacrimans
Microsphaera alni var. quercina
„ alphitoides
Oidium dubium
„ quercinum
Pleurotus dryinus
„ planus
„ spodoleucus
Polyporus candicinus
„ fomentarius
„ fumosus
„ imbricatus
„ lucidus
„ medula panis
„ squamosus
„ sulphureus
Polyporus velutinus
„ versicolor
Rosellinia quercina
Stereum hirsutum
Trametes hispida
Viscum album

Ranunculus acer L. — лютиче:
Uromyces dactylidis

Ranunculus arvensis L. — лютиче:
Uromyces dactylidis

Ranunculus cassubicus L. — лютиче:
Farbaea ranunculi

Ranunculus crenatus W. K. — лютиче:
Entyloma ranunculi

Ranunculus lanuginosus L. — лютиче:
Erysiphe polygoni

Ranunculus repens L. — лютиче:
Aecidium ranunculoides
Didymaria didyma
Farbaea ranunculi

Ranunculus sp. — лютиче:
Erysiphe polygoni

Rapa sp. — рѣпа:
Peronospora parasitica

Raphanus raphanistrum L. — дива рѣпа:
Albugo candida
Cystopus candidus

Rhamnus campestris — видъ зърнастецъ, крастатъ трънъ:
Aecidium rhamnii

Rhamnus cathartica L. — зърнастецъ:
Aecidium rhamnii
Puccinia coronifera

Rhinanthus angustifolius Gmel. — клопачка:
Plasmopara densa

Rhus cotynus L. Syn. Cotynus coggygria Scop. — смрадлика:
Septoria cotyni

Ribes grossularia L. — цариградско грозде, татарско грозде:
Ascochyta monochorum
Microsphaera grossulariae
Sphaerotheca mors-uvae

Ribes nigrum L. — черно грозде:
Capnodium salicinum

Ribes petraeum Wulf. — червенъ мерджанъ, дивъ мерджанъ:
Puccinia ribis

Ribes rubrum L. — френско грозде, червено грозде:
Capnodium salicinum
Cercospora ribicola
Microdiplodia naidenowi
Polyporus ribis
Sphaerotheca mors-uvae
Xantochrons ribis

Robinia pseudoacacia L. — акация, салкъмъ:
Marasmius insititius
Polyporus hirsutus
„ sulphureus
Stereum purpureum
„ spadiceum

Roripa austriaca:
Albugo candida
Cystopus candidus

Rosa alpina L. (правото е Rosa pendulina L. var. alpina L.) — шипка:
Phragmidium rosa alpinae

Rosa canina L. — шипка:
Oidium leucoconium
Phragmidium subcorticium
„ tuberculatum
Sphaerotheca pannosa
Sphaerulina intermixta

Rosa centifolia L. Syn. Rosa gallica ssp. centifolia Crep. — шипка:
Actinonema rosae
Marssonia rosae
Oidium leucoconium
Phragmidium subcorticium
Sphaerotheca pannosa

Rosa coriifolia Fries — шипка:
Phragmidium subcorticium

Rosa damascena Mill. — трандафилъ, роза, отъ която се добива масло:
Phragmidium subcorticium

Rosa dumetorum Thuill. — шипка:
Oidium leucoconium
Phragmidium subcorticium
Sphaerotheca pannosa

Rosa gallica L. — шипка:
Oidium leucoconium
Sphaerotheca pannosa

Rosa graveolens Gr. — шипка:
Phragmidium subcorticium

Rosa japonica — японска роза:
Oidium leucoconium
Sphaerotheca pannosa

Rosa pimpinellifolia — шипка:
Phragmidium rosae pimpinellifoliae

Rosa sepium Thuill. — шипка:
Oidium leucoconium
Phragmidium tuberculinum
Sphaerotheca pannosa

Rosa sp. — роза, шипка, трандафилъ:
Actinonema rosae
Erysiphe polygoni
Marssonia rosae
Oidium erysiphoides
„ leucoconium
Pestalozzia guepini
Phragmidium rosarum
„ subcorticium
Polyporus ribis
Prosthemium guepinianum
Sphaerotheca pannosa
Xantochrons ribis

Rosa spinosissima L. — шипка:
Phragmidium tuberculinum

Rubus caesius L. — капина:
Phragmidium albidum
„ rubi
Septoria rubi

Rubus corylifolius:
Phragmidium rubi

Rubus fruticosus L. Syn. Rubus plicatus Wh. et N. — капина:
Phragmidium rubi
„ violaceum

Rubus glandulosus Bell. Syn. Rubus hirtus W. K. — капина:
Mycrothyrium microscopicum
Phragmidium albidum
„ rubi

Rubus idaeus L. — малина:
Phragmidium rubi-idaei
Phyllosticta ruborum

Rubus nemorosus Hayne — капина:
Phragmidium rubi
„ violaceum

Rubus sp. — капина:
Phragmidium intermedium
„ rubi
„ rubi-idaei
„ violaceum

Rubus thyrsoideus Wimm. — капина:
Phragmidium violaceum

Rumex acetosella L. — киселецъ:
Erysiphe polygoni
Puccinia acetosae
„ rumicis

Rumex alpinus L. — щавилъ, щавунякъ:
Uromyces alpinus
Venturia rumicis

Rumex crispus L. — лападъ:
Erysiphe bolygoni
Ovularia obliqua

Rumex obtusifolius L. — лападецъ, лопушъ:
Erysiphe polygoni
Uromyces rumicis
Venturia rumicis

Rumex patientia L. — лападъ:
Ascochyta kaltscheffii

Rumex sanguineus L. — лападъ:
Erysiphe polygoni

Rumex sp. — видъ лападъ, киселецъ:
Aecidium rubellum
Ascochyta rumicis

Ruscus aculeatus L. — дивъ чемширъ:
Leptosphaeria rusci
Sphaeropsis rusci

Russula nigricans Bull.:
Nyctalis asterophora
„ licoperdiodes

Ruta graveolens L. — седефче:
Cladosporium herbarum
Hormodendron cladosporioiees
Mycosphaerella tulasni

Salix alba L. — бѣла върба:
Capnodium salicinum
Fomes igniarius
Gloeosporium salicis
Melampsora alii-salicis abbae
Polyporus igniarius
Rhytisma salicinum
Uncinula salicis

Salix amygdalina L. Syn. Salix triandra L. — върба:
Melampsora vitellinae

Salix caprea L. — ива:
Melampsora larici caprearum
Rhytisma salicinum

Salix fragilis L. — върба, крѣхка върба:
Caeoma confluens
Corticium confluens
Lycogala epidendron
Melampsora allii-fragilis
„ vitellinae

Salix purpurea L. — ракита:
Uncinula salicis

Salix sp. — върба:
Capnodium salicinum
Hydnum imbricatum
Lentinus lepideus
„ squamosus
Polyporus applanatus
„ candicinus
„ sulphureus

Salix viminalis L. — кошничарска върба:
Septoria salicicola

Salvia glutinosa L. — емухтлиха, бабухъ:
Erysiphe cichoriacearum
„ galeopsidis
Puccinia salviae

Salvia officinalis L. — градински чай:
Erysiphe galeopsidis

Salvia verticillata L.:
Erysiphe galeopsidis
Puccinia nigrescens

Sambucus ebulus L. — бъзъ, бъзе, базакъ:
Ascochyta ferdinandi
Cuscuta europaea
„ major
Septoria ebuli

Sambucus nigra L. — свирчовина:
Ramularia sambucina

Sambucus racemosa L. — червенъ бъзъ:
Ramularia sambucina

Sambucus sp. — видъ бъзъ:
Cuscuta racemosa
„ suaviolens

Sanguisorba minor Scop. Syn. Poterium sanguisorba Koch. — разваленка:
Phragmidium sanguisorbae
Sphaerotheca humuli

Saponaria officinalis L, — сапунче:
Septoria saponariae
Ustilago violacea

Satureja kitaibelii Wrzb. — овча чубрица:
Puccinia menthae

Saxifraga rotundifolia L. — обичникъ, потайниче:
Sphaerotheca fuliginea

Scabiosa sp. — заешки уши:
Septoria scabiosicola

Scirpus lacuster L. — мекишаръ, папуръ, дзука:
Phacidium plinthis

Scirpus maritimus L. — мекишаръ, папуръ, дзука:
Uromyces scirpi

Scorzonera laciniata L. — кокешъ, козя лепка:
Aecidium scorzonerae

Scrophularia canina L. — разгонъ, живениче:
Sphaerotheca humuli

Scrophularia nodosa L. — разгонъ, живениче:
Peronospora sordida
Uromyces scrophulariae

Scrophularia sp. — видъ разгонъ, живениче:
Ascochyta scrophulariae
Ramularia „

Secale cereale L. — ржжь:
Claviceps purpurea
Dilophia graminis
Dilophospora graminis
Leptosphaeria herpotrichoides
Marssonia graminicola
„ secalis
Mastigosporium album
Ophiobolus herpotrichus
Puccinia dispersa
„ glumarum
„ graminis
„ rubigo vera var. glumarum
„ secalina
Rhynchosporium graminicola
Scolecotrichum graminis
Tilletia secalis
Urocistis occulta

Senecio nebrodensis L. Syn. Senecio rupestris L.—спорежъ:
Coleosporium senecionis
Peridermium oblongisporium
Puccinia uralensis
Ramularia senecionis

Senecio nemorensis L. — спорежъ:
Coleosporium senecionis
Erysiphe cichoriacearum
Peridermium oblongisporium
Septoria senecionis
Sphaerotheca fuliginea

Senecio penssilvanicus — спорежъ:
Cylindrosporium eleonorae

Senecio transsilvanicus Schur. — спорежъ:
Cylindrosporium eleonorae

Senecio vulgaris L. — спорежъ
Coleosporium senecionis
Peridermium oblongisporium

Sesamum sp. — сусамъ:
Bacillus sesami
Pseudomonas sesami
Sclerotinia trifoliorum
Бактерийна болесть

Setaria italica B. B. — лудо просо:
Ustilago cramerii

Setaria sp. — видъ лудо просо:
Ustilago cramerii

Silene acaulis L. — плюскавиче:
Ustilago violacea

Silene inflata Sm. — плюскавиче
Puccinia silenes
Uromyces behenis
Ustilago violacea

Sinapis alba L. — бѣлъ синапъ:
Albugo candida
Cystopus candidus

Sinapis arvensis L. — синапъ:
Albugo candida
Cystopus candidus

Sisymbrium officinale (L.) Scop.:
Erysiphe polygoni

Sisymbrium sofia L.:
Erysiphe polygoni

Smyrnium perfoliatum L.:
Puccinia smyrnii

Solanum lycopersicum L. — домати:
Alternaria solani
Bacillus solanacearum
Fusarium erubescens
Gloeosporium phomoides

Macrosporium parasiticum
„ solani
Orobanche ramosa
Septoria lycopersici
Sporidesmium solani varians
Бактериално гниене на доматевитѣ плодове
Бактериоза

Solanum melongena L. — синъ патладжанъ:
Sporidesmium melongenae

Solanum tuberosum L. — картофъ:
Alternaria solani
Bacillus solaniperda
Clasterosporium putrefaciens
Erysibe subterranea
Fusarium pestis
„ solani
Macrosporium solani
Phytophthora infestans
Spongospora subterranea
Sporidesmium solani
„ „ varians
Blattrollkrankheit
Мозаична болесть
Мокра гнилоба
Слънчевъ изгоръ

Soldanella pusila Bmg.:
Puccinia soldanellae

Solidago virga aurea L.:
Puccinia virg-aurea

Sonchus arvensis L. — млѣчка:
Erysiphe cichoriacearum

Sonchus oleraceus L.:
Coleosporium sonchi
Erysiphe cichoriacearum
Puccinia sonchi

Sonchus uliginosus M. B.:
Erysiphe cichoriacearum
Puccinia sonchi

Sorbus aria Ehrh. Syn. Pyrus aria Ehrh. — мукина:
Gymnosporangium tremelloides

Sorbus aucuparia (L.) Gärtn. Syn. Pyrus aucuparia (L.) Gärtn. — офика:
Gymnosporangium aucupariae juniperinum
Gymnosporangium conicum
„ juniperinum
Roestelia cornuta

Sorbus domestica L. Syn. Pyrus domestica L. — скоруша:
Gymnosporangium aucupariae juniperinum
Gymnosporangium conicum
Mycosphaerella topographica
Roestelia cornuta

Sorbus torminalis (L.) Fhrh. — брекина:
Sphaerella topographica

Sorghum halepense Pers. Syn. Andropogon halepensis Brot. — балуръ:
Phyllachora graminis
Puccinia purpurea
Ustilago andropogonis
„ reiliana

Sorghum saccharatum L. — захарна метла:
Ustilago cruenta
„ reiliana

Sorghum scoparium:
Ustilago sorghi

Sorghum sp. — метла:
Cintractia sorghi
Sphacelotheca sorghi
Ustilago reiliana
„ sorghi

Sorghum vulgare L. — метла:
Fusarium graminearum
Gibberella saubinetii
Ustilago bulgarica

Sorghum vulgare scoparium:
Ustilago bulgarica

Spinacia sp. — спанакъ:
Heterosporium variabile

Spiraea filipendula L. Syn. Filipendula hexapetala Gilib. — орешецъ:
Triphragmium filipendula

Spiraea ulmaria L.:
Triphragmium filipendula
„ ulmaria

Stachys alpina L. — ранилистъ:
Erysiphe galeopsidis

Stachys germanica L. — ранилистъ:
Erysiphe galeopsidis

Stachys palustris L. — ранилистъ:
Erysiphe galeopsidis

Stachys silvatica L. — ранилистъ:
Erysiphe galeopsidis

Stachys sp. — ранилистъ:
Septoria stachydis

Stellaria media L. — звездица:
Puccinia arenariae

Stellaria nemorum L. — звездица:
Puccinia arenariae

Stipa gallica Čel. — коило:
Lophodermium arundinaceum

Succisia pratensis Mch.:
Septoria scabiosicola

Symphytum officinale L. — зарасличе, черъ оманъ:
Erysiphe cichoriacearum

Syringa vulgaris L. — люляка:
Phyllosticta syringae

Tancetum balsamita L. — калофжрчи, калжнфиръ:
Puccinia balsamitae

Tanacetum vulgare L. — вратига:
Erysiphe cichoriacearum
Puccinia tanaceti
Septoria tanaceti

Taraxacum laniginosum — глухарче:
Puccinia taraxaci

Taraxacum officinale Web. — глухарче:
Puccinia taraxaci
Sphaerotheca fuliginea
„ humuli

Taraxacum serotinum (W. K.) Poir.—глухарче:
Puccinia taraxaci

Taraxacum siriceum — глухарче:
Puccinia taraxaci

Taraxacum sp. — глухарче:
Puccinia taraxaci

Telekia speciosa Bmg. — репей:
Coleosporium telekiae
Erysiphe cichoriacearum

Teucrium chamaebrys L. — подабиче, поджбиче:
Puccinia annularis

Thesium divaricatum Jan.:
Puccinia thesi

Thesium montanum Ehrh.:
Puccinia passerini

Thesium ramosum Hayne:
Puccinia thesi

Thymus ovatus Mill. — мащерка:
Puccinia stipae

Tilia grandifolia Neilr. Syn. Tilia platyphyllos Scop. — липа:
Cercospora microsora

Tilia parvifolia Ehrh. Syn. Tilia cordata Mill., Tilia ulmifolia Scop. — липа:
Cercospora microsora

Tilia sp. — липа:
Cercospora microsora
Nectria cinnabarina

Tragopogon pratense L. — козя брада:
Cystopus tragopogonis
Puccinia tragopogoni

Trifolium alpestris L. — детелина:
Phyllachora trifolii
Plowrigthia „
Polythrincium „

Trifolium arvense L. — детелина:
Uromyces striatus

Trifolium aureum Poll. Syn. Trifolium agrarium L. — детелина:
Uromyces striatus

Trifolium elegans Savi — детелина:
Phyllachora trifolii
Plowrigthia „
Polythrincium „

Trifolium fragifetum L. — детелина:
Uromyces trifolii

Trifolium incarnatum L. — инкарнатка:
Phyllachora trifolii
Plowrigthia „
Polythrincium „

Trifolium medium L. — детелина:
Erysiphe polygoni
Uromyces trifolii

Trifolium medium var. balcanicum Vel. — детелина:
Erysiphe polygoni
Peronospora pratensis

Trifolium menneghinianum Clem. — детелина:
Phyllachora trifolii
Plowrigthia „
Polythrincium „

rifolium montanum L. — детелина:
Phyllachora trifolii
Plowrigthia „
Polythrincium „

rifolium pannonicum Jacq. — детелина:
Erysiphe polygoni

rifolium pratense L. — детелина:
Erysiphe polygoni
Peronospora trifoliorum
Uromyces trifolii

rifolium procumbens L. Syn. Trifolium minus Relh., Trifolium procumbens L. var. minus Koch. — детелина:
Erysiphe polygoni
Uromyces striatus

rifolium repens L. — разковниче, късметче, детелина:
Ascochyta volkartii
Phyllachora trifolii
Plowrigthia „
Polythrincium „
Uromyces trifolii repentis
Tilletia glomerulata

rifolium sp. — детелина:
Cuscuta trifolii
Erysiphe martii
Orobanche minor
Peronospora trifoliorum
Phyllachora trifolii
Phyllosticta „
Plowrigthia „
Polythrincium „
Pseubopeziza trifoli
Sporonema phascidioides
Staganospora trifolii
Uromyces minor
„ striatus
„ trifolii

ifolium subterraneum L. — детелина:
Uromyces minor

iticum compactum:
Cladosporium herbarum
Hormodendron cladosporioides
Mycosphaerella tulasnei

iticum durum Desf. — загария:
Cladosporium herbarum
Hormodendron cladosporioides
Mycosphaerella tulasnei
Puccinia graminis
„ triticina
Tilletia foetens
„ laevis
Ustilago carbo
„ tritici

Triticum junceum:
Puccinia agropyri

Triticum monococum — еднозърнестъ лимецъ:
Cladosporium herbarum
Hormodendron cladosporioides
Mycosphaerella tulasnei

Triticum polonicum — полска пшеница:
Cladosporium herbarum
Hormodendron cladosporioides
Mycosphaerella tulasnei

Triticum repens L. — пирей:
Puccinia agropyri

Triticum sp. — пшеница:
Alternaria brassicae
Cladosporium herbarum
Claviceps purpurea
Dilophia graminis
Dilophospora graminis
Erysiphe graminis
Fusarium roseum
Hormodendron cladosporioides
Leptosphaeria herpotrichoides
Marssonia graminicola
Mycospharella tulasnei
Oidium moniloides
Ophyobolus herpotrichus
Puccinia dispersa
„ glumarum
„ graminis
„ rubigo vera
„ „ „ var. dispersa
„ „ „ „ glumarum
„ triticina
Rhynchoporium graminicola
Septoria graminum
„ tritici
Tilletiia caris
„ foetens
„ laevis
„ trítici
Ustilago carbo
„ tritici
Чернилка

Triticum vulgare Vill. — обикновена пшеница:
Cladosporium herbarum
Erysiphe graminis
Hormodendron cladosporioides
Mycosphaerella tulasnei
Oidium moniloides
Puccinia glumarum
„ graminis
„ rubigo vera var. dispersa
„ „ „ „ glumarum
„ triticina
Septoria graminum

Tilletia caries
„ foetens
„ laevis
„ tritici
Ustilago corbo
„ tritici

Triticum vulgare var. lutescens Al. — улка пшеница, ное:
Ustilago carbo
„ trítici

Triticum turgidum L. — мешеста пшеница, английска пшеница:
Puccinia graminis
„ rubigo vera var. dispersa
„ triticina
Tilletia foetens
„ laevis

Trollius europaeus L. — планински божуръ:
Erysiphe polygoni

Tussilago farfara L. — подбелъ:
Aecidium tussilaginis
Coleosporium tussilaginis
Puccinia poarum

Typha latifolia L. — папуръ, рогозъ:
Puccinia typhae

Ulmus campestris L. Syn. Ulmus glabra Mill. — полски брѣстъ:
Dothidella ulmi
Fusarium album
Phleospora ulmicola
Phyllachora ulmi

Ulmus campestris L. var. suberosa Wahl. — брѣстъ:
Uncinula bivanae
„ cladestina

Ulmus effusa Willd. — бѣлъ брѣстъ:
Polyporis fomentarius

Ulmus montana Mith. Syn. Ulmus scabra Mill. — брѣстъ:
Phyllosticta ulmi

Uromyces onobrichidis (Desm.) Lév.:
Darluca filum

Uromyces straitus Schroet.:
Darluca filum

Urtica dioica L. — обикновена коприва:
Aecidium urticae
Cuscuta europaea
„ major
Puccinia caricis
Septoria urticae

Urtica dioica L. var. pubescens Trautv. — коприва:
Aecidium urticae

Urtica sp. — коприва:
Cuscuta corymbosa
„ racemosa
„ suaveolens

Urtica urens L. — гръцка коприва:
Septoria urticae

Vaccinium myrtillus L. — боровинка:
Podosphaera myrtillina
Thecospora vacciniorum

Vaccinium sp. — боровинки:
Thecospora vacciniorum

Vaccinium vitis idaea L. — брусница:
Aecidium columnare
Calyptospora goeppertiana
Exobasidium vaccinii
Pucciniastrum goeppertianum
Thecospora vacciniorum

Valareana montana L. — дѣлянка:
Uromyces valerianae

Valeriana officinalis L. — дѣлянка:
Erysiphe cichoriacearum
Uromyces valerianae

Valeriana tripteris L. — дѣлянка:
Uromyces valerianae

Veratrum album L. — чемерика:
Phyllosticta melanoplaca
Uromyces veratrii

Veratrum nigrum L. — чемерика:
Phyllosticta melanoplaca

Verbascum glabratum Friv. — лопенъ, овча опашка:
Ramularia variabilis

Verbascum longifolium Ten. Syn. Verbascum pannosum Vis. et Panč. — лопенъ:
Erysiphe taurica

Verbascum nigrum L. — лопенъ, черенъ лопенъ:
Uromyces scrophulariae

Verbascnm pannosum. Vis. et Panč.:
Erysiphe taurica

Verbtscum phlomoides L. Syn. Verbascum australe Schrad. — лопенъ:
Uromyces scrophulariae

Verbascum sp. — лопенъ, овча опашка:
Erysiphe cichoriacearum

Verbascum thapsiforme Schrad. — лопенъ, овча опашка:
Uromyces poiraulti

Verbascum thapsus — лопенъ, овча опашка:
Erysiphe polygoni

Verbena officinalis L. — върбика, върбина:
Septoria verbenae

Veronica beccabunga L. — великденче:
Peronospora grisea

Veronica chamaedrys L. — великденче:
Sphaerotheca humuli

Veronica urticaefolia Jacg. — великденче:
Gloeosporium pruniosum forma tirolensis
Puccinia veronicae
„ veronicaum

Viburnum lantana L. — калина:
Nectria cinnabarina

Viburnum opulus L. — калина:
Phyllosticta vulgaris

Vicia cassubica L. — глушина:
Trichocladia bäumleri

Vicia cracca L. — глушина:
Erysiphe polygoni

Vicia faba L. — бакла, конски бобъ:
Peronospora viciae
Phyllosticta fabae
Uromyces fabae
„ viciae fabae

Vicia hirsuta L. — глушина:
Uromyces ervi

Vicia major L. — глушина:
Puccinia vincae

Vicia narbonensis L. — глушина:
Peronospora viciae

Vicia sativa L. — пролѣтенъ фий:
Ascochyia viciae
Peronospora viciae
Uromyces fabae

Vicia sepium L. — видъ фий:
Uromyces fabae

Vicia sp. — фий:
Ascochyta viciae
Cuscuta epithymum
„ minor
Erysiphe communis
Uromyces fabae
„ narbonensis
„ pisi

Vicia tenitolia Roth. — глушина:
Ascochyta ervicola
„ viciae

Vicia villosa Roth. — зименъ фий:
Ascohyta viciae

Viola alba Bess. Syn. Viola scotophila Jord.— теменуга:
Puccinia violae

Viola odorata L. — теменуга:
Puccinia violae

Viola silvatica Fries. Syn. Viola silvestris Rchb. — теменуга:
Puccinia violae

Viola sp. — теменуга:
Puccinia violae

Viola tricolor L. — теменуга:
Gloesporium viola

Viola vandasii Vel. — теменуга:
Puccinia violae

Vitis sp. — лоза:
Agaricus melleus
Alternaria vitis
Armillaria mella
Bacillus sp.
„ vitivorus
Botritis cinerea
Cerecospora vitis
Charrinia diplodiella
Cladosporium viticolum
Coniothyrium diplodiella
Cuscuta monogyna
Dematophora necatrix
Fusicocum bulgaricum
Gloeosporium ampelophagum
Guignardia bidwellii
Henderssonia sarmentorum
Laestadia bidwellii
Macrosporium commune
Mucor racemosus

Oidium sp.
Oidium tuckeri
Peronospora viticola
Phoma ampelocarpa
Phyllosticta vitis
Plasmodiophora vitis
Plasmopara viticola
Pleospora herbarum
Rosellinia necatrix
Sclerotinia fuckeliana
Septoria ampelina
Sphaceloma ampelinum
Uncinula necator
„ spiralis
Antracnose
Гжбясване на лозата
Gomose bacillarie
Maladie de Californie
Malnero
Окапвани плода на американскитѣ лози
Потъмняване на листата на лозата
Туберкулоза (Bacillus tumefaciens?)
Хлороза
Ракъ

Vitis viniferà L. — винена лоза:
Alternaria vitis
Microdiplodia vitigena
Phyllosticta dzumjensis

Waldsteinia agrimonioides Wild.:
Marssonia potentillae forma waldsteinina

Xanthium spinosnm L. — казашки бодилъ:
Sphaerotheca fuliginea
„ humuli

Xanthium strumarium L. — казашки бодилъ:
Sphaerotheca humuli

Xeranthemum annuum L. — безсмъртниче:
Erysiphe cichoriacearum

Zea mays L. — царевица:
Coniosporium gečevi
Fusarium graminearum
„ lateritium
„ maydiperdum
Gibberella moricola
„ saubinetii
Kosarowia maydosperda
Puccinia maydis
Sordaria fimiseda
Trichothecium roseum
Ustilago maydis
„ reiliana
„ zeae
„ zeae mays
Главня

Литература

1. Ангеловъ Д. — Кускута, вилина коса (Cuscuta trifolii). Земледѣлие 15^{23-24} : 5—7, 1909.
2. Анонимно — Чернилката по крушитѣ. Орало 2^{4} : 61, 1895.
3. „ — Гжбитѣ по овощнитѣ дървета. Орало 2^{4} : 61, 1895.
4. „ — Болести и непрiятели по кръмното цвекло. Орало 3^{14} : 252, 1896.
5. „ — Конкурсъ на разни пръскачки. Садово 1 : 157—161, 1898.
6. „ — По предпазване лозята отъ маната. Орало 6^{14} : 222, 1899.
7. „ — Състоянието на лозарството у насъ презъ 1898 г. Орало 6^{19} : 300—303; 6^{20} : 318—322; 6^{21} : 334—336, 1899.
8. „ — По предпазване лозята отъ пероноспората (маната). Орало 7^{7} : 108, 1900.
9. „ — Практически курсове за предпазване на житата отъ болестьта главня. Орало 8^{13-14} : 219, 1901.
10. „ — Пръскачкитѣ на лозята и синия камъкъ. Садово 4 : 47, 1901.
11. „ — Почиствайте овощнитѣ дървета отъ мъховетѣ, лишаитѣ и гжбитѣ. Садово 4 : 78, 1901.
12. „ — Филоксерата и пероноспората като срѣдство за повдигане на лозарството. Садово 5^{3} : 21—23, 1902.
13. „ — Лозарството, овощарството и пчеларството въ България. Орало 9^{22} : 338—342, 1903.
14. „ — Упжтвания за борба съ разнитѣ болести и повреди по земледѣлскитѣ растения. Садовската опитна станция 3—14, 2 фиг., 1904.
15. „ — Възобновлението на опустошенитѣ отъ филоксерата лозя въ варовититѣ почви. (Има нѣщо и за хлорозата). Садово 7^{2-3} : 37—42; 7^{4} : 108—113; 7^{5-6} : 141—151; 7^{7} : 194—200. 1904.
16. „ — Годишенъ рапортъ на учитель-лозаря при Плѣвенското лозарско-винарско-овощарско училище за 1904 год. Садово 9^{6} : 191, 241, 1906.
17. „ — Бабичасване на сливитѣ. Градинарь 2^{11-12} : 164—166, 1906.
18. „ — Сгърчване на листата у прасковата (Exoascus deformans). Градинарь 2^{9} : 131—133, 1906.
19. „ — Открититѣ до 1907 год. отъ Малковъ болести по растенията у насъ. Садово 10^{4} : 122, 1907.
20. „ — Задължителна борба противъ кукувичата прежда (кускутата). Садово 10^{10} : 294, 1907.
21. „ — Изучвания по болеститѣ и непрiятелитѣ на културнитѣ растения. Садово 10 : 306, 1907.
22. „ — Нова болесть по картофитѣ въ Германия. Садово 13 : 304—308, 1910.
23. „ — Американска брашнеста мана. Опитната станция София. Хвърчащъ листъ 2 : 1—7, 6 фиг., 1912.
24. „ — Болестьта кривули (мехури, рошкови, бабички) по сливитѣ и борбата съ тѣхъ. Опитната станция София. Хвърчащъ листъ 8 : 1—10, 2 фиг., 1912.
25. „ — Борба противъ брашнестата мана по детелината. Земледѣлие $^{7-8}$: 120, 1912.
26. „ — Кускута (кукавича прежда, вилена коса). Земледѣлие 21^{11-12} 184, 1917.
27. „ — Международниятъ институтъ по земледѣлието въ Римъ и неговата дейность. Сведения по земледѣлието 1^{1-10} : 35—36, 45—47, 51—55, 1920.
28. „ — Закони по болеститѣ по растенията. Сведения по земледѣлието 2^{1} : 40—43, 1921.

29. Анонимно — Сегашното състояние на нашитѣ маслодайни рози. Ръжди по розовитѣ дръвчета. Сведения по земледѣлието 2^{3} : 5—8, 1921.
30. „ — Болести и неприятели. Сведения по земледѣлието 2^{7-8} : 5, 1921.
31. „ — Най-честитѣ болести и неприятели по тютюна и борбата срещу тѣхъ. Сведения по земледѣлието 2^{10-11} : 14—15, 1921.
32. „ — Теорията на микроплазмата, нейното научно и практическо значение. Спис. Земл. изпит. институти 2^{5-6} 426—428, 1921.
32а. „ — Болести и неприятели. Сведения по земледѣлието 3^{7} : 5, 1922.
33. „ — Закони за болеститѣ на растенията и за вреднитѣ за земледѣлието растения и животни. Сведения по земледѣлието 4^{1} : 27—31, 1923.
34. „ — Отчетъ на Опитното поле по тютюневата култура въ гр. Горна-Джумая за 1923 год. 3—20, 1923.
35. „ — Растителна защита. Централенъ земледѣлски изпитателенъ институтъ. Бюлетинъ 1 : 1—44, 5 фиг., 1923.
36. „ — Болеститѣ по сливовитѣ дървета въ Кюстендилско. Сведения по земледѣлието 5^{10} : 3, 1924.
37. Appel Dr. P. и Gasner Dr. G. — Съвременното състояние на знанията по разнитѣ видове праховита главня по житата и единъ новъ апаратъ за лесното извършване на топенето семето въ гореща вода. Садово 10^{4} : 104—110; 10^{5-6} : 147—153, 1907.
38. Аппелъ д-ръ А. — Упѫтвания за борба противъ главнята (чернилката) по житата. Българско земледѣлско д-во, брошура № 1 : 2—9, 6 фиг., 1909.
39. Appel Dr. — Упѫтвания за борба противъ главнята (чернилката) по житата. Земледѣлие 15^{12-12} : 2—10, 6 фиг., 1909.
40. Араджиевъ Ив. Г. — Оидиумътъ и борбата съ него. Земледѣлско стопански прегледъ 2^{4} : 52—55, 1926.
41. Атанасовъ А. — Rosellinia quercina R. Hart. въ пипинеритѣ на комитета Св. Иоанъ Милостивий въ Ст. Загора. Лѣсовъдска сбирка 2^{8} : 124—126, 1909.
42. „ — Нови изследвания върху житнитѣ ръжди. Земледѣлие 30^{5} : 65—67, 1926.
43. „ — Планинитѣ въ земледѣлието (въ връзка за борба срещу болеститѣ на растенията). Земледѣлие 32^{9} : 259, 1928.
44. Атанасовъ Д. — Мрежестата некроза и черната шарка по картофа. Годишникъ на Софийския университетъ, Агрономически факултетъ 4 : 1—7, 1925—26.
45. „ — The stipple streak disease of potato. A complex problem. Известия на Българското ботаническо д-во, кн. 1 : 43—53, 1926.
46. „ — Болеститѣ по растенията и земледѣлското производство. Земледѣлие 31^{1} : 6—9, 1927.
47. „ — Гниене на люцерната. Земледѣлие 31^{4} : 53—55, 1927.
48. „ — Чернилката по тютюна. Земледѣлие 32^{1} : 5—7, 1928.
49. „ — Защита на растенията въ Унгария. Земледѣлие 32^{2} : 52—54, 1928.
50. „ — Пероноспората по лозата. Земледѣлие 32^{6} : 196, 1928.
51. „ — Защо трѣбва да се пръскатъ лозитѣ и овощнитѣ дървета. Земледѣлие 32^{9} : 255—257, 1928.
52. „ — Mosaic disease of flower bulb plants. Известия на Българското ботаническо дружество, кн. 2 : 51—61, 3 картини, 1928.
53. „ — Едно ежегодно заравяно богатство. Звено 1^{3} : 3—6, 1928.
54. „ — Конкурентноспособността на нашитѣ тютюни. Звено 1^{15} : 4—7, 1928.
54а. „ — — Планинитѣ въ земледѣлието. Земледѣлие 32^{12} : 342—343. 1928.
54б. „ — — Законъ за защита на растенията отъ болести и неприятели. Земледѣлие 33^{1} : 3—4, 1929.
55. Б. . . . . — Болести по тютюна. Орало 9^{13} : 298, 1903.
56. Бакаловъ А. — Лозари, пръскайте лозята си. Орало 6^{12} : 182—184, 1899.
57. Бернкопфъ К. — Упѫтвания за борба съ болеститѣ и неприятелитѣ на земледѣлскитѣ растения. Моравото рогче — една опасна болесть по ржжьта и унищожението ѝ. Държавна земледѣлска опитна станция Садово. Брошура № 7 : 1—14, 1908.
58. „ — Сухата пятнивость по листата на картофитѣ (Sporidesmium solani Varians n. sp.). Садово 12 : 128—131, 1909.

59. Бернкопфъ К. — Резултати отъ опититѣ съ разни сортове картофи презъ 1908 год. Садово 12 : 172—175, 1909.
60. „ — Болестьта „ръжда“ по розата (Phragmidium subcorticium Wint.). Садово 13 : 245—249, 1910.
61. Ботевъ С. — Ржждитѣ по житнитѣ растения и борбата съ тѣхъ. Държавна подвижда земледѣлска катедра гр. Търново. Хвърчащъ листъ № 20, 1914.
62. „ — Ръждитѣ по житнитѣ растения и борбата съ тѣхъ. Земледѣлие 19^{10} : 157; 19^{12} : 187—189, 1914.
63. „ — По инкрустирането на есеннитѣ посеви. Земледѣлие 25^{9} : 137—139, 1921.
64. „ — Сортовъ опитъ съ захарно цвекло. Земледѣлие 30^{1} : 50—53, 1926.
65. Bubak Dr. F. — Ein Beitrag zur Pilzflora von Bosnien und Bulgarien. Sitzungsbericht d. König. böhm. Ges. d. Wiss. Prag, 1900.
66. „ — Zweiter Beitrag zur Pilzflora von Bosnien und Bulgarien. Oesterreichischen Zeitschrift 53 : 49—52, 1903.
67. „ — Neue oder kritichen pilze. Annales Mycologici 2^{5} : 395—401, 1904.
67 a. „ — Neue oder kritische Pilze. Annales Mycologici 4 : 105, 1906.
68. „ — Über Puccinia carlinae E. Jasky in bisherigen Begrenzung. Berichte d. deutschen botan. Geselschaft Vol. 25 : 56, 1907.
69. „ — Neue oder kritische Pilze. Annales Mycologici 6 : 28—29, 6 fig., 1908.
69 a. „ — Einige neue bulgarische Pilze. Ber. 1. IV. Versammlung der böhmische Naturf. u .Ärtzte, Prag. 1908 : 302—303, 1908 (Böhmisch).
70. „ — Über die richtige Benennung von Tilletia belgradensis Magnus. Annales Mycologici 6 : 570, 1908.
71. „ — Bericht über die Tätigkeit der Station für Pflanzenkrankheiten in Tabor im Jhare 1908. Zeitschrift für das landwirt. Versuchswesen in Österreich 454, 1909.
72. „ — Eine neue Tilletie art. Zeitschrift für das landwirt. Versuchswesen in Österreich 12 : 545—549, 1909.
73. „ — Bericht über die Tätigkeit der Station für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz an die Königlich landwirtschaftlichen Akademie in Tabor (Böhmen) in Jhare 1909. Zeitschrift für das landwirt. Versuchswesen in Österreich 502—505, 1910.
74. „ — Инкрустиране семената на житнитѣ растения противъ главнята. Садово 12 : 405—412, 1909.
75. „ — Една нова болесть по люцерната. Садово 13^{1} : 20—22, 1910.
76. „ — Eine neue Krankheit der Maulbeerbäume. Berichte der Deutschen Bot. Geselschaft 28 : 533—537, 1 Tafel, 1910.
77. „ — Eine neue Ustilaginee der Mohrenhirse. Zeitschr. landw. Versuchsw. Österreich 53—56, 2 Abb., 1910.
78. „ — Eine neue Krankheit der Maulbeerbäume. 2 Mitteilung. Ber. d. Deutsch. Bot. Geselschaft 29 : 70—74, 1 Abb. 1911.
79. „ und Kosaroff, Dr. P. — Einige interessante Pflanzenkranheiten aus Bulgarien. Centralbl. Bacter. etc. II Abt. 31 : 495—502, 2 tafeln, 3 abb., 1911.
80. Бързаковъ Б. — Polyporaceae въ България. Известия на Българското ботаническо д-во, кн. 1 : 21—36, 1926.
81. „ — Приносъ къмъ гжбната флора въ България. Годишникъ на Софийския Университетъ, Физикоматемат. факултетъ 22^{3} : 57—89, 1926.
82. „ — Приносъ къмъ изучване гжбната флора на западна Стара Планина. Годишникъ на Софийския Университетъ. Физикоматематически факултетъ 22^{3} : 113—148, 1926.
83. Бъчваровъ Н. — Новитѣ известия за житната ръжда. Орало 5^{7} : 105—107, 1898.
84. „ — Кускутата, нейното развитие, вреда и унищожаване. Орало 13^{8-9} : 130—133, 1907.
85. В . . . . . — Загниване плодоветѣ на ябълкитѣ, крушитѣ и дюлитѣ. Земледѣлие 16^{11} : 169—170, 1910.
86. „ — Непознатата болесть по тютюневия разсадъ въ Кюстендилско. Земледѣлие 22^{4-5} : 27, 1918.
87. В. В. . . . — Hysterium (Lophodermium) pinastri Schr. приема и у насъ епидемически размери. Лесовъдска сбирка 2^{9} : 153—155, 1900.

88. В. Н. . . . — Борба противъ ечмичната и пшеничната праховита главня. Земледѣлие 18^{7-8} : 119, 1912.
89. „ — Срѣдство противъ „бѣлото гниене“ на лозитѣ. Земледѣлие 20^{6} : 168, 1918.
90. „ — Върху разнитѣ видове на рода Claviceps. Списание на Земл. изпитателни институти 1^{4} : 317, 1920.
91. „ — Sula recettivita a del frumento per la carie in rapporto al tempo di semina. Списание на Земл. изпитателни институти 1^{4} : 317, 1920.
92. „ — Приносъ къмъ изучване изсъхването на клонкитѣ у овощнитѣ дървета вследствие гжбата Monilia. Списание на Земледѣлскитѣ изпитателни институти 1^{4} : 318, 1920.
93. „ — Единъ приносъ за презимуването на ръждитѣ съ лѣтнитѣ спори. Спис. на Земл. изпитателни институти 1^{4} : 316, 1920.
94. Вавиловъ Н. — Матеріалы къ вопросу объ устойчивости хлѣбныхъ злаковъ противъ паразитическихъ грибовъ. Списание на Земледѣлскитѣ изпитателни институти 3^{1} : 109—112. 1924.
95. Валачивъ Ив. — Да си предпазимъ лозята отъ маната. Орало 6^{9} : 137, 1899.
96. „ — Синиятъ камъкъ вреди ли на лозата. Орало 6^{14} : 221—223, 1899.
97. Вацовъ С. — Бюлетинъ за състоянието на земледѣлскитѣ култури. Земледѣлие 19^{5-6} : 68; 19^{10} : 157; 19^{11} : 172; 19^{12} : 193; 19^{13} : 207, 1914.
98. Вобевъ Н. — Употрѣблението на синия камъкъ въ земледѣлието. Садово 3 : 420—424, 1900.
99. Вичевъ Н. — Чернокафяво (саждиво) гниене на тютюна въ Унгария. Списание на Земледѣлскитѣ изпитателни институти 1^{2-3} : 316, 1921.
100. „ — Тютюнопроизводството въ Дупнишко. Списание на Земледѣлскитѣ изпитателни институти 3^{2-3} : 177—232, 18 фиг., 1924.
101. Габровски П. — Полягане и срѣдства противъ него. Садово 7^{2-3} : 59—61, 1904.
102. „ — Промиване на житото противъ главнята. Земледѣлие 14^{18} : 11—14, 1908.
103. „ — Моравото рогче въ храната на домашнитѣ животни. Земледѣлие 23^{11-12} : 188, 1919.
104. „ — Бактериозата. Земледѣлие 28^{1} : 4—7, 1924.
105. „ — Болести и неприятели по захарното цвекло презъ 1923 год. Земледѣлие 28^{2} : 25—27, 1924.
106. „ — Още за „бактериозата“. Земледѣлие 28^{7} : 103—105, 1924.
107. Георгиевъ В. — Защо намалява нашето производство на фасулъ. Земледѣлие 32^{9} : 253—255, 1928.
108. Георгиевъ К. — Какви загуби нанася ръждата на маслодайнитѣ ни рози. Земледѣлие 32^{8} : 225—228, 1928.
109. Георгиевъ Д-ръ Ст. — Приносъ за изучване на двураздѣлкитѣ, гжбитѣ, папратовитѣ и явнобрачнитѣ растения въ България. Годишникъ на Софийския Университетъ, Физико-математически факултетъ кн. II : 83 – 95 (1905/06).
110. Гечевъ А. — Болести и неприятели по земледѣлскитѣ култури въ стопанството на земледѣлското училище при Русе презъ 1905 год. Орало 12^{14-16} : 249, 1906.
111. Горановъ Ив. — Черниятъ вѣтъръ въ Българска Добруджа. Орало 13^{22-23} : 382—385, 1907.
112. Гочевъ А. — Предпазване на културнитѣ растения (уничтожение главнята). Орало 12^{21} : 366—369, 1906.
113. „ — Гниенето на надземнитѣ и подземни части на картофа. Орало 13^{16-17} : 278—284, 1907.
114. Грековъ С. — Подуване на сливитѣ (папухари). Земледѣлие 20^{6} : 164—166, 1915.
115. „ — Бордолезовиятъ разтворъ. Земледѣлие 20^{8} : 168, 1915.
116. „ — Болести по зеленчуцитѣ и срѣдства противъ тѣхъ. София 3—20, 1917.
117. „ — Перозидъ. Земледѣлие. 22^{4-5} : 16, 1918.
117 a. „ — Приносъ къмъ проучванията на овощарството въ България. Списание на Земл. изпит. институти 4^{1-2} : 103—160, 1926.
118. Григориевъ В. — Болести и вредители по зелето, наблюдавани въ околноститѣ на София презъ пролѣтьта на 1922 година и мѣрки за борба съ тѣхъ. Земледѣлие 26 : 136—139, 1922.

119. Григориевъ В. — Болеститѣ на културнитѣ растения въ градоветѣ: Т. Пазарджикъ, Пловдивъ, Стара Загора, В. Търново и околноститѣ имъ презъ 1923 г. Земледѣлие 27^{10} : 155—157, 1923.
120. „ — Опасната за овощнитѣ дървета гжбичка Carpodium salicinum Mont. Земледѣлие 28^{10} : 156—158, 1924.
121. Гудевъ Ст. Т. — Употрѣбяваното количество синь камъкъ и варь при пръскането на лозята. Орало 8^{5-6} : 86—89, 1901.
122. Гутю . . . — Ползата отъ пръскането на лозята съ бордолезова каша. Орало 7^{15-16} : 236—237, 1900.
123. Д. . . . . — Изтичане гума (смола) отъ овощнитѣ дървета. Садово 5^{6-7} : 65—67, 1902.
124. Дацовъ С. Ж. — Peronospora viticola или маната по лозята и срѣдствата противъ нея. Орало 4^{5} : 75, 1897.
125. Дачевъ Г. Ив. — Маната по зеленчуцитѣ и срѣдствата противъ нея. Земледѣлие 14^{7} : 75, 1897.
126. Джебаровъ Д-ръ Ив. Ас. Т. — Четиригодишни опити съ фасулъ „Flageolet бѣлъ". Садово 12 : 224—227 1909.
127. „ — „Сгърчване на листата" — една много разпространена и опасна по картофитѣ болесть. Садово 12 : 267—271, 1909.
128. Димитровъ Ж. — Нѣколко бележки по болестьта, отъ която пострадаха лозята презъ тая година. Орало 4^{18} : 284—286, 1897.
129. Димитровъ Т. — Гжби причиняващи болести по нашата горска дървесна растителность. Сведения по земледѣлието 3^{4} : 7—18, 1922.
130. „ — Ненормални образования по нашитѣ горски дървета. Сведения по земледѣлието 3^{5} : 11—59, 22 фиг., 1923.
131. „ — Вредни за нашитѣ гори гжби. Горски прегледъ 9^{4} : 105—110, 1923.
132. „ и Аджаровъ Н. — Паразитната гжба Lophodernium pinastri Schrand у насъ. Горски прегледъ 10^{5} : 152, 1924.
133. „ — Брашнестата мана (пепилницата) по джба, Хр. Савовъ. Горски прегледъ 11^{1-2} : 49, 1925.
134. „ — Вредни за нашитѣ гори и горски култури гжби. Известия на Българското ботаническо д-во кн. 1 : 53—66, 1926.
135. „ — Повреди въ културитѣ отъ веймутовъ боръ въ Белгия. Горски прегледъ 13^{5} : 187—188, 1927.
136. „ и Русковъ М. Д. — Насекомни и гжбни вредители въ нашитѣ гори. Горски прегледъ 13^{6} : 207—215, 1927.
137. Добривъ Ив. — Къси междувъзлия или закърженяване (Court noué) по лозитѣ. Земледѣлие 15^{19} : 6—9, 1909.
138. „ — Шареностьта по листата у лозата. Земледѣлие 16^{13-14} : 202—204, 1910.
139. Добревъ Хр. — Поибренскитѣ горски култури нападнати отъ гжбата „Rhizina undulata". Горски прегледъ 10^{5} : 163, 1924.
140. Додовъ Д. — Листенъ пригоръ и чернилка по житнитѣ растения (Cladosporium herbarum Pers.) Земледѣлие 31^{9} : 141—143, 1927.
141. Дончевъ Ц. — Неприятели на дървото. Лесовъдска сбирка 9^{9} : 132—135, 1907.
142. Доспѣвски Д-ръ С. — Повреди по лозата отъ студоветѣ. Земледѣлие 14^{19} : 11 1908.
143. „ — Вредни външни влияния за развитието на черницата: водоизтичане (хидропизия), жълтеница (хлороза), медна роса или мана, повреди отъ градушка, действиие на сланата върху черницитѣ. Земледѣлие 14^{20} : 9—11, 1908.
144. „ — Болести и повреди по овощнитѣ дървета. Земледѣлие 14^{23-24} : 17—18, 1908.
145. „ — Животински и растителни неприятели по черницата. Земледѣлие 14^{23-24} : 17—18, 1908.
146. „ — Кускутата (кукувича прежда, вилина коса) и унищожението ѝ. Държавна земл. опитна станция Садово. — Упжтвания за борба съ болеститѣ и непр. на земл. растения; Брошура № 8 : 1—20, 1908.
147. „ — Болести и неприятели по културнитѣ растения. Садово 12 : 35—37, 1909.
148. „ — Нѣколко растителни паразити по овощнитѣ дървета. Земледѣлие 15^{3-4} : 3—5, 1909.

149. Доспѣвски Д-ръ С. — Годишенъ отчетъ на Садовската опитна станция за 1908 година. VI : 1—183, 1910.
150. „ — Годишенъ отчетъ на Садовската опитна станция за 1909 година. VII : 1—124, 1910.
151. Драгановъ П. — Синята китка (Orobanche ramosa) по тютюна и унищожението ѝ. Земледѣлие 32^{7} : 22—24, 1928.
152. Дучевски Б. — Опазване на културнитѣ растения. Лозаро-винарски и овощарски вести 1^{12} : 1929.
153. Дѣлевъ Н. — Сечене или косене на зеленчуковия разсадъ. (Dampfing-off, Sämlingsfäule, Umfallen der jungen Pflanzen). Земледѣлие 32^{1}: 7—10, 1928.
154. „ — Срѣдства противъ „сеченето“ на зеленчуковия разсадъ. Земледѣлие 32^{2} : 48—51, 1928.
155. Загоровъ Д. И. — Нови срѣдства въ услуга на лѣсоохраната. Горски прегледъ 12^{5} : 178—180, 1926.
156. И . . . . . — За полѣгането на житнитѣ растения. Садово 8^{2} : 39—41, 1905.
157. „ — Бордошкиятъ разтворъ, неговото правилно приготовление и дѣйствие. Садово 9^{3} : 78—83, 1906.
158. „ — Най-опасниятъ неприятель на детелината и люцерната (Cuscuta'та). Садово 9^{4} : 112—115; 9^{5} : 141—144, 1906.
159. Ивановъ Д-ръ Б. — Приносъ къмъ миколожката флора на България. Списание на Българската Академия на наукитѣ кн. 2 : 219—224, 1912.
160. „ — Растителни и животински паразити. Естествознание и География 4^{5} : 201—205, 1920.
161. „ — Втори приносъ къмъ миколожката флора на България. Списание на Земл. изпитателни институти 1^{1} : 59—64, 1919.
162. „ — Спорить на пшеничната главня не сж отровни. Списание на Земледѣлскитѣ изпитателни институти $2^{1—2}$: 129—130, 1921.
163. „ — Разпространение на Phylosticta fabaei Pass. по тютюнитѣ, която причинява изсъхване на листата. Списание на Земледѣлскитѣ изпитателни институти $2^{1—2}$: 127, 1921.
164. „ — Изследвания върху заразяването на разнитѣ сортове житни растения съ ръжди. Списание на Земледѣлскитѣ изпитателни институти $2^{1—2}$: 130, 1921.
165. „ — Болеститѣ на културнитѣ растения въ България презъ 1921 година и срѣдствата за борба противъ тѣхъ. Сведения по земледѣлието $2^{10—11}$: 18—22, 1921.
166. „ — Опитъ съ черната житна ръжда Puccinia graminis Pers. Списание на Земледѣл. изпитателни институти $1^{5—6}$: 476—477, 1922.
167. „ — Нови гжбни болести за България. Списание на Земледѣл. изпитателни институти $2^{3—4}$: 256—258, 1922.
168. „ — Болеститѣ на памучния храстъ и неговото предпазване въ Америка. Списание на Земледѣл. изпитателни институти $2^{3—4}$: 279—280, 1922.
169. „ — Една опасна болесть по тютюна, която се е появила въ Съединенитѣ Щати. Списание на Земледѣл. изпитателни институти $2^{3—4}$: 280, 1922.
170. „ — Ръждата на житнитѣ зърна и заразата на зародиша. Списание на Земледѣлскитѣ изпитателни институти $2^{3—4}$: 280, 1922.
171. „ — Опити съ розовата ръжда. Списание на Земледѣлскитѣ изпитателни институти 2^{5} : 344—348, 1922.
172. „ — Появилитѣ се болести по културитѣ ни презъ 1922 год. и борбата срещу тѣхъ. Сведения по земледѣлието 3^{10} : 5—11, 1922.
173. Ивановъ Д-ръ Б. и Димитровъ Т. — Една опасна за нашитѣ горски култури гжбна болесть. Горски прегледъ $e^{9—10}$: 353—358, 1922.
174. Ивановъ Д-ръ Б. — Срещащитѣ се болести по тютюна изъ Станимашко и мѣркитѣ за тѣхното ограничение. Бюлетинъ на Кооперативната банка на сдруженитѣ тютюнопроизводители отъ гр. Станимака и околията 2^{52} : 1923.
175. Ивановъ Д-ръ Б. и Димитровъ Т. — Гжби причиняващи болести по нашата горска дървесна растителность. Сведения по земледѣл. 3^{12} : 7—12, 1923.
176. Ивановъ Д-ръ Б. — Намеренитѣ до сега у насъ болести по цвеклото. Сведения по земледѣлието 4^{6} : 6—10, 1923.

177. Ивановъ Д-ръ Б. — Болести по най-разпространената у насъ овощна култура — сливата и сродните ѝ костилкови видове. Трудове на Бълг. научен земледѣлско-стопански институтъ № 2 : 3—31, 10 фиг., 1923.
178. „ — Една опасна болесть по нашите тютюни. Централенъ земледѣлски изпитателенъ институтъ, хвърчащъ листъ № 10 : 1—4, 1 фиг., 1923.
179. „ — Болестите по овощните дървета съ семчести плодове и срѣдствата за борба съ тѣхъ. Списание на Земл. изпит. институти 3^1 : 57—65, 1924.
180. „ — Нови растителни паразити по бора и елата. Горски прегледъ 11^1 : 36—38, 1925.
181. „ — Окапване на листата у нѣкои наши иглолистни горски дървесни породи. Горски прегледъ 11^8 : 247—249, 1925.
182. Ивановъ Д-ръ Б. и Патевъ П. — Констатираните въ Земледѣлския изпитателенъ институтъ болести по лозата. Списание на Земледѣлскитѣ изпитателни институти 5^{2-3} : 237—244, 1925.
183. Ивановъ Д-ръ Б. и Аджаровъ Н. — Fusoma parasiticum Tub. въ горскитѣ разсадници у насъ. Горски прегледъ 12^7 : 252, 1926.
184. Ивановъ Д-ръ Б. — Нѣкои растителни паразити върху културнитѣ растения, появили се въ продължение на последнитѣ пет години (1921—1925). Сведения по земледѣлието 7^3 : 14—18, 1926.
185. Ивановъ Д. п. — Ръждитѣ по житнитѣ растения. Земледѣлско-стопански прегледъ 2^5 : 71—73, 1926.
186. Ивановъ К. — Резултати отъ опити съ препоржчвани срѣдства за борба съ прахо-витата главня по овеса. Земледѣл. стоп. прегледъ 2^2 : 20—21, 1926.
187. Ивановъ Ив. — Изследване на посевния материалъ въ Русенско. Списание на Земледѣлскитѣ изпитателни институти 1^4 : 225—236, 1920.
188. „ — Мазната главня по пшеницата у насъ. Земледѣлие 25^9 : 135—137, 1921.
189. „ — Две опасни болести по захарното цвекло у насъ. Земледѣлие 27^7 : 99—101, 1 фиг., 1923, 27^8 : 16—119, 1 фиг., 1923.
190. Ивановъ Хр. — Ленена кускута. Земледѣлие 19^2 : 21—22, 1914.
191. „ — Устойчивость (резистентность) на растенията противъ растителнитѣ и животински паразити. Земледѣлии 22^1 : 15—17, 1918.
192. Илиевъ Б. — Машини за унищожаване главнята. Сведеоия по земледѣлието 5^{3-4} : 27—41, 1924.
193. „ — Апарати за пречистване семената отъ главня. Земледѣлие 31^{10} : 158—160, 5 фиг., 1927.
194. Илиевъ К. — Още единъ неприятель по житата въ Южна България. Садово 5^3 : 23—25; 5^{8-9} : 93, 1902.
195. „ — Ленъ. Садово 5^{6-7} : 55—59, 1902.
196. Илийчевъ Ю. — За отгледването на люцерната. Садово 12 : 109—115, 1909.
197. „ — Два най-разпространени неприятели на тютюна у насъ: (Thrips tabaci Lindeman, Orobanche ramosa). Земледѣлие 15^{14} : 10—12, 1909.
198. Кабакчиевъ — Годишенъ отчетъ на Държавната земледѣлска опитна станция въ Садово за 1924 год. 3—45, 1924.
199. Казаски Хр. — Формалинътъ, като срѣдство противъ мазната главня (Tilletia laevis Kühn) по пшеницата. Земледѣлие 32^2 : 28—32, 2 фиг. 1928.
200. Кирхнеръ О. — Възприемчивостьта на разнитѣ пшеници спрѣмо мазната главня. Садово 10^{2-3} : 60—64, 1907. (Съобщава Козаровъ Д-ръ П.).
201. „ — Неприятелитѣ на лозата, тѣхното разпознаване и унищожаване. Министерство на търговията и земледѣлието 1—46, 21 фиг., 1909. Преводъ отъ Козаровъ, Д-ръ П.
202. Klika Dr J. — Ein beitrag zur Askomycetenflora von Bulgarien. Annales Micologici 24^{1-2} : 133—136, 1926.
205. „ — Contributions à la connaissance de la flore mycologique de la Bulgarie. Acta Botanica Bohemica Vol. IV—V, 1925—1926.
204. Ковачевъ Й. Г. — ЛЕНЪ стопанско значение, култура и обработка. Министерство на земл. и държ. имоти 1—120, 45 фиг., 6 фотогр., 1928.
205. Ковачевски Ив. — Сухото кореново гниене по фасула. Земледѣлие 31^8 : 127—131, 1927.
206. „ — Новъ паразитъ по тютюна въ България. Земледѣлие 32^5 : 5, 1928.
207. „ — Фасулеви семепроизводни села. Земледѣлие 32^8 : 224—226, 1928.

208. Козаровъ Д-ръ П. — Унищожаването на растителнитѣ остатъци по нивитѣ, градинитѣ и лозята, като предпазително срѣдство противъ болеститѣ и неприятелитѣ на културнитѣ растения. Землед. опитна станция въ Образцовъ чифликъ при Русе. Хвърчащъ листъ № 4 : 1—4.
209. „ — Трудове на Опитната станция въ Образцовъ чифликъ край гр. Русе, за 1907 год. 1^{1} : 1—95, 1907.
210. „ — Фитопатологически календаръ. Орало 13^{3-4} : 46—48; 13^{5} : 77—79; 13^{7} : 106; 13^{8-9} : 134—136; 13^{10-12} : 190—192, 1907.
211. „ — Мѣрки за предпазване на овощнитѣ дървета отъ болести и неприятели. Орало 13^{6} : 88—90, 1907.
212. „ — Унищожаването на растителнитѣ остатъци по нивитѣ, градинитѣ и лозята, като предпазително срѣдство противъ болеститѣ и неприятелитѣ на културнитѣ растения. Орало 13^{8-9} : 132—134, 1907.
213. „ — Какво се прави и какъ се действува въ Германия въ борбата съ болеститѣ и неприятелитѣ на културнитѣ растения. Орало 13^{13-15} : 231—236, 1907.
214. „ — Болестьта „ерготизъмъ“ и мѣркитѣ за предпазване отъ нея. Земледѣлие 14^{20} : 4—6, 1908.
215. „ — Трудове на Държавната земледѣлска опитна станция въ Образцовъ чифликъ край гр. Русе. 1^{2} : 209—388, 1908.
216. „ — Черниятъ вѣтъръ и „чалдисването“ на хранитѣ въ Добруджа. Земледѣлие 15^{3} : 1—3, 1909.
217. „ — Главнята по царевицата и просото. Земледѣлие 15^{13} : 10—11, 1909.
218. „ — Една нова болесть по ечемика у насъ (Tilletia pančiči Bubak). Земледѣлие 15^{19} : 9—10, 1909.
219. „ — Трудове на Държавната земледѣлска опитна станция въ Образцовъ чифликъ край гр. Русе 2^{1} : 1—170, 1909.
220. „ — Годишенъ отчетъ на Държавната земледѣлска опитна станция въ Образцовъ чифликъ край гр. Русе за 1909 год. Отпечатъкъ отъ „Трудоветѣ на сѫщата 2^{2} : 1—72, 1909.
221. „ — Bericht Bber Krankheiten und Beschädigungen der Kulturpflanzen Nord Bulgariens während der Jahre 1906 und 1907. Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten 19 : 331—336, 1909.
222. Костовъ — Лозята и гроздобера въ Станимашко. Орало 4^{20} : 311—313, 1897.
223. „ — Пероноспората и церенето ѝ. Орало 7^{8} : 119—121, 1900.
224. „ — Люцерната и кукувичата прежда. Орало 7^{21} : 329—331; 7^{22} : 347—350, 1900.
225. „ — Болестьта Oidium tuckeri, кюллеме по лозата. Садово 3 : 378—383, 1900.
226. Костовъ Д-ръ Д. — Мазната главня. Земледѣлие 28^{11} : 167—171, 924.
227. „ — Синия камъкъ въ борбата съ главнята. Земледѣлие 29^{7} : 110—112, 1925.
228. Kutin A. — Епидемичното разпространение на маната по дѫба въ Европа (преводъ отъ Бернкопфъ К.). Садово 12 : 414—419, 1909.
228а. Кюлюмовъ Хр. И. — Химическия съставъ на наши маслодайни кюспета. Списание на Землед. изпитат. институти 2^{3-4} : 249—256, 1922.
229. Кюмюрджиевъ Ив. — Люцерновото семе и кускутата. Земледѣлие 31^{1} : 8—10, 1927.
230. Левенсонъ Ев. — Промиване на житнитѣ семена. Земледѣлие 32^{1} : 12, 1928.
231. Малковъ К. — Неприятели и болести по земледѣлскитѣ растения при Опитното поле на Садовското земледѣлско училище презъ 1900—1901 год. Садово 4^{9-10} : 276—283, 1901.
232. „ — Най-важнитѣ болести и повреди по житнитѣ растения. Орало 8 : 199, 212, 228, 250, 262, 1902.
233. „ — Страдатъ ли овощнитѣ дървета, зеленчуцитѣ и земледѣлскитѣ растения отъ разни болести и какво може да се направи за тѣхното унищожение. Садово 5^{4} : 37—39; 66—69; 5^{10-11} : 101—104, 1902.
234. „ — Срѣдства противъ главнята (чернилката). Садово 5^{14-15} : 131—135, 1902.
235. „ — Гниене на плодоветѣ. Садово 5^{16-19} : 156—158, 1902.
236. „ — Какво трѣбва да се работи презъ месецитѣ Ноември и Декември за предпазване земледѣлскитѣ растения и овощни дървета отъ болести и неприятели. Садово 5^{16-19} : 170—172, 1902.
237. „ — Болести и повреди по рапицата. София 1—54, 13 фиг., 1903.

38. Малковъ К. — По-важнитѣ болести и повреди по житнитѣ растения. Орало 9^{13}: 199—201; 9^{14}: 212—214; 9^{15}: 228—230; 250, 262; 1903.
39. „ — Изследвания върху разпространението на главнитѣ (особено) по житнитѣ растения у насъ и пр. Годишенъ отчетъ на Садовската опитна станция 1: 185—201, 1903.
40. „ — Годишенъ отчетъ на Садовската опитна станция год. I: 1—150, 1903.
41. „ — Eine Bakterienkrankheit auf Sesamum orientale in Bulgarien. Centralblatt für Bakteriologie, II Abt., 11^{10-11}: 333—337, 1 Abb., 1904.
42. „ — Опити за унищожаването на мазната главня. Садово 7^{2-3}: 68—75, 1904.
43. „ — Изследвания върху мазната главня и начинитѣ за унищожението ѝ. Садово 7^{11-12}: 293—302, 1904.
44. „ — Годишенъ отчетъ на Садовската опитна станция за 1904 год. II: 1—242, 4 табл., 1905.
45. „ — Die schädlichsten Insekten und Pflanzenkrankheiten, welche an der Kulturpflanzen in Bulgarien während des Jahres 1903 geschädigt haben. Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten 15: 50—53, 1905.
46. „ — Годишенъ отчетъ на Садовската опитна станция за 1905 год. III: 1—176, 10 табл., 1906.
47. „ — Черното гниене на сусама. Садово 9^{4}: 117—121, 1906.
48. „ — Синята китка — единъ опасенъ паразитъ на тютюна. (Orobanche ramosa L.). Садово 9^{6}: 181—185, 1906.
49. „ — Най-разпространенитѣ у насъ болести и неприятели на розовата култура. Садово 9^{7-8}: 220—224, 1906.
50. „ — Weitere Untersuchungen über die Bakterienkrankheit auf Sesamum orientale. Centralblatt für Bakteriologie 16: 664—666, 4 Tafeln, 1906.
51. „ — Синята китка — единъ опасенъ паразитъ по тютюня и срѣдства за унищожението ѝ (Orobanche ramosa L.). Упжтвания за борба съ разнитѣ болести и повреди по земледѣлскитѣ растения. Брошура № 3: 3—6, 1 фиг. Пловдивъ, 1906.
52. „ — Единъ приносъ къмъ паразитнитѣ гжби на България. Трудове на Българското природоизпитателно д-во 3: 14—25, 1906.
53. „ — Годишенъ отчетъ на Садовската опитна станция за 1906 година. IV: 3—216, 1907.
54. „ — Трудове на Държавната земледѣлска опитна станция въ Садово № 2: 1—54, 16 картини, 1907.
55. „ — Новата болесть по анасона у насъ. Садово 10^{2-3}: 58—60, 1907.
56. „ — Две опасни, но още не разпространени у насъ болести по културнитѣ растения. Садово 10^{2-3}: 62—65, 1907.
57. „ — Две нови болести по памука. Садово 10^{4}: 115—119, 1907.
58. „ — Най-разпространенитѣ болести и неприятели на черницата. Садово 10^{8-9}: 219—224, 1907.
59. „ — Болестьта „Казълъ-янъкъ“ (опожаряване) по житата и срѣдства за предпазване на земледѣлскитѣ растения. Брошура № 4: 3—13, 1 цвѣтна картина. Пловдивъ, 1907.
60. „ — Доспѣвски Д-ръ С. — Годишенъ отчетъ на Садовската опитна станция за 1907 година. V: 1—341, 1908.
61. „ — Erster Beitrag zur Kenntnis der Pilzflora Buigariens. Annales Mycologici 8: 29—36, 1908.
62. „ — Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Pilzfora Bulgariens. Annales Mycologici 8: 187—191, 1910.
63. Мариновъ В. П. — Лозарството въ България. Орало 2^{5}: 76—79, 1895.
64. „ — По болестьта „Блакъ-ротъ“ въ Франция. Орало 6^{16}: 257—259; 6^{17}: 267—270, 1899.
65. „ — Хлороза или желтеница и варовититѣ почви. Садово 4: 211—221, 1901.
66. „ — Пероноспората презъ 1910 година и положението на лозарството. Земледѣлие 16^{22-24}: 337—370, 1910.
67. „ — Пероноспората. Земледѣлие 19^{12}: 182—184, 1914.
68. „ — „ „ 24^{3}: 39—41, 1920.
69. „ — „ презъ настоящата година, борбата противъ нея и причиненитѣ загуби. Земледѣлие 24^{9-10}: 148—151, 1920.

270. Марковъ П. М. — „Изъ културитѣ около гр. София". Лѣсовъдска сбирка 4[10] : 153—156, 1902.
271. Матуски Н. — Резултати отъ едно пръскано лозе презъ 1897 година въ с. Соволяно — Кюстендилска околия. Орало 5[8] : 123—125, 1898.
272. Милковски Йорд. — Опитъ за изпитване нѣкои срѣдства противъ мазната пшенична главня. Земледѣлие 32[4] : 102—105, 1928.
273. Митковъ Ив. — Възможно ли е церенето на пшеничната главня? Орало 3[16] : 284—285, 1896.
274. Н. Н. . . . . — Trametes radiciperda R. H. Бранище 1[10] : 73—75, 1906.
275. Н. П. . . . . — Пересидътъ като срѣдство за борба противъ пероноспората по лозята. Земледѣлие 20[6] : 166—168, 1915.
276. Найденовъ В. — Разнитѣ срѣдства за борба противъ болеститѣ и неприятелитѣ на културнитѣ растения. Садово 9[9—10] : 266—268; 9[11—12] : 307—311, 1906. 10[1] : 13—17; 10[2—3] : 79—83, 1907.
277. „ — Гниене на картофитѣ причинено отъ гжбата Phytophthora infestans. Садово 10[5—6] : 144—148, 1907.
278. „ — Общи мѣрки срещу важнитѣ земледѣлски, горски и градинарски растителни болести, причинени отъ паразитни гжби. Земледѣлие. 15[6—7] : 1—4, 1909.
279. „ — Отстранение и унищожение на паразитнитѣ гжби, като срѣдство за борба противъ растителнитѣ болести. Земледѣлие 15[11—12] : 2—3, 1909.
280. „ — Борба срещу растителнитѣ болести посрѣдствомъ пръскане съ медни разтвори и сѣренъ прахъ. Земледѣлие 15[14] : 5—7, 1909.
281. „ — Рогчето по ръжьта. Земледѣлие 16[13—14] : 223; 16[17—18] : 285, 1910.
282. „ — Годишенъ отчетъ на Софийската земледѣлска опитна станция за 1910 и 1911 год. 1—57, 1911.
283. „ — Лѣкуване на семето съ формалинъ и борбата противъ главнята. Земледѣлие 18[11—12] : 184, 1902.
284. „ — Заразяване на лозовитѣ листа съ мана (Plasmopara viticola). Земледѣлие 18[11—12] : 184, 1912.
285. „ — Сравнителни опити съ нѣколко срѣдства за борба противъ лъжливата мана по лозята (Peronospora viticola). Земледѣлие 18[19] : 293—295, 1912.
286. „ — Формалдехидътъ като срѣдство противъ мазната пшенична главня въ практиката. Земледѣлие 18[19] : 295—297, 1912.
287. „ — Пероноспората по лозята и борбата противъ нея. Министер. на земледѣлието държ. имоти. София 3—20, 1915.
288. „ — Ръждитѣ по житнитѣ растения и борбата съ тѣхъ. Софийска държавна земледѣлска опитна станция 3—44, 22 фиг., 1915.
289. „ — Правилното организиране на борбата съ болеститѣ и неприятелитѣ на земледѣлскитѣ растения. Държавна подвижна земледѣлска катедра въ София 3—20, 1915.
290. „ — Пероноспората по лозята и борбата противъ нея. Земледѣлие 20[5] : 134—138, 1915.
291. „ — Праховитата главня по ечемика. Земледѣлие 20[5] : 143—146, 1915.
292. „ — Ръждитѣ по житнитѣ растения и борбата противъ тѣхъ. Земледѣлие 20[6] : 158—162, 1915.
293. „ — Праховита главня по просото. Земледѣлие 20[6] : 166—169, 1915.
294. „ — Една нова болесть по дюлитѣ у насъ. Земледѣлие 20[7] : 190—191, 1915.
295. „ — Мазна или твърда главня по пшеницата. Земледѣлие 20[8] : 203—206, 1915.
296. „ — Една нова болесть по пшеницата у насъ. Земледѣлие 20[9] : 237—238, 1915.
297. „ — Кафяви петна по краставицитѣ. Земледѣлие 23 : 76—77, 1919.
298. „ — Нѣколко за пръвъ пѫть констатирани у насъ болести по културнитѣ растения. Земледѣлие 23[5—6] : 76—78, 1919.
299. „ — Бактерийна болесть по доматитѣ. Земледѣлие 23 : 77—78, 1919.
300. „ — Загиване на младитѣ борови растения (Fusoma pini R. H., Syn. Fusoma parasiticum Tub., Fusarium blasticola Rostr. Земледѣлие 23 : 78, 1919.
301. „ — Опоителенъ хлѣбъ. Земледѣлие 23[7—8] : 103—108, 1919.
302. „ — Тютюнева отвара. Земледѣлие 24[6—7] : 86—89, 1920.

303. Найденовъ В. — Размѣра на мазната главня (Tilletia laevis Kühn) въ нашитѣ пшеници. Списание на Земл. изпит. институти 1^{4} : 304—306, 1920.
304. „ — Бѣлата петнистость по тютюневитѣ листа. Земледѣлие 25^{11} : 170—171, 1921.
305. „ — Една за пръвъ пжть констатирана болесть по ябалката у насъ причинена отъ гжбата Phoma pomorum Thüm. Земледѣлие 26^{8} : 118—120, 1922.
306. Наковъ В. — Резултата отъ еднократно напръскване съ бордолезовъ разтворъ нѣколко лозя въ района на с. Типченица — Вратчанска околия. Орало 6^{4} : 56—58, 1899.
307. Н-овъ . . . . — Една гжба по коренитѣ на винената лоза (Dematophora necatrix). Орало 3^{18} : 323—325, 1896.
308. Нелѣлчевъ Н. — Една нова у насъ болесть по лозата „Потъмняване на листата". Списание на Земл. изпитателни институти 1^{1-2} : 189—191, 1920.
309. „ — Съвършенната форма на Oidium tuckeri въ България. Годишникъ на Софийския Университетъ, Агроном. факултетъ II : 286—291, 1923/1924.
310. Нешевъ Д. Т. — Пръскайте лозята. Садово 9^{5}: 148—152, 1906.
311. Николай — Пръскането на лозята противъ маната. Земледѣлие 18^{7-8} : 97—100, 1912.
312. Николовъ Г. — Професоръ Виала въ Берковица. Орало 3^{21} : 374—376, 1896.
313. „ — Отъ що пострада реколтата на лозята презъ тази година, въ време на цъвтенето. Орало 4^{15} : 235—238, 1897.
314. „ — Разтворитѣ противъ пероноспората. Садово 2 : 35—41. 1899.
315. Николовъ Ив. — Една опасна болесть по цвеклото у насъ. Земледѣлие 28^{4} : 55—57, 1924.
316. Николовъ Т., Стефанова М. и Пушкаровъ Н. — Розовата култура въ България. Списание на Земледѣлскитѣ изпитателни институти 1^{5-6} : 373—404, 3 фиг. 6 табл., 1920.
317. Николовъ Т. — Къмъ физиологията и храненето на вишитѣ растителни паразити. Списание на Земледѣлскитѣ изпитателни институти 1^{5-6} : 446—467, 1920.
318. Николовъ Т. и Стефанова М. — Plasmodiophora brassicae и нейното отношение къмъ стопанина ѝ. Списание на Земледѣлскитѣ изпитателни институти. 2^{1-2} : 62—70, 1920.
319. П. . . . . — Не пропускайте да пръскате лозята. Садово 5^{8-9} : 75, 1902.
320. П. К. . . . — Приготовлението на меднитѣ препарати употрѣбявани противъ болеститѣ на растенията. Садово 4 : 98—100, 1901.
321. Патевъ П. — Wildfire, една бактерийна болесть по листата на тютюна въ България. Списание на Земледѣлскитѣ изпитателни институти 4^{4} : 100—113, 1928.
322. Pateff Pavel — Wildfire a new tobacco disease in Bulgaria. Известия на Българското ботаническо дружество 2 : 39—43, 1928.
323. Пеневъ П. — Нова болесть по лозата (Cercospora vitis). Българско овощарство 3^{6} : 125—126, 1922.
324. Петковъ Г. — За хлорозата. Земледѣлие 18^{15-16} : 246, 1912.
325. „ — Кратки бележки изъ опититѣ за борба противъ закържевяването на лозитѣ (Court pone). Земледѣлие 18^{20-21} : 324—325, 1912.
326. Петковъ Д-ръ Ст. — Библиография за флората на България.
327. „ — По въпроса за житната ражда (Puccinia graminis Pers.) и срѣдствата за борба противъ нея. Земледѣлие 22^{4-5} :5 —9, 1918.
328. Поповъ Ф. — Брашнестата мана, Oidium quercinun Thüm. Лѣсовъдска сбирка 11^{2} : 23—25, 1909.
329. Пройчовъ Г. — Новитѣ срѣдства противъ мазната главня по пшеницата у насъ. Земледѣлие 27^{9} : 130—135, 1923.
330. „ — Кускутата и борбата съ нея у насъ. Сведения по земледѣлието 4^{3-4} : 8—13, 1923.
331. „ — Отчетъ на Държавната опитна станция въ Образцовъ чифликъ край гр. Русе за 1923, 3—43, 1925.
332. „ — Генетични изследвания върху устойчивостьта на ръждата при тревата тимотейка — Phleum pratense L. Списание на Земледѣлскитѣ изпитателни институти 4^{3} : 1—24, 4 картини, 1928.

333. Радославовъ Ал. — Брашнената или сжщинската мана. Земледѣлие 15^{9} : 133—137, 4 фиг., 1910.
334. „ — Приносъ къмъ паразитната гжбна флора на Пиринъ планина. Трудове на Българ. природоизпит. д-во кн. 7 : 1—4, 1915.
335. „ — Приносъ къмъ паразитната гжбна флора на Искърския проломъ. Трудове на Българ. природоизпитат. д-во кн. 7 : 1—8. 1915.
336. „ — Приносъ къмъ паразитната гжбна флора на България. Списание на Българската Академия на наукитѣ кн. 9 : 211—218, 1914.
337. Разсукановъ Хр. Ив. — Защо лѣгатъ житата? Орало 3^{23} : 403—405, 1896.
338. Рангеловъ З. — Вършачкитѣ като агентъ за разпространение на главнята и срѣдства за борба срещу нея. Земледѣлие 18^{20} : 310—312. 1912.
339. Reitmair O. — „Завиване на листата“ — болесть по картофитѣ. Садово 13 : 184—188, 1910.
340. Руевски Б. — Болеститѣ на лесовитѣ дървета, причинявани отъ вредителнитѣ гжбички fungi). Орало $8^{19—20}$: 303—305, 1901.
341. С. М. Л. . — Главнята по житата и начини за борба противъ нея. Земледѣлие 18^{19} : 291—293, 1912.
342. S. T. . . . — Състоянието на лозарството въ Княжеството презъ 1899 и 1900 год. Орало $8^{11—12}$ 176—180, 1901.
343. Савовъ Хр. — Върху борбата съ болестьта „Чернилка на житнитѣ растения“, причинена отъ гжбитѣ Cladosporium herbarum Link. и Alternaria brassicae (Berk.) Sacc. и чистата култура отъ тѣзи две гжби. Списание на Земледѣлскитѣ изпитателни институти $2^{5—6}$: 407—419, 1922.
344. „ — Приносъ къмъ гжбната, бактерийната и фанерогамна паразитна флора на културнитѣ растения въ Шуменска околия. Трудове на Българ. научен земл. институтъ 4 : 3—136, 123 фиг., 1923.
345. „ — Брашнестата мана (пепелницата) по джба — Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl. Списание на Земледѣлскитѣ изпитателни институти 3^{1} : 26—29, 1924.
346. „ — Болестьта „Le roncet“ по лозята е ли причинена отъ протозои. Списание на Земледѣлскитѣ изпитателни институти $3^{4—6}$: 564, 1924.
347. „ — Върху борбата съ рака по ябълката. Списание на Земледѣлскитѣ изпитателни институти $3^{1—6}$: 566, 1924.
348. „ — Резултати отъ полскитѣ опити заложени на Опитното поле при Земледѣлския изпитателенъ институтъ въ София за периода 1919—1924 г. Списание на Земл. изпит. институти. $3^{4 \cdot 6}$: 429—498, 1924.
349. „ — Нѣколко нови и не добре проученн бактерийни и гжбни болести по културнитѣ растения и дивораствщитѣ такива въ България. Списание на Земледѣлскитѣ изпитателни институти $3^{2—3}$: 150—162, 1925.
350. „ — Годишенъ отчетъ на Земледѣлския изпитателенъ институтъ за 1923 г. 3—140, 1925.
351. „ — Годишенъ отчетъ на Земледѣлския изпитателенъ институтъ за 1924 г. 3—266, 1925.
352. „ — Годишенъ отчетъ на Държавната земледѣлска опитна и контролна станция въ София за 1925 г., 3—386, 1927.
352 а. „ — Годишенъ отчетъ на Държавната земледѣлска опитна и контролна станция въ София за 1926 г., 1—373, 1928.
353. „ — Опитъ за борба съ праховитата главня по мохара (лудото просо) — Ustilago crameri Körn. Списание на Земледѣлскитѣ изпитателни институти 4^{3} : 90—100, 1928.
354. „ — Борба съ кускутата у насъ. Реферати четени на Агрономическитѣ конференции въ Плѣвенъ и Стара Загора на 18—25 януарий 1928 г. 60—76, 1928.
355. Sajo Carl — Една американска картофена болесть въ Европа, Early blight — Dürfleckenkrankheit. Превелъ Габровски П. Орало 4^{5} : 73, 1897.
356. Сираковъ Г. — Аеропланната борба противъ вреднитѣ горски насекоми. Горски прегледъ 12^{8} : 273—279, 1926. $13^{1—2}$: 58—59, 1927.
357. Сираковъ П. — Пероноспора (Peronospora viticola de Bary) (балсара). Садово 1 : 11—21, 1898.

358. Сираковъ П. — Рѣзането на лозята и болестьта антракноза (чернилка). Садово. 1 : 370—375, 1898.
359. „ — Болестьта чернилка (Антракноза) и единъ опитъ съ нея. Садово 1 : 409—413, 1898.
360. „ — По пероноспората (маната, балсарата). Садово 2 : 31—33, 1899.
361. „ — Изследвания по прилепностьта на разтворитѣ, употрѣбявани като лѣкъ противъ пероноспората (маната на лозята). Садово 2 : 31—36, 1899.
362. „ — Има ли нѣкакво вредно влияние гроздето и виното добито отъ пръскани лозя? Садово 3 : 225—229, 1900.
363. „ — Пръскачкитѣ за лозя. Садово 3 : 260—263, 1900.
364. „ — Какъ трѣбва да се извърши рѣзитбата на пострадалитѣ лозя отъ пероноспората. Садово 4 : 23—26, 1901.
365. „ — Правилното приготовление на бордолезовия разтворъ. Садово 4 : 121—127, 1901.
366. „ — Само 1·5% бордолезовъ разтворъ. Садово 4 : 165—168, 1901.
367. „ — Нова болесть по лозята. Садово 4^{9} : 313—317, 1901.
368. „ — Хлорозирането (пожълтяването) на разнитѣ американски сорти. Садово 7^{1} : 20—23; 7^{2-3} : 79—83, 1904.
369. „ — Не пропускайте да пръскате лозята. Садово 7^{7} : 93—96, 1904,
370. „ — Нова болесть по лозята въ Алжиръ. Орало 13^{1} : 11—13, 1907.
371. Сотировъ Хр. — Житнитѣ главни (чернилки) и церение семето отъ тѣхъ. Садово 1 : 192—194, 1898.
372. Стефановъ Г. — Причини за полѣгането на житнитѣ растения. Земледѣлие 14^{23-24} : 4—6, 1908.
373. Стойчивъ Ст. — Брашняна роса по дѫба. Горски преглидъ 2^{5} : 16—19, 1911.
374. Стояновъ И. — Причини за метлообразнитѣ нараствания по клонитѣ. Горски прегледъ 1^{4-5} : 174—176, 1910.
375. Странски Ив. — Синята китка като неприятель на люцерната. Земледѣлие 31^{4} : 54—56, 1 фиг., 1927.
376. Тамамджиевъ Л. — Нова метода за борба срещу подната гѫба. Горски прегледъ 13^{10} : 404—405, 1927.
377. Ташковъ Л. — Моравото рогче (Claviceps purpurea). Земледѣлие 18^{7-8} : 108—109, 1912.
378. Теневъ Д. — Годишенъ отчетъ на Държавната земледѣлска опитна станция въ Образцовъ чифликъ край гр. Русе за 1924 година, 3—78, 1926.
379. „ — Резултати отъ сѫдови опити съ стимулирани семена. Земледѣлско стопански прегледъ 2^{1} : 5—11, 1926.
380. Тодоровъ Т.— Житнитѣ чернилки (главни) и срѣдствата за унищожението имъ. Орало 3^{15} : 264—267, 1896.
381. „ — Житнитѣ ръжди и срѣдствата противъ тѣхъ. Орало 4^{16} : 248—250, 1897.
382. „ — Свилина коса (Cuscuta) и срѣдствата противъ нея. Орало 4^{17} : 270, 1897.
383. Тополски Кр. — Болести на лозата. Орало 9^{18} : 278—281, 1903.
384. „ — Пероноспората на лозата (маната). Земледѣлие 14^{8} : 5—12, 6 фиг., 1908.
385. „ — Какво очаква лозарството ни съ разрешението вноса на лози отъ Франция. Садово, 12 : 329—336, 1909.
386. Тр. . . . . — Върху срѣдствата за унищожение на паразитната гѫба, която причинява „опадане иглитѣ на бора“ (Lophodermium pinastri Schr. Лѣсовъдска сбирка 11^{6} : 95—96, 1909.
387. Трифонъ. . — Peronospora viticola. Орало 2^{7} : 102—104, 1895.
388. „ — Бацилната гомоза (Gomose bacillare). Орало 2^{10} : 151—152, 1895; 3^{13} : 239, 1896.
389. „ — Какъ да предпазимъ лозята си отъ пероноспората (балсарата). Peronospora viticola. Орало 3^{10} : 178—181, 1896.
390. „ — Какво влияние има пръскането лозята съ бордолезовъ разтворъ върху качеството на гроздето. Орало 4^{11} : 170, 1897.
391. „ — Згърчване листата на прасковата. Орало 4^{11} : 170—171, 1897.

392. Трифонъ. . — Загубитѣ на лозята отъ пероноспората, балсарата или маната. Орало 4^{14} : 213—216, 1897.
393. „ — Отъ какво пострада реколтата на лозята въ Бѣлоградчишко. Орало 5^{2} : 22—25, 1898.
394. „ — Маната (балсарата) и предпазването лозята отъ нея. Орало 5^{8} : 115—117, 1898.
395. „ — Американскитѣ лози причина за разпространението на една нова болесть по лозята. Орало 5^{21} : 324—328, 1898.
396. Фетваджиевъ Ат. Хр. — Лозарството въ България. Орало 2^{8} : 122—125; 2^{11} : 165—168; 2^{12} : 180—182; 2^{15} : 229—232, 1895.
397. Фетваджиевъ И. — Кукувичата прежда или вилина коса и срѣдствата за унищожаването ѝ. Орало 10^{5-6} : 142—145, 1907.
398. Forbin V. — Ракътъ (канцера) у растенията. Превелъ Кузевъ К. Т. Горски прегледъ 12^{5} : 170—176, 3 фиг., 1926.
399. Хитиловъ Им. — Борбата съ болеститѣ и неприятелитѣ на овощнитѣ дървета презъ зимата. Земледѣлие 17^{24} : 379—381, 1911.
400. „ — Нови открития въ борбата съ пероноспората. Земледѣлие 18^{3} : 38—39, 1912.
401. „ — По кои причини пръскането съ бордолезовъ разтворъ нѣма добри резултати. Земледѣлие 18^{9-10} : 149, 1912.
402. „ — Ролята на навременното заораване стърнището за унищожаването неприятелитѣ на житнитѣ растения. Земледѣлие 18^{11-12} : 171—173, 1912.
403. „ — Инкрустиране. Земледѣлие 18^{17} : 267—268, 1912.
404. Христовъ Ал. — „Новата болесть“ по черницата. Земледѣлие 32^{6} : 189—291, 1928.
405. Христовъ М. — Самопречистването на граха отъ чернилката. Земледѣлие 26^{3} : 44, 1922.
406. П. Д. . . . — Срѣдство противъ Oidium quercinum. Горски прегледъ 2^{3} : 31, 1911.
407. Чакъровъ В. — Синиятъ камъкъ и приложението му въ лозарството и овощарството. Сведения по земледѣлието 8^{6-7} : 3—9, 1927.
408. Ченгелевъ Ат. Д. — Петнистостьта по тютюнивитѣ листа. Земледѣлие 27^{2} : 24—25, 1922.
409. „ — Членъ 16 отъ закона за тютюна въ връзка съ борбата противъ болеститѣ и неприятелитѣ по него. Земледѣлие 27^{10} : 149—150, 1923.
410. Чукуровъ Н. — Какво очаква лозарството ни съ разрешението вноса на лози отъ Франция. Садово 12^{3} : 117—124; 12^{7} : 329—336, 1909.
411. „ — Унищожаване на плесенитѣ въ избата. Земледѣлие 16^{11} : 171—172, 1910.
412. Шаровъ Кр. — Семето и приготовлението му за сеидба. Садово 2 : 174—178, 1899.
413. Шмерда К. — Болести и неприятели по зеленчуцитѣ. Стопански прегледъ и домакинство 5^{6} : 105—107, 1917.
414. Шопъ . . . — Унищожете главнята. Земледѣлие 22^{8} : 13, 1918.

960—1930